

日本産主要樹種の性質

材の化学組成およびパルプ化試験

米沢保正⁽¹⁾・香山 彊⁽²⁾・菊池文彦⁽³⁾・宇佐見国典⁽⁴⁾高野 勲⁽⁵⁾・荻野健彦⁽⁶⁾・本田 収⁽⁷⁾

Yasumasa YONEZAWA, Tsutomu KAYAMA, Fumihiko KIKUCHI, Kuninori USAMI,

ISAO TAKANO, Takehiko OGINO and Osamu HONDA:

The Properties of the Important Japanese Woods

Chemical analysis, kraft pulping and papermaking characteristics of the important Japanese woods

要 旨：日本産主要樹種，針葉樹24種，広葉樹46種，合計70種について，化学組成の分析およびパルプ化試験を行なった。

化学組成含有量は，樹種によりかなり異なるが，ホロセルロース， α -セルロース，リグニン等の主成分と比較すると，灰分，可溶分等の副成分は比較的狭い範囲に集中的に分布している。

パルプ化試験，漂白試験の結果，ほとんどの樹種は与えられた実験条件の範囲内でよく蒸解され，また漂白性もよく，パルプ強度の面でも特に問題になる樹種は認められない。強度の平均値の比較では，引裂き強さ，耐折強さは針葉樹が高く，引張り，破裂強さは針葉樹，広葉樹，両者はほぼ同程度である。また各強度は，広葉樹では平均値を中心にして鋭い大きなピークが見られるが，針葉樹の場合は，比較的幅広い，ゆるやかなピークとなっている。

生育地の異なる試料について試験の行なわれた針葉樹ではアカマツ，スギ，広葉樹ではブナ，ミズナラについて，化学組成，パルプの諸性質に地域差の影響は認められていない。

パルプの性質と化学組成との関連性は，Table 15 に示されるように，各種の有意な単相関が認められる。

目 次

1. ま え が き	55
2. 試 験 料	56
3. 試 験 方 法	57
4. 試 験 結 果	59
5. パルプの性質と化学組成との相関	86
6. 要 約	90
文 献	91
写 真 説 明	91
Summary	92
付 表	94
Plate	1~48

1. ま え が き

この報告は，日本産主要樹種の性質に関する試験⁽¹⁾の一環として行なった材の化学組成分析，パルプ化試験の結果をとりまとめたものである。

日本産主要樹種の性質に関する試験の全体的なとりまとめは，別に行なわれるはずであり，ここでは化学組成およびパルプ化試験の結果のみをとりまとめ，材の物理的性質，木材繊維の形態的性質との関連性等についての論議は行っていない。なおパルプの形態的性質について，各樹種につきパルプの叩解前後の顕微鏡写真，広葉樹については道管の形態も顕微鏡写真に撮影した。なお，この試験の実施にあっ

1972年10月6日受理

(1)~(7) 林産化学部

では、試料の作製について、パルプ研究室山崎正友氏の労を煩わした。ここに付記して深甚の謝意を表する。

2. 試 料

試料とした樹種は Table 1 に示すとおりで、針葉樹 24 種、広葉樹 46 種、合計 70 種であり、その産地は Table 2 に示すように日本全国にわたっている。

Table 1. 供 試 材
Wood samples

I. 針 葉 樹 Softwood

番 号 Number	和 名 Common name	学 名 Scientific name
1J	イ チ イ	ICHII
2N	カ ヤ	KAYA
3M	イヌマキ (クサマキ)	INUMAKI (KUSAMAKI)
4M	モ ミ	MOMI
5H	ウラジロモミ	URAJIROMOMI
6F	アオモリトドマツ	AOMORITODOMATSU
7D	トドマツ	TODOMATSU
8H	シ ラ ベ	SHIRABE
9J	カ ラ マ ツ	KARAMATSU
10C	エゾマツ	EZOMATSU
11C	アカエゾマツ	AKAEZOMATSU
12J	ト ウ ヒ	TÔHI
13M	トガサワラ	TOGASAWARA
14M	ツ ガ	TSUGA
15*	ア カ マ ツ	AKAMATSU
16K	ヒメコマツ	HIMEKOMATSU
17N	ク ロ マ ツ	KUROMATSU
18*	ス ギ	SUGI
19J	コウヤマキ	KÔYAMAKI
20J	ヒ ノ キ	HINOKI
21J	サ ワ ラ	SAWARA
22J	ネ ズ コ	NEZUKO
23J	ア ス ナ ロ	ASUNARO
24F	ヒノキアスナロ	HINOKIASUNARO
		<i>Taxus cuspidata</i> Siebold et Zuccarini
		<i>Torreya nucifera</i> Siebold et Zuccarini
		<i>Podocarpus macrophyllus</i> D. Don
		<i>Abies firma</i> Siebold et Zuccarini
		<i>Abies homolepis</i> Siebold et Zuccarini
		<i>Abies Mariesii</i> Masters
		<i>Abies sachalinensis</i> FR. Schmidt
		<i>Abies Veitchii</i> Lindley
		<i>Larix leptolepis</i> Gordon
		<i>Picea jezoensis</i> Carrière
		<i>Picea Glehnii</i> Masters
		<i>Picea hondoensis</i> Mayr
		<i>Pseudotsuga japonica</i> Beissner
		<i>Tsuga Sieboldii</i> Carrière
		<i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zuccarini
		<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr
		<i>Pinus Thunbergii</i> Parlatore
		<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don
		<i>Sciadopitys verticillata</i> Siebold et Zuccarini
		<i>Chamaecyparis obtusa</i> Endlicher
		<i>Chamaecyparis pisifera</i> Endlicher
		<i>Thuja Standishii</i> Carrière
		<i>Thujaopsis dolabrata</i> Siebold et Zuccarini
		<i>Thujaopsis dolabrata</i> Siebold et Zuccarini
		var. <i>Hondai</i> Makino

II. 広 葉 樹 Hardwood

25C	ドロノキ	DORONOKI	<i>Populus Maximowiczii</i> A. Henry
26C	ヤマナラシ	YAMANARASHI	<i>Populus Sieboldii</i> Miquel
28F	オニグルミ	ONIGURUMI	<i>Juglans Sieboldiana</i> Maximowicz
29H	サワグルミ	SAWAGURUMI	<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold et Zuccarini
31H	ミズメ	MIZUME	<i>Betula grossa</i> Siebold et Zuccarini
32B	シラカンバ	SHIRAKANBA	<i>Betula platyphylla</i> Sukachev
33D	マカンバ	MAKANBA	<i>Betula Maximowicziana</i> Regel
34H	アカシデ	AKASHIDE	<i>Carpinus laxiflora</i> Blume
35D	アサダ	ASADA	<i>Ostrya japonica</i> Sargent
36F	ク リ	KURI	<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zuccarini
37N	シイノキ	SHIINOKI	<i>Shiia Sieboldii</i> Makino
38*	ブ ナ	BUNA	<i>Fagus crenata</i> Blume
39H	イヌブナ	INUBUNA	<i>Fagus japonica</i> Maximowicz
40N	アカガシ	AKAGASHI	<i>Cyclobalanopsis acuta</i> Oerstedt
41N	シラカシ	SHIRAKASHI	<i>Cyclobalanopsis myrsinaefolia</i> Oerstedt
42N	ウバメガシ	UBAMEGASHI	<i>Quercus phylliraeoides</i> A. Gray

番 号 Number	和 名 Common name	学 名 Scientific name
43N	イチイガン	ICHIIGASHI
44H	ク ス ギ	KUNUGI
45*	ミズナラ	MIZUNARA
46H	コ ナ ラ	KONARA
47C	ハルニレ	HARUNIRE
48H	ケ ヤ キ	KEYAKI
49N	ヤマグワ	YAMAGUWA
50D	カ ツ ラ	KATSURA
51D	ホ オ ノ キ	HONOKI
52N	クスノキ	KUSUNOKI
53N	タブノキ	TABUNOKI
54N	イスノキ	ISUNOKI
55 I	ヤマザクラ	YAMAZAKURA
56F	イヌエンジュ	INUENJU
57H	キ ハ ダ	KIHADA
58H	モチノキ	MOCHINOKI
59D	イタヤカエデ	ITAYAKAEDE
60 I	トチノキ	TOCHINOKI
61C	シナノキ	SHINANOKI
62C	オオバボダイジュ	OBABODAIJU
63M	ヒメシャラ	HIMESHARA
64D	ハリギリ (セン)	HARIGIRI (SEN)
65 I	ミズキ	MIZUKI
66H	シ オ ジ	SHIOJI
67D	ヤチダモ	YACHIDAMO
68C	アオダモ	AODAMO
69H	キ リ	KIRI
70N	コ ジ イ	KOJII
71C	オオバヤナギ	OBAYANAGI
74 I	ヤマハンノキ	YAMAHANNOKI
		<i>Cyclobalanopsis gilva</i> OERSTEDT
		<i>Quercus acutissima</i> CARRUTHERS
		<i>Quercus crispula</i> BLUME
		<i>Quercus serrata</i> THUNBERG
		<i>Ulmus propinqua</i> KOIDZUMI
		<i>Zelkova serrata</i> MAKINO
		<i>Morus bombycis</i> KOIDZUMI
		<i>Cercidiphyllum japonicum</i> SIEBOLD et ZUCCARINI
		<i>Magnolia obovata</i> THUNBERG
		<i>Cinnamomum Camphora</i> SIEBOLD
		<i>Machilus Thunbergii</i> SIEBOLD et ZUCCARINI
		<i>Distylium racemosum</i> SIEBOLD et ZUCCARINI
		<i>Prunus donarium</i> SIEBOLD
		<i>Maackia amurensis</i> RUPRECHT et MAXIMOWICZ
		var. <i>Buergeri</i> C. K. SCHNEIDER
		<i>Phellodendron sachalinense</i> SARGENT
		<i>Ilex integra</i> THUNBERG
		<i>Acer mono</i> MAXIMOWICZ
		<i>Aesculus turbinata</i> BLUME
		<i>Tilia japonica</i> SIMONKAI
		<i>Tilia Maximowicziana</i> SHIRASAWA
		<i>Stewartia monadelphica</i> SIEBOLD et ZUCCARINI
		<i>Kalopanax ricinifolium</i> MIGUEL
		<i>Cornus controversa</i> HEMSLEY
		<i>Fraxinus commemoralis</i> KOIDZUMI
		<i>Fraxinus mandshurica</i> RUPRECHT
		<i>Fraxinus Sieboldiana</i> BLUME
		var. <i>serrata</i> NAKAI
		<i>Paulownia tomentosa</i> STEUDEL
		<i>Shiia cuspidata</i> MAKINO
		<i>Toisusu Urbaniana</i> KIMURA
		<i>Alnus hirsuta</i> TURCZANINOW
		var. <i>sibirica</i> C. K. SCHNEIDER

15* F, I, L 18* G, I, N 38* E, F, K, L, H 45* C, D, F, K

Table 2. 供 試 材 の 産 地
Locality of the wood samples

記 号 Sign	営 林 局 名 Name of Regional Forestry Office	記 号 Sign	営 林 局 名 Name of Regional Forestry Office
A	旭 川 Asahikawa	H	前 橋 Maebashi
B	北 見 Kitami	I	東 京 Tokyo
C	帯 広 Obihiro	J	長 野 Nagano
D	札幌 Sapporo	K	名古屋 Nagoya
E	函 館 Hakodate	L	大 阪 Osaka
F	青 森 Aomori	M	高 知 Kochi
G	秋 田 Akita	N	熊 本 Kumamoto

3. 試 験 方 法

3.1. 試 料 調 製

Table 1 に示した各樹種の各丸太の元口から、厚さ 20~30 mm の円板を採取し、20~30×10~15×2~3 mm の手割りチップを作製し、パルプ試験に供した。各樹種のチップの一部を採り、ウィリイミルで粉砕し、40~60 mesh 部分を採り、木材分析 (化学成分分析) 用試料とした。

3.2. 材およびパルプの化学的試験

木材分析は JIS により行なった。ホロセルロースは WISE 法により測定した。 α -セルロースは、分離ホロセルロースについて、常法により測定した。未漂白パルプの塩素吸収量 (Roe 値) は TAPPI standard T 202 os-61 により測定した。

3.3. パルプ化

蒸解は 4 l 容電熱式オートクレーブでクラフト法により行なった。得られたパルプは洗浄後、8 カットスクリーンにより選別した。パルプ収率は全パルプについて測定し、その他の試験は精選パルプについて行なった。蒸解条件は Table 3 に示すとおりである。

パルプは漂白用を目的としたので、針葉樹パルプはローエ値 5 ± 1.5 、広葉樹パルプは 3 ± 1 を基準とした。Table 3 に示した 3 条件で基準ローエ値に達しない場合は、薬品添加量を増加してさらに蒸解試験を

Table 3. パルプ化条件
Pulping conditions

針 葉 樹 Softwood				
活性アルカリ% (Na_2O として) Total alkali % (as Na_2O)	a : 15%, b : 17%, c : 19%			
硫 化 率 Sulphidity	25%			
液 比 Liquor to wood ratio	5 l/kg			
蒸解スケジュール Schedule	最高温度 (170°C)	到達時間	1 時間30分	
	最高温度 (170°C)	保持時間	1 時間30分	
	1 hr. 30 min. to 170°C , and 1 hr. 30 min. at 170°C .			
広 葉 樹 Hardwood				
活性アルカリ% (Na_2O として) Total alkali % (as Na_2O)	a : 13%, b : 15%, c : 17%			
硫 化 率 Sulphidity	25%			
液 比 Liquor to wood ratio	4 l/kg			
蒸解スケジュール Schedule	最高温度 (170°C)	到達時間	1 時間30分	
	最高温度 (170°C)	保持時間	1 時間30分	
	1 hr. 30 min. to 170°C , and 1 hr. 30 min. at 170°C .			

The pulps, after washing, were screened on an 8-cut (8/1000 in. slot openings) screen plate.

Table 4. 漂 白 条 件
Bleaching conditions

処 理 Treatment	パルプ濃度 Pulp consistency %	温 度 Temperature $^\circ\text{C}$	反 応 時 間 Reaction time hr.	薬品添加量 Chemicals %
1. 塩 素 化 Chlorination	4	室 温 Room temperature	1	ローエ値の 120% 120% of Roe no.
2. NaOH 抽出 NaOH extraction	6	70	1	2.5*
3. ClO_2 漂白 ClO_2 bleaching	6	70	2	1.0*
4. NaOH 抽出 NaOH extraction	6	70	1	1.5*
5. ClO_2 漂白 ClO_2 bleaching	6	70	2	1.0*
6. SO_2 処理 SO_2 treatment	3	室 温 Room temperature	0.5	0.5*

* 対パルプ * Pulp basis

行なった。液比は規定の液量で不足の場合には、増加させて試験を行なった。

3.4. 漂 白

パルプは5段法により漂白した。漂白条件は Table 4 のとおりである。未漂白および漂白パルプの白色度は JIS によって測定した。

なお初期の試験では、一部 Ca-ハイボを漂白処理に使用している (シーケンス: 針葉樹パルプ C-E-⑩-E-D-D, 広葉樹パルプ C-E-⑩-E-D)。

3.5. パルプの強度試験

パルプの叩解は Lampen mill で行ない、試験紙葉の調製および諸試験は JIS によって行なった。

4. 試 験 結 果

4.1. 化 学 組 成

化学組成分析結果は Table 5 のとおりである。

Table 5 に明らかなように、化学組成成分含有量は樹種によりかなり異なるが、各成分ごとの含有量分布の様相を明らかにするために、針葉樹、広葉樹別に各成分含有量の度数分布を Fig. 1~7 に示した。

Table 5. 供試材の化学組成 (対絶乾木材%)
Chemical components of wood samples (% of o. d. wood)

I. 針 葉 樹 Softwood

番号 No.	樹 種 Species	灰分 Ash	可 溶 分 Solubility in		ペン ト サン Pen- to- san	ホロセル ロース Holo- cellu- lose*2	α-セルロ ース α- cellu- lose*3	リグ ニン Lig- nin	材の比 重*4 Basic density g/ml
			熱水 Hot water	アルコー ル・ベン ゼン Et. OH- benzene					
1J*1	<i>Taxus cuspidata</i>	0.19	11.1	11.5	5.5	58.5	38.2	28.1	0.45
2N	<i>Torreya nucifera</i>	0.66	6.7	6.6	4.9	63.8	45.3	34.5	0.45
3M	<i>Podocarpus macrophyllus</i>	0.44	3.2	1.5	10.9	65.0	49.4	35.7	0.46
4M	<i>Abies firma</i>	0.97	3.6	2.3	5.2	69.8	49.0	33.5	0.42
5H	<i>Abies homolepis</i>	0.20	2.3	1.5	5.7	77.1	52.6	29.4	0.31
6F	<i>Abies Mariesii</i>	2.26	2.4	1.6	7.5	71.9	49.7	29.9	0.36
7D	<i>Abies sachalinensis</i>	0.26	2.6	2.6	5.2	74.0	49.4	30.0	0.33
8H	<i>Abies Veitchii</i>	0.18	2.3	1.8	5.9	72.6	47.3	29.1	0.35
9J	<i>Larix leptolepis</i>	0.34	9.5	3.2	5.6	68.5	47.8	28.0	0.44
10C	<i>Picea jezoensis</i>	0.20	3.6	1.3	6.1	71.0	47.3	28.4	0.32
11C	<i>Picea Glehnii</i>	0.20	2.8	2.0	6.7	73.5	49.9	27.8	0.39
12J	<i>Picea hondoensis</i>	0.15	3.3	2.2	5.2	64.4	41.9	28.8	0.37
13M	<i>Pseudotsuga japonica</i>	0.14	4.4	3.5	5.1	68.1	47.1	33.1	0.43
14M	<i>Tsuga Sieboldii</i>	0.24	4.1	3.0	4.3	71.0	51.0	31.1	0.46
15F	<i>Pinus densiflora</i>	0.33	3.3	2.7	8.1	71.1	46.5	26.0	0.37
15L	"	0.22	3.9	4.1	7.0	65.8	43.6	26.1	0.43
15I	"	0.22	5.7	2.9	7.8	65.2	43.6	27.9	0.44
16K	<i>Pinus pentaphylla</i>	0.27	3.2	8.1	4.7	68.4	44.5	27.1	0.33
17N	<i>Pinus Thunbergii</i>	0.21	3.0	3.3	6.7	62.9	44.0	25.8	0.45
18N	<i>Cryptomeria japonica</i>	0.81	4.2	3.9	7.4	66.7	43.9	32.6	0.35
18G	"	0.72	3.1	2.6	7.3	73.3	48.6	32.3	0.30
18I	"	0.50	3.0	2.6	7.5	71.9	49.0	32.8	0.32
19J	<i>Sciadopitys verticillata</i>	0.18	6.6	11.0	4.7	60.8	38.7	28.5	0.27
20J	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	0.48	4.2	5.1	5.0	69.3	47.3	29.6	0.34
21J	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	0.35	7.4	9.4	5.1	60.2	41.0	30.7	0.29
22J	<i>Thuja Standishii</i>	0.33	10.8	8.8	6.3	69.8	47.6	26.9	0.28
23J	<i>Thujopsis dolabrata</i>	0.43	3.8	4.2	6.4	61.6	41.2	31.9	0.37
24F	<i>Thujopsis dolabrata</i> (var.)	0.73	4.5	4.2	5.9	75.2	48.4	33.0	0.39

II. 広葉樹 Hardwood

番号 No.	樹種 Species	灰分 Ash	可溶分 Solubility in		ペン トサン Pen- tosan	ホロセル ロース Holo- cellu- lose*2	α-セル ロース α- cellu- lose*3	リグ ニン Lig- nin	材の比 重** Basic density g/ml
			熱水 Hot water	アルコール・ベン ゼン Et. OH- benzene					
25C*1	<i>Populus Maximowiczii</i>	0.69	2.1	1.8	13.6	82.0	52.8	22.1	0.29
26C	<i>Populus Sieboldii</i>	0.47	3.3	2.5	19.0	81.1	49.4	18.3	0.37
28F	<i>Juglans Sieboldiana</i>	0.35	7.2	3.9	13.3	77.6	50.0	21.8	0.43
29H	<i>Pterocarya rhoifolia</i>	0.43	2.8	2.3	14.0	78.2	48.2	23.8	0.27
74I	<i>Alnus hirsuta</i> (var.)	0.34	3.7	2.3	14.6	72.7	47.8	23.0	0.38
31H	<i>Betula grossa</i>	0.43	2.4	2.3	26.8	78.4	45.6	23.5	0.57
32B	<i>Betula platyphylla</i>	0.24	2.1	2.0	21.5	76.8	56.4	17.6	0.45
33D	<i>Betula Maximowicziana</i>	0.43	1.9	0.9	17.6	77.2	46.9	22.9	0.56
34H	<i>Carpinus laxiflora</i>	0.64	3.4	2.2	26.5	80.4	46.0	16.8	0.57
35D	<i>Ostrya japonica</i>	0.47	3.7	2.0	19.1	79.7	48.0	23.4	0.56
36F	<i>Castanea crenata</i>	0.81	11.2	2.4	14.8	69.6	42.1	20.6	0.47
37N	<i>Shiia Sieboldii</i>	0.23	12.7	3.1	14.7	64.9	37.0	28.4	0.47
38E	<i>Fagus crenata</i>	0.87	1.2	0.8	17.0	82.8	50.0	22.5	0.52
38F	"	0.43	2.6	1.0	19.4	84.0	53.8	23.5	0.48
38H	"	0.68	1.8	1.0	19.2	79.5	47.9	24.4	0.46
38K	"	0.56	1.7	1.2	18.8	79.7	48.5	24.0	0.52
38L	"	0.004	1.8	1.2	13.6	81.0	50.2	24.7	0.51
39H	<i>Fagus japonica</i>	0.79	3.6	1.4	17.2	79.3	47.2	24.6	0.52
40N	<i>Cyclobalanopsis acuta</i>	0.70	8.6	3.6	17.2	71.3	46.5	24.9	0.71
41N	<i>Cyclobalanopsis myrsinaefolia</i>	0.98	7.1	1.9	19.4	75.0	48.2	22.7	0.67
43N	<i>Cyclobalanopsis gilva</i>	1.10	6.2	0.5	15.4	76.9	47.8	26.5	0.62
44H	<i>Quercus acutissima</i>	0.63	3.8	0.4	17.5	78.4	49.9	18.8	0.68
45C	<i>Quercus crispula</i>	0.05	5.5	1.1	19.9	76.2	47.0	26.0	0.54
45D	"	0.35	6.5	0.8	19.3	74.3	47.3	26.3	0.52
45F	"	0.08	6.2	0.9	19.6	73.7	46.6	25.9	0.54
45K	"	0.26	4.1	2.2	19.9	75.9	51.0	24.7	0.55
46H	<i>Quercus serrata</i>	0.61	5.7	0.5	16.9	78.2	50.3	21.8	0.62
47C	<i>Ulmus propinqua</i>	0.80	2.2	0.4	15.0	78.5	47.3	26.8	0.49
48H	<i>Zelkova serrata</i>	0.79	8.0	0.9	15.5	75.1	43.9	27.1	0.49
49N	<i>Morus bombycis</i>	0.39	7.2	8.0	15.0	66.9	41.7	20.9	0.49
50D	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	0.32	4.7	2.6	15.7	77.7	50.6	25.6	0.41
51D	<i>Magnolia obovata</i>	0.35	3.2	1.8	14.9	77.0	46.5	29.6	0.39
52N	<i>Cinnamomum Camphora</i>	0.52	4.5	2.3	13.6	80.5	50.1	29.0	0.42
53N	<i>Machilus Thunbergii</i>	0.29	7.2	4.5	15.3	72.9	49.0	25.2	0.55
54N	<i>Distylium racemosum</i>	0.49	5.4	1.9	17.0	73.0	47.0	29.8	0.70
55I	<i>Prunus donarium</i>	0.27	6.0	4.6	20.9	72.9	47.6	17.6	0.46
56F	<i>Maackia amurensis</i> (var.)	0.32	5.0	5.7	18.5	77.2	53.0	19.2	0.54
57H	<i>Phellodendron sachalinense</i>	0.13	3.8	1.4	13.9	80.2	51.1	23.1	0.34
59D	<i>Acer mono</i>	0.46	3.7	1.6	17.8	77.5	48.6	24.1	0.52
60I	<i>Aesculus turbinata</i>	0.26	3.1	1.4	14.3	74.5	46.0	26.9	0.41
61C	<i>Tilia japonica</i>	0.18	2.7	3.7	18.2	79.4	45.9	19.5	0.37
62C	<i>Tilia Maximowicziana</i>	0.60	3.0	2.9	17.6	82.3	45.6	20.6	0.34
63M	<i>Stewartia monadelphæ</i>	0.58	2.5	1.2	14.7	69.1	43.5	24.6	0.61
64E	<i>Kalopanax ricinifolium</i>	0.57	4.1	2.1	17.4	79.4	50.5	22.7	0.40
65I	<i>Cornus controversa</i>	0.40	3.5	1.5	17.2	73.0	46.0	22.0	0.49
66H	<i>Fraxinus commemoralis</i>	0.49	2.7	1.8	13.8	78.3	57.4	26.0	0.44
67D	<i>Fraxinus mandshurica</i>	1.02	3.5	1.6	16.1	80.1	51.2	21.9	0.52
68C	<i>Fraxinus Sieboldiana</i> (var.)	0.89	5.6	3.7	16.7	74.5	45.0	23.6	0.57
69H	<i>Paulownia tomentosa</i>	0.21	9.0	8.2	16.0	72.4	45.3	20.4	0.23
70N	<i>Shiia cuspidata</i>	0.39	3.9	2.0	15.9	78.7	47.9	23.4	0.42
71C	<i>Toisusu Urbaniana</i>	0.89	1.9	2.2	14.7	79.6	49.6	21.2	0.32

*1 アルファベット記号は供試材の産地を示す。Alphabetical sign shows a locality of the wood samples.

*2 灰分, リグニン補正 Ash, Lignin free.

*3 リグニン補正 Lignin free.

*4 木材部資料 (未発表) Unpublished data (Wood Technology Division)

これによると、各成分ともに最大値と最小値との幅はかなり広範囲にわたっているが、ホロセルロース、 α -セルロース、リグニン等の主成分に比較すると、灰分、可溶分等の副成分は比較的狭い範囲に集中的に分布していることが認められる。これらをさらに細かく検討すると、次のようになる。

化学組成成分含有量分布の集中度

	針 葉 樹		広 葉 樹	
	主要ピークの範囲 (%)	全体に占める割合 (%)	主要ピークの範囲 (%)	全体に占める割合 (%)
灰 分	0.16~0.35	60.7	0.26~0.65	58.8
温水可溶分	2.6~4.5	64.3	1.6~4.5	60.8
アルコール・ベンゼン可溶分	1.6~4.5	64.3	0.6~2.5	64.7
ペントサン	4.6~7.5	85.7	13.6~20.5	90.2
ホロセルロース	—	—	76.6~80.5	51.0
α -セルロース	—	—	45.6~51.5	76.5
リグニン	—	—	21.6~26.5	62.7







Fig. 1 灰分含有量の度数分布
Histogram of ash contents.

Fig. 2 熱水可溶分含有量の度数分布
Histogram of hot water extracts contents.







Fig. 3 アルコール・ベンゼン可溶分
含有量の度数分布
Histogram of alcohol-benzene
extracts contents.

Fig. 4 ペントサン含有量の
度数分布
Histogram of pentosan
contents.



上記のように広葉樹の場合は主要成分も針葉樹と異なり、かなり狭い範囲に集中的に分布していることが明らかである。いっぽう針葉樹の場合は、主要成分の含有量分布に広葉樹の場合のようなきわだったピークは認められない。

針葉樹、広葉樹の化学組成分含有量のこのような特徴ある分布の仕方は、当然これらの材から生成されるパルプの性質に種々の影響を及ぼすであろうことが予測される。

次に各成分について、含有量の大小を仮に3～4段階に区分して(次表),

	針 葉 樹 (%)					広 葉 樹 (%)				
	C	B	A'	A	平均	C	B	A'	A	平均
灰 分	～0.25	～0.55	～0.85	0.86～	0.36	～0.15	～0.55	～0.95	0.96～	0.49
温水可溶分	～2.5	～5.5	～9.5	9.6～	4.6	～2.5	～7.5	～11.5	11.6～	4.5
アルコール・ベンゼン可溶分	～2.5	～6.5	～9.5	9.6～	4.2	～1.5	～4.5	～6.5	6.6～	2.2
ペントサン	～5.5	～7.5	～9.5	9.6～	6.2	～14.5	～20.5	～25.5	25.6～	17.1
ホロセルロース	～65.5	～70.5	70.6～		68.3	～72.5	～81.5	81.6～		76.8
α-セルロース	～43.5	～48.5	48.6～		46.2	～43.5	～52.5	52.6～		48.1
リグニン	～27.5	～32.5	32.6～		30.0	～18.5	～27.5	27.6～		23.4

A, A': 大きい, B: 中程度, C: 小さい。




Fig. 5 ホロセルロース含有量の度数分布
Histogram of holocellulose contents.




Fig. 6 α-セルロース含有量の度数分布
Histogram of α-cellulose contents.




Fig. 7 リグニン含有量の度数分布
Histogram of lignin contents.

とすると、各樹種の成分含有量は針葉樹、広葉樹別に Table 6 のように類別される。針葉樹ではアカマツ、スギ、広葉樹ではブナ、ミズナラについて、産地の異なる試料により、生育地の違いによる化学組成の差の有無を検討したが、特に差は認められなかった。

4.2. パルプ化

パルプ化試験の結果は Table 7, Table 8 のとおりである。

パルプの蒸解はさきに述べたように、針葉樹、広葉樹ともにそれぞれ a, b, c の 3 条件で行なったが、いずれの場合も活性アルカリ添加量が増加すると、パルプ収率、ローエ価は減少し、未漂白パルプの白色

Table 6. 化学組成の樹種別評価
Classification of chemical components on each tree species

I. 針葉樹 Softwood

番号 No.	樹 種 Species	灰 分 Ash	可 溶 分 Solubility in		ペント サン Pento- san	ホロセル ロース Holo- cellu- lose	α-セルロ ース α- cellu- lose	リゲニン Lignin
			熱 水 Hot water	アルコー ル・ベン ゼン Et. OH- benzene				
1 J	<i>Taxus cuspidata</i>	C	A	A	C	C	C	B
2 N	<i>Torreya nucifera</i>	A'	A'	A'	C	C	B	A
3 M	<i>Podocarpus macrophyllus</i>	B	B	C	A	C	A	A
4 M	<i>Abies firma</i>	A	B	C	C	B	A	A
5 H	<i>Abies homolepis</i>	C	C	C	B	A	A	B
6 F	<i>Abies Mariesii</i>	B	C	C	B	A	A	B
7 D	<i>Abies sachalinensis</i>	B	B	B	C	A	A	B
8 H	<i>Abies Veitchii</i>	C	C	C	B	A	B	B
9 J	<i>Larix leptolepis</i>	B	A'	B	B	B	B	B
10 C	<i>Picea jezoensis</i>	C	B	C	B	A	B	B
11 C	<i>Picea Glehnii</i>	C	B	C	B	A	A	B
12 J	<i>Picea hondoensis</i>	C	B	C	C	C	C	B
13 M	<i>Pseudotsuga japonica</i>	C	B	B	C	B	B	A
14 M	<i>Tsuga Sieboldii</i>	C	B	B	C	A	A	B
15 F	<i>Pinus densiflora</i>	B	B	B	A'	A	B	C
15 C	"	C	B	B	B	B	B	C
15 I	"	C	A'	B	A'	C	B	B
16 K	<i>Pinus pentaphylla</i>	B	B	A'	C	B	B	C
17 N	<i>Pinus Thunbergii</i>	C	B	B	B	C	B	C
18 N	<i>Cryptomeria japonica</i>	A'	B	B	B	B	B	A
18 G	"	A'	B	B	B	A	A	B
18 I	"	B	B	B	B	A	A	A
19 J	<i>Sciadopitys verticillata</i>	C	A'	A	C	C	C	B
20 J	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	B	B	B	C	B	B	B
21 J	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	B	A'	A'	C	C	C	B
22 J	<i>Thuja Standishii</i>	B	A	A'	B	B	B	C
23 J	<i>Thujaopsis dolabrata</i>	B	B	B	B	C	C	B
24 F	<i>Thujaopsis dolabrata</i> (var.)	A'	B	B	B	A	B	A

II. 広葉樹 Hardwood

25 C	<i>Populus Maximowiczii</i>	A'	C	B	C	A	A	B
26 C	<i>Populus Sieboldii</i>	B	B	B	B	B	B	C
28 F	<i>Juglans Sieboldiana</i>	B	B	B	C	B	B	B
29 H	<i>Pterocarya rhoifolia</i>	B	B	B	C	B	B	B
74 I	<i>Alnus hirsuta</i> (var.)	B	B	B	B	B	B	B
31 H	<i>Betula grossa</i>	B	C	B	A	B	B	B
32 B	<i>Betula platyphylla</i>	B	C	B	A'	B	A	C
33 D	<i>Betula Maximowicziana</i>	B	C	C	B	B	B	B
34 H	<i>Carpinus laxiflora</i>	A'	B	B	A	B	B	C
35 D	<i>Ostrya japonica</i>	B	B	B	B	B	B	B
36 F	<i>Castanea crenata</i>	A'	A'	B	B	C	C	B
37 N	<i>Shiia Sieboldii</i>	B	A	B	B	C	C	A
38 E	<i>Fagus crenata</i>	A'	C	C	B	A	B	B
38 F	"	B	B	C	B	A	A	B
38 H	"	A'	C	C	B	B	B	B
38 K	"	A'	C	C	B	B	B	B
38 L	"	C	C	C	C	B	B	B

番号 No.	樹 種 Species	灰 分 Ash	可 溶 分 Solubility in		ペン ト サン Pento- san	ホロセル ロース Holo- cellu- lose	α -セル ロース α - cellu- lose	リゲニン Lignin
			熱 水 Hot water	アルコー ル・ベン ゼン Et. OH- benzene				
39H	<i>Fagus japonica</i>	A'	B	C	B	B	B	B
40N	<i>Cyclobalanopsis acuta</i>	A'	A'	B	B	C	B	B
41N	<i>Cyclobalanopsis myrsinaefolia</i>	A	B	B	B	B	B	B
43N	<i>Cyclobalanopsis gilva</i>	A	B	C	B	B	B	B
44H	<i>Quercus acutissima</i>	A'	B	C	B	B	B	B
45C	<i>Quercus crispula</i>	C	B	C	B	B	B	B
45D	"	B	B	C	B	B	B	B
45F	"	C	B	C	B	B	B	B
45K	"	B	B	B	B	B	B	B
46H	<i>Quercus serrata</i>	A'	B	C	B	B	B	B
47C	<i>Ulmus propinqua</i>	A'	C	C	B	B	B	B
48H	<i>Zelkova serrata</i>	A'	A'	C	B	B	B	B
49N	<i>Morus bombycis</i>	B	B	A	B	C	C	B
50D	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	B	B	B	B	B	B	B
51D	<i>Magnolia obovata</i>	B	B	B	B	B	B	A
52N	<i>Cinnamomum Camphora</i>	B	B	B	C	B	B	A
53N	<i>Machilus Thunbergii</i>	B	B	B	B	B	B	B
54N	<i>Distylium racemosum</i>	B	B	B	B	B	B	A
55I	<i>Prunus donarium</i>	B	B	A'	A'	B	B	C
56F	<i>Maackia amurensis</i> (var.)	B	B	A'	B	B	A	B
57H	<i>Phellodendron sachalinense</i>	C	B	C	C	B	B	B
59D	<i>Acer mono</i>	B	B	B	B	B	B	B
60I	<i>Aesculus turbinata</i>	B	B	C	C	B	B	B
61C	<i>Tilia japonica</i>	B	B	B	B	B	B	B
62C	<i>Tilia Maximowicziana</i>	A'	B	B	B	A	B	B
63M	<i>Stewartia monadelphica</i>	A'	C	C	B	C	C	B
64E	<i>Kalopanax ricinifolium</i>	A'	B	B	B	B	B	B
65I	<i>Cornus controversa</i>	B	B	C	B	B	B	B
66H	<i>Fraxinus commemoralis</i>	B	B	B	C	B	A	B
67D	<i>Fraxinus mandshurica</i>	A	B	B	B	B	B	B
68C	<i>Fraxinus Sieboldiana</i> (var.)	A'	B	B	B	B	B	B
69H	<i>Paulownia tomentosa</i>	B	A'	A	B	C	B	B
70N	<i>Shiia cuspidata</i>	B	B	B	B	B	B	B
71C	<i>Toisusu Urbaniana</i>	A'	C	B	B	B	B	B

Note

	Softwood (%)					Hardwood (%)				
	C	B	A'	A	Average	C	B	A'	A	Average
Ash	~0.25	~0.55	~0.85	0.86~	0.36	~0.15	~0.55	~0.95	0.96~	0.49
Hot water extract	~2.5	~5.5	~9.5	9.6~	4.6	~2.5	~7.5	~11.5	11.6~	4.5
Et. OH-benzene extract	~2.5	~6.5	~9.5	9.6~	4.2	~1.5	~4.5	~6.5	6.6~	2.2
Pentosan	~5.5	~7.5	~9.5	9.6~	6.2	~14.5	~20.5	~25.5	25.6~	17.1
Holocellulose	~65.5	~70.5	70.6~		68.3	~72.5	~81.5	81.6~		76.8
α -cellulose	~43.5	~48.5	43.6~		46.2	~43.5	~52.5	52.6~		48.1
Lignin	~27.5	~32.5	32.6~		30.0	~18.5	~27.5	27.6~		23.4

A, A': large, B: medium, C: small.

Table 7. 硫酸塩パルプの性質
Properties of sulphate pulps

針葉樹 Softwood

番号 No.	樹種 Species	パルプ化 条件 Pulping condi- tion	収率 % Yield %			ローエ価 Roe number	白光度 Bright- ness	備考 Note
			精選 Scre- ened	粕 Screen- ings	全 Total			
1J	<i>Taxus cuspidata</i>	a	33.8	16.9	50.7	13.10	14.6	
		b	41.1	3.5	44.6	11.66	18.1	
		c	39.8	0	39.8	6.67*	20.3	
2N	<i>Torreya nucifera</i>	a	46.1	1.4	47.5	15.92	17.9	Total alkali 21%
		b	44.2	1.0	45.2	13.20	19.5	
		c	43.6	0.1	43.8	8.32	22.5	
		d	40.3	0	40.3	6.32*	25.8	
3M	<i>Podocarpus macrophyllus</i>	a	42.5	0.4	42.9	10.57	15.3	
		b	40.9	0.1	41.0	7.18	18.6	
		c	40.2	0	40.2	6.05*	19.7	
4M	<i>Abies firma</i>	a	43.9	1.7	45.6	11.95	12.4	
		b	44.2	0.2	44.4	7.16	16.0	
		c	41.9	0.1	42.0	5.47*	19.4	
5H	<i>Abies homolepis</i>	a	49.9	5.5	55.5	11.65	20.3	} Liq. to wood ratio 6 l/kg
		b	50.5	2.4	52.9	9.38	21.7	
		c	48.9	0.7	49.6	5.60*	21.8	
6F	<i>Abies Mariesii</i>	a	48.1	0.1	48.3	7.57	18.1	
		b	45.0	0	45.0	5.77	20.2	
		c	43.7	0	43.7	4.64*	23.4	
7D	<i>Abies sachalinensis</i>	a	48.3	4.0	52.3	10.50	22.9	
		b	47.8	0.8	48.5	7.42	27.0	
		c	46.1	0.3	46.4	4.96*	29.0	
8H	<i>Abies Veitchii</i>	a	46.5	7.8	54.2	11.73	16.5	} Liq. to wood ratio 6 l/kg
		b	49.2	2.1	51.2	9.86	18.3	
		c	48.5	0.1	48.6	6.82*	22.7	
9J	<i>Larix leptolepis</i>	a	37.5	11.7	49.2	8.95	15.7	
		b	41.4	2.3	43.6	5.63	17.3	
		c	40.6	0.5	41.1	4.13*	20.5	
10C	<i>Picea jezoensis</i>	a	50.4	3.0	53.4	10.84	21.6	
		b	47.9	0.3	48.2	6.95	23.5	
		c	46.5	0.2	46.7	3.57*	28.3	
11C	<i>Picea Glehnii</i>	a	48.8	2.4	51.2	9.29	20.3	
		b	48.7	0.1	48.8	6.98	25.0	
		c	46.6	0.1	46.7	4.83*	29.1	
12J	<i>Picea hondoensis</i>	a	43.7	9.2	52.9	11.63	17.3	} Liq. to wood ratio 5.5 l/kg Total alkali (d) 21%
		b	47.3	1.4	48.7	8.10	20.3	
		c	46.5	1.4	47.9	7.49	22.4	
		d	46.6	0.5	47.1	6.75*	25.1	
13M	<i>Pseudotsuga japonica</i>	a	44.7	0.8	45.5	9.61	12.0	
		b	41.7	0.1	41.8	6.92	15.0	
		c	41.0	0	41.0	5.65*	17.1	
14M	<i>Tsuga Sieboldii</i>	a	45.7	0.6	46.3	9.11	15.7	
		b	42.9	0.1	43.0	6.58	16.3	
		c	42.1	0	42.1	4.61*	20.0	
15L	<i>Pinus densiflora</i>	a	44.0	3.4	47.4	6.64	15.5	
		b	44.3	1.3	45.6	5.46*	18.2	
		c	42.8	0.3	43.1	3.64	18.2	

番号 No.	樹 種 Species	パルプ化 条件 Pulping condi- tion	収 率 % Yield %			ローエ価 Roe number	白色度 Bright- ness	備 考 Note
			精 選 Scre- ened	粕 Screen- ings	全 Total			
15F	<i>Pinus densiflora</i>	a	46.5	2.8	49.3	6.19	19.5	
		b	46.2	2.0	48.2	4.92*	19.6	
		c	45.8	0.2	46.0	3.51	23.4	
15I	<i>Pinus densiflora</i>	a	44.5	9.0	53.5	6.85	18.6	
		b	49.2	1.3	50.5	7.32	21.9	
		c	47.4	0.1	47.5	4.54*	24.9	
16K	<i>Pinus pentaphylla</i>	a	41.7	7.4	49.1	12.27	17.1	
		b	41.9	1.8	43.7	9.68	19.1	
		c	43.5	0.1	43.6	6.86*	22.8	
17N	<i>Pinus Thunbergii</i>	a	46.1	4.1	50.2	6.48	23.1	
		b	47.9	0.5	48.4	4.98*	24.7	
		c	45.9	0	46.0	3.78	26.4	
18N	<i>Criptomeria japonica</i>	a	49.0	0.9	50.0	13.50	19.3	
		b	45.6	0.2	45.8	9.72	22.1	
		c	44.7	0.2	44.9	6.08*	25.0	
18G	<i>Criptomeria japonica</i>	a	45.2	9.5	54.7	12.23	15.5	Liq. to wood ratio 6 l/kg Total alkali (d) 21%
		b	46.4	2.0	48.5	10.35	18.2	
		c	47.7	0.8	48.5	9.55	20.0	
		d	47.5	0.3	47.8	8.68*	22.3	
18I	<i>Criptomeria japonica</i>	a	45.7	9.1	54.8	13.70	16.1	Liq. to wood ratio 6 l/kg Total alkali (d) 21%
		b	48.8	3.1	51.9	12.49	17.7	
		c	45.4	0.4	45.9	8.03	20.2	
		d	45.0	0.1	45.2	6.85*	22.6	
19J	<i>Sciadopitys verticillata</i>	a	46.1	4.4	50.5	16.23	23.7	Total alkali 21% " 23%
		b	46.9	0.9	47.8	12.54	26.5	
		c	45.5	0.1	45.6	9.74	30.8	
		d	45.0	0	45.0	8.22	31.7	
		e	42.5	0	42.5	6.47*	34.7	
20J	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	a	45.5	5.6	51.1	10.97	23.1	
		b	47.1	0.7	47.8	8.05	25.4	
		c	46.2	0.2	46.6	6.25*	28.1	
21J	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	a	47.2	2.0	49.2	12.71	22.2	
		b	46.1	0.1	46.2	8.17	27.2	
		c	44.7	0.1	44.7	6.28*	31.5	
22J	<i>Thuja Standishii</i>	a	43.7	3.3	47.0	12.00	17.9	
		b	42.9	0.9	43.8	7.71	21.5	
		c	41.2	0.1	41.3	5.42*	24.1	
23J	<i>Thujopsis dolabrata</i>	a	42.6	8.5	51.1	12.90	18.0	
		b	45.1	1.1	46.1	8.02	22.4	
		c	43.7	0.2	43.9	6.16*	24.1	
24F	<i>Thujopsis dolabrata</i> (var.)	a	46.2	1.0	47.2	8.31	20.1	
		b	46.0	0.1	46.1	6.36	22.3	
		c	44.4	0	44.4	5.32*	25.5	

標準ローエ価を示すパルプを漂白試験に使用した (* で他のパルプと区別してある)。

The pulps showing standard Roe numbers, which were distinguished from other samples by dot sign, were used for bleaching test.

Table 8. 硫酸塩パルプの性質
Properties of sulphate pulps

広葉樹 Hardwood

番号 No.	樹 種 Species	パルプ化 条件 Pulping condi- tion	収 率 % Yield %			ローエ価 Roe number	白色度 Bright- ness	備 考 Note
			精 選 Scre- ened	粕 Screen- ings	全 Total			
25C	<i>Populus Maximowiczii</i>	a	56.7	2.5	59.1	5.03	30.4	
		b	58.0	0.2	58.2	2.15*	32.3	
		c	55.6	0	55.6	1.43	33.9	
26C	<i>Populus Sieboldii</i>	a	55.5	2.2	57.6	2.32*	28.3	
		b	55.1	0.2	55.2	1.65	32.2	
		c	54.2	0	54.2	1.50	34.8	
28F	<i>Juglans Sieboldiana</i>	a	44.8	10.0	54.8	4.88	21.8	} Liq. to wood ratio 4 l/kg
		b	51.2	0.2	51.3	2.52*	21.8	
		c	50.9	0	50.9	2.07	22.2	
29H	<i>Pterocarya rhoifolia</i>	a	52.8	3.6	56.4	4.15	23.8	} Liq. to wood ratio 6 l/kg
		b	53.6	0.2	53.8	3.12*	25.5	
		c	52.5	0	52.5	1.33	27.8	
74I	<i>Alnus hirsuta (var.)</i>	a	46.4	8.5	54.9	6.10	18.0	
		b	52.3	0	52.3	3.36	23.8	
		c	49.8	0	49.8	2.90*	25.3	
31H	<i>Betula grossa</i>	a	51.4	2.3	53.7	4.57	18.2	
		b	51.3	0	51.3	2.96*	21.6	
		c	49.5	0	49.5	2.22	24.4	
32B	<i>Betula platyphylla</i>	a	53.6	4.2	57.8	4.63	19.6	
		b	53.9	0.1	53.9	2.39*	27.1	
		c	52.5	0	52.5	2.42	29.9	
33D	<i>Betula Maximowicziana</i>	a	52.7	2.7	55.4	4.07	16.9	
		b	52.8	0.1	52.9	3.10*	18.5	
		c	48.5	0	48.5	2.35	21.7	
34H	<i>Carpinus laxiflora</i>	a	48.8	10.5	59.4	6.68	13.3	
		b	52.2	0.1	52.3	2.52*	20.0	
		c	50.1	0	50.1	2.23	23.5	
35D	<i>Ostrya japonica</i>	a	44.5	10.8	55.3	3.30	15.8	
		b	49.5	0.3	49.8	3.06*	23.4	
		c	48.7	0.1	48.7	2.82	24.1	
36F	<i>Castanea crenata</i>	a	50.3	3.2	53.4	12.35	8.2	} Disintegrated by mechanical method Total alkali 19%
		b	49.8	1.6	51.4	10.11	—	
		c	46.2	0.7	46.9	5.62	13.5	
		d	45.9	0.3	46.2	3.93*	13.6	
37N	<i>Shiia Sieboldii</i>	a			59.7			
		b	41.1	12.0	53.1	9.80	10.8	
		c	47.4	0.4	47.8	6.10	12.2	
		d	46.8	0.2	47.0	4.63*	14.7	
38E	<i>Fagus crenata</i>	a	51.8	1.6	53.3	3.26*	19.5	
		b	51.1	0.2	51.3	2.03	25.3	
		c	48.1	0	48.1	1.52	27.5	
38F	<i>Fagus crenata</i>	a	51.6	2.9	54.4	5.10	18.9	
		b	49.7	0	49.8	2.19*	25.8	
		c	48.7	0	48.7	1.75	29.1	
38H	<i>Fagus crenata</i>	a	50.0	0	50.1	2.98*	26.6	
		b	48.1	0	48.1	2.08	29.0	
		c	46.6	0	46.6	1.49	29.8	

番号 No.	樹 種 Species	パルプ化 条件 Pulping condi- tion	収 率 % Yield %			ローエ価 Roe number	白度色 Bright- ness	備 考 Note
			精 選 Scre- ened	粕 Screen- ings	全 Total			
38K	<i>Fagus crenata</i>	a	50.9	1.2	52.1	3.98	17.2	
		b	49.4	0.1	49.4	1.92*	20.1	
		c	48.1	0	48.1	1.73	26.1	
38L	<i>Fagus crenata</i>	a	51.4	2.7	54.1	5.00	19.0	
		b	48.3	0.1	48.3	2.07*	28.1	
		c	46.3	0	46.3	1.48	—	
39H	<i>Fagus japonica</i>	a	49.7	0.9	50.5	3.56*	19.0	
		b	49.0	0.1	49.1	2.22	23.7	
		c	47.1	0	47.1	1.48	25.1	
40N	<i>Cyclobalanopsis acuta</i>	a	45.5	5.5	51.0	5.61	15.0	
		b	46.6	0.3	46.9	2.59*	18.3	
		c	45.4	0.1	45.5	1.94	20.0	
41N	<i>Cyclobalanopsis myrsinaefolia</i>	a	47.6	4.5	52.2	5.01	15.4	
		b	49.3	0.5	49.8	2.34*	17.2	
		c	46.7	0.2	46.9	1.57	18.6	
43N	<i>Cyclobalanopsis gilva</i>	a	47.0	1.5	48.5	2.49	19.3	
		b	46.6	0.1	46.7	1.86*	20.7	
		c	44.2	0	44.2	1.57	22.0	
44H	<i>Quercus acutissima</i>	a	44.4	6.4	50.8	4.86	18.7	
		b	48.8	0.1	49.0	2.77*	27.1	
		c	47.9	0	47.9	2.32	28.7	
45C	<i>Quercus crispula</i>	a	47.7	6.2	53.9	6.28	17.7	
		b	49.1	0.3	49.4	3.03*	24.5	
		c	49.0	0	49.0	2.29	24.9	
45D	<i>Quercus crispula</i>	a	50.7	0.8	51.5	3.29*	19.4	
		b	50.1	0.1	50.1	1.74	28.2	
		c	45.9	0.1	45.9	1.55	34.5	
45F	<i>Quercus crispula</i>	a	53.1	1.1	54.2	11.96	10.9	
		b	47.6	0.2	47.8	2.10*	19.8	
		c	46.5	0.1	46.5	1.93	21.2	
45K	<i>Quercus crispula</i>	a	44.4	6.6	51.0	5.21	19.4	
		b	48.6	0.1	48.7	2.37*	21.0	
		c	45.8	0.1	45.9	1.73	27.6	
46H	<i>Quercus serrata</i>	a	47.8	4.4	52.2	4.32	19.8	
		b	50.4	0	50.4	2.55*	26.1	
		c	49.0	0	49.0	2.25	27.2	
47C	<i>Ulmus propinqua</i>	a	46.7	7.0	53.7	4.88	24.1	
		b	49.7	0.2	49.9	2.66*	29.1	
		c	48.3	0	48.3	1.70	30.6	
48H	<i>Zelkova serrata</i>	a	48.8	0	48.8	2.38*	25.7	
		b	46.7	0	46.7	1.63	27.0	
		c	45.6	0	45.6	1.49	28.3	
49N	<i>Morus bombycis</i>	a	46.4	9.9	56.3	6.29	13.0	
		b	51.3	0.9	52.1	4.51	15.0	
		c	50.2	0.1	50.3	3.36*	16.5	
50D	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	a	46.0	4.7	50.7	5.65	11.3	
		b	48.0	0.3	48.2	3.43*	13.3	
		c	47.6	0	47.6	2.49	15.4	

Table 8. (つづき) (Continued)

番号 No.	樹 種 Species	パルプ化 条件 Pulping condi- tion	収 率 % Yield %			ローエ価 Roe number	白 色 度 Bright- ness	備 考 Note
			精 選 Screen- ed	粕 Screen- ings	全 Total			
51D	<i>Magnolia obovata</i>	a	47.9	1.7	49.6	3.42*	25.0	
		b	47.6	0.2	47.8	2.23	28.1	
		c	46.0	0	46.0	1.74	29.6	
52N	<i>Cinnamomum Camphora</i>	a	48.9	0.2	49.0	4.91	18.9	
		b	47.3	0.7	48.0	2.47*	22.7	
		c	45.5	0	45.5	2.02	24.2	
53N	<i>Machilus Thunbergii</i>	a	50.2	0.2	50.4	5.07	16.3	
		b	47.9	0	47.9	2.16*	19.1	
		c	46.4	0	46.4	2.02	19.5	
54N	<i>Distylium racemosum</i>	a	43.1	6.1	49.2	5.35	8.6	
		b	44.4	0.4	44.9	2.76*	11.0	
		c	42.7	0	42.7	2.00	12.8	
55 I	<i>Prunus donarium</i>	a	45.8	8.9	54.6	5.76	14.7	
		b	51.3	0.2	51.6	2.12*	22.9	
		c	50.2	0	50.2	1.95	24.7	
56F	<i>Maackia amurensis</i> (var.)	a	52.9	4.1	57.0	4.93	18.4	
		b	54.0	0.1	54.1	2.66*	20.7	
		c	51.7	0	51.7	2.14	23.3	
57H	<i>Phellodendron sacchalinense</i>	a	53.2	0.2	53.5	2.38*	25.5	} Liq. to wood ratio 6 l/kg
		b	52.6	0	52.6	1.93	27.4	
		c	51.5	0	51.5	1.49	29.2	
59D	<i>Acer mono</i>	a	50.6	0.9	51.5	3.33*	27.3	
		b	50.6	0	50.6	1.89	30.5	
		c	49.2	0	49.2	1.45	32.6	
60 I	<i>Aesculus turbinata</i>	a	43.7	6.9	50.7	7.81	16.9	
		b	46.7	1.0	47.7	5.80	20.6	
		c	46.4	0	46.4	4.16*	22.3	
61C	<i>Tilia japonica</i>	a	48.4	6.4	54.7	3.89	19.7	
		b	52.0	0.4	52.4	2.09*	26.8	
		c	50.7	0	50.8	1.87	28.6	
62C	<i>Tilia Maximowicziana</i>	a	38.8	17.4	56.1	5.28	15.5	
		b	50.5	0.4	50.8	3.55*	31.4	
		c	49.4	0	49.4	1.98	32.0	
63M	<i>Stewartia monadelphica</i>	a	45.8	5.8	51.6	5.00	15.9	
		b	47.1	0.2	47.3	2.11*	21.7	
		c	46.7	0	46.7	1.93	22.3	
64D	<i>Kalopanax ricinifolium</i>	a	52.5	0.4	52.9	2.75*	18.4	
		b	52.2	0	52.2	2.60	21.1	
		c	50.4	0	50.4	2.24	21.7	
65 I	<i>Cornus controversa</i>	a	45.8	6.4	52.2	6.06	15.4	
		b	49.0	0.8	49.8	2.45*	21.1	
		c	48.2	0	48.2	1.91	25.7	
66H	<i>Fraxinus commemoralis</i>	a	47.1	2.0	49.1	6.67	21.1	
		b	46.8	0	46.8	4.90	26.4	
		c	45.4	0	45.4	3.20*	28.1	
67D	<i>Fraxinus mandshurica</i>	a	49.9	1.3	51.2	3.33*	21.5	
		b	49.9	0	49.9	2.24	27.0	
		c	48.8	0	48.8	2.02	27.2	

番号 No.	樹 種 Species	パルプ化 条件 Pulping condi- tion	収 率 % Yield %			ローエ価 Roe number	白色度 Bright- ness	備 考 Note
			精 選 scre- ened	粕 screen- ings	全 total			
68C	<i>Fraxinus Sieboldiana</i>	a	46.6	1.8	47.4	2.81*	26.2	
		b	45.9	0	45.9	1.70	30.8	
		c	44.8	0	44.8	1.41	32.7	
69H	<i>Paulownia tomentosa</i>	a	36.0	18.1	54.0	8.90	16.2	Liq. to wood ratio 6 l/kg Total alkali 19%
		b	39.4	11.8	51.2	6.07	20.1	
		c	47.4	0.4	47.8	3.48	20.2	
		d	46.8	0	46.8	2.63*	26.4	
70N	<i>Shiia cuspidata</i>	a	53.7	0.2	53.9	3.81	20.9	
		b	51.7	0	51.7	2.75*	22.1	
		c	50.7	0	50.7	2.15	23.1	
71C	<i>Toisusu Urbaniana</i>	a	53.8	6.3	60.0	8.47	24.7	Liq. to wood ratio 5 l/kg
		b	56.4	0.2	56.6	2.16*	29.5	
		c	55.5	0	55.5	1.41	33.0	

標準ローエ価を示すパルプを漂白試験に使用した (* での他のパルプと区別してある)。

The pulps showing standard Roe numbers, which were distinguished from other samples by dot sign, were used for bleaching test.

度は増加している。

標準ローエ価, 針葉樹パルプでは 5 ± 1.5 , 広葉樹パルプでは 3 ± 1 のパルプをうるためには, 針葉樹では 19/28 個体 (67.9%) が c 条件を必要とし, 広葉樹では 32/51 個体 (62.7%) が b 条件を必要とした。一応この条件を針葉樹, 広葉樹それぞれから漂白用パルプを得るための標準条件と考えると, 標準ローエ価を示すパルプを得るために, これ以外の蒸解条件を必要とする樹種は, 活性アルカリ添加量の大小により, 蒸解し難い樹種, 蒸解しやすい樹種とに分けられる。それらは次のようになる。

針 葉 樹

蒸解しやすい樹種 7 樹種 (b 条件: アルカリ添加量 17%, 液比 5 l/kg, 薬液濃度 34 g/l)

アカマツ(15L), アカマツ(15F), クロマツ(17N), ウラジロモミ(5H), シラベ(8H)*

スギ(18G)*: d 条件 (アルカリ添加量 21%, 液比 6 l/kg のため, 薬液濃度は 35 g/l となり, ほぼ b 条件に近くなる)。

スギ(18I)*: c 条件 (アルカリ添加量 19%, 液比 6 l/kg のため, 薬液濃度は 32 g/l となり, a, b 条件の間になる)。

* の樹種はパルプのローエ価が標準ローエ価より高く蒸解不足。

蒸解し難い樹種 2 樹種

d 条件 (アルカリ添加量 21%, 液比 5 l/kg)

カヤ(2N)

e 条件 (アルカリ添加量 23%, 液比 5 l/kg)

コウヤマキ(19J)

広 葉 樹

蒸解しやすい樹種 14 樹種

a 条件 (アルカリ添加量 13%, 液比 4 l/kg, 薬液濃度 32.5 g/l)

ヤマナラシ(26C), ブナ(38E), ブナ(38H), イヌブナ(39H), ミズナラ(45D), ケヤキ(48H),

ホオノキ(51D), キハダ(57H), イタヤカエデ(59D), ハリギリ(64D), ヤチダモ(67D), アオダモ(68C)

キリ(69H): d 条件 (アルカリ添加量 19%, 液比 6 l/kg のため, 薬液濃度は 31.7 g/l となり a 条件に近い)。

オオバヤナギ(71C): b 条件 (アルカリ添加量 15%, 液比 5 l/kg のため, 薬液濃度は 30 g/l となり a 条件に近い)。

蒸解し難い樹種 5 樹種

c 条件 (アルカリ添加量 17%, 液比 4 l/kg)

トチノキ(60 I), シオジ(66H), クワ(49N)

d 条件 (アルカリ添加量 19%, 液比 4 l/kg)

クリ(36F), シイノキ(37N)

上記の結果から日本産主要樹種は, 針葉樹, 広葉樹ともに, クラフト法によりパルプ化し難いものは非常に少ないことが明らかである。

パルプの性質の比較評価の基準としてローエ価をとり, 大体同一レベルの範囲にある標準ローエ価を示すパルプについて, 諸性質の比較検討を行なった。

パルプ収率, 未漂白パルプ白色度の分布の状態は, Fig. 8, Fig. 9 に示すとおりである。

図に明らかなように, 針葉樹, 広葉樹ともに収率, 白色度の分布はかなり広範囲にわたっており, しかも広葉樹パルプの収率以外はきわだったピークが見られない。このことは日本産の樹種は, パルプ化は比




Fig. 8 パルプ収率の度数分布
Histogram of pulp yield.

較的容易であるが, パルプの性質は樹種によりかなりの差があることを示していると思われる。

次にパルプ収率, 未漂白パルプ白色度について, その大小を3段階に区分して, 針葉樹, 広葉樹別に類別すると次のようになる。

パルプ収率

針葉樹

大きい樹種 (47.6%以上) 5 樹種

ウラジロモミ(5H), シラベ(8H),




Fig. 9 白色度 (未漂白) の度数分布
Histogram of brightness.

アカマツ(15F), クロマツ(17N), スギ(18G)

中程度の樹種 (42.6~47.5%) 14樹種

アオモリトドマツ(6F), トドマツ(7D), エゾマツ(10C), アカエゾマツ(11C), トウヒ(12J), ア
カマツ(15L), アカマツ(15I), ヒメコマツ(16K), スギ(18N), スギ(18I), ヒノキ(20J), サワ
ラ(21J), アスナロ(23J), ヒノキアスナロ(24J)

小さい樹種 (42.5%以下) 9樹種

イチイ(1J), カヤ(2N), イヌマキ(3M), モミ(4M), カラマツ(9J), トガサワラ(13M), ツガ
(14M), コウヤマキ(19J), ネズコ(22J)

広葉樹

大きい樹種 (53.6%以上) 6樹種

ドロノキ(25C), ヤマナラシ(26C), サワグルミ(29H), シラカンバ(32B), イヌエンジュ(56F),
オオバヤナギ(71C)

中程度の樹種 (46.6~53.5%) 41樹種

オニグルミ(28F), ヤマハンノキ(74I), ミズメ(31H), マカンバ(33D), アカシデ(34H), アサダ
(35D), シイノキ(37N), ブナ(38E), ブナ(38F), ブナ(38H), ブナ(38K), ブナ(38L), イスブ
ナ(39H), アカガシ(40N), シラカシ(41N), イチイガシ(43N), クスギ(44H), ミズナラ(45C),
ミズナラ(45D), ミズナラ(45F), ミズナラ(45K), コナラ(46H), ハルニレ(47C), ケヤキ(48H),
ヤマグワ(49N), カツラ(50D), ホオノキ(51D), クスノキ(52N), タブノキ(53N), ヤマザクラ
(55I), キハダ(57H), イタヤカエデ(59D), シナノキ(61C), オオバボダイジュ(62C), ヒメシャ
ラ(63M), ハリギリ(64D), ミズキ(65I), ヤチダモ(67D), アオダモ(68C), キリ(69H), コジイ
(70N)

小さい樹種 (46.5%以下) 4樹種

クリ(36F), イスノキ(54N), トチノキ(60I), シオジ(66H)

未漂白パルプの白色度

針葉樹

高い樹種 (27.6 以上) 6樹種

トドマツ(7D), エゾマツ(10C), アカエゾマツ(11C), コウヤマキ(19J), ヒノキ(20J), サワラ
(21J)

中程度の樹種 (20.6~27.5) 14樹種

カヤ(2N), ウラジロモミ(5H), アオモリトドマツ(6H), シラベ(8H), トウヒ(12J), アカマツ
(15I), ヒメコマツ(16K), クロマツ(17N), スギ(18N), スギ(18G), スギ(18I), ネズコ(22J),
アスナロ(23J), ヒノキアスナロ(24F)

低い樹種 (20.5 以下) 8樹種

イチイ(1J), イヌマキ(3M), モミ(4M), カラマツ(9J), トガサワラ(13M), ツガ(14M), アカマ
ツ(15L), アカマツ(15F)

広葉樹

高い樹種 (26.6 以上) 12樹種

ドロノキ(25C), ヤマナラシ(26C), シラカンバ(32B), ブナ(38H), ブナ(38L), クヌギ(44H),
ハルニレ(47C), イタヤカエデ(59D), シナノキ(61C), オオバボダイジュ(62C), シオジ(66H),
オオバヤナギ(71C)

中程度の樹種 (19.6~26.5) 26樹種

オニグルミ(28F), サワグルミ(29H), ヤマハンノキ(74I), ミズメ(31H), アカシデ(34H), アサ
ダ(35D), ブナ(38F), ブナ(38K), イチイガシ(43N), ミズナラ(45C), ミズナラ(45F), ミズナ
ラ(45K), コナラ(46H), ケヤキ(48H), ホオノキ(51D), クスノキ(52N), ヤマザクラ(55I), イ
ヌエンジュ(56F), キハダ(57H), トチノキ(60I), ヒメシャラ(63M), ミズキ(65I), ヤチダモ
(67D), アオダモ(68C), キリ(69H), コジイ(70N)

低い樹種 (19.5 以下) 13樹種

マカンバ(33D), クリ(36F), シイノキ(37N), ブナ(38E), イヌブナ(39H), アカガシ(40N),
シラカシ(41N), ミズナラ(45D), ヤマグワ(49N), カツラ(50D), タブノキ(53N), イスノキ(54
N), ハリギリ(64D)

これによると、パルプ収率では針葉樹は約半数が中程度の収率(42.6~47.5%)を示し、また収率42.5%以下の樹種は全体の32%(9樹種)もあることが明らかである。いっぽう広葉樹の場合は、全体の80%(41樹種)が中程度の収率(46.6~53.5%)を示し、収率46.5%以下の樹種は8%(4樹種)で針葉樹と比較するとかなり少ない。広葉樹パルプの収率が針葉樹パルプより高いのは、ホロセルロース、リグニン含有量の差がかなり影響しているものと考えられる。

未漂白パルプの白色度については、針葉樹、広葉樹ともに中程度の数値を示すものは大体全体の半数で、白色度の高い樹種、低い樹種の割合も比較的似かよった傾向を示している。しかし広葉樹パルプの中で高い白色度を示す12樹種のうち、8樹種が北海道産であることは興味深い。また一般に、針葉樹パルプより、広葉樹パルプの白色度は低い値を示している。

4.3. 漂 白

漂白パルプの性質は、Table 9 のとおりである。

供試材パルプの漂白歩どまりは、針葉樹パルプで90.6~98.8%, 広葉樹パルプで89.5~98.8%でかなり広い範囲にわたっている。いま漂白歩どまりの低い樹種を針葉樹、広葉樹別に抽出すると次のようになる。

	ローエ価	漂白歩どまり(対パルプ)%	白色度(漂白)
針 葉 樹	ウラジロモミ(5H)	5.60	92.8
	シラベ(8H)	6.82	92.3
	トウヒ(12J)	6.75	92.3
	トガサワラ(13M)	5.65	93.0
	ヒメコマツ(16K)	6.86	92.4
	スギ(18G)	8.68	90.6
	サワラ(21J)	6.28	92.3
広 葉 樹	ヤマナラシ(26C)	2.32	92.6
	サワグルミ(29H)	3.12	89.5
	コナラ(46H)	2.55	92.3
	ハルニレ(45D)	3.29	93.6
	シナノキ(61C)	2.09	92.9
	オオバヤナギ(71C)	2.16	92.9

Table 9. 漂白硫酸塩パルプの性質

Properties of bleached sulphate pulps

I. 針葉樹 Softwood

番号 No.	樹 種 Species	パルプ化 条件 Pulping condi- tion	ローエ価 Roe number	白 色 度 Brightness		収 率 % Yield %	
				未 漂 白 un- bleached	漂 白 bleached	対未漂白 パルプ un- bleached pulp basis	対絶乾木 材 o. d. wood basis
1J	<i>Taxus cuspidata</i>	c	6.67	20.3	83.0	94.6	37.6
2N	<i>Torreya nucifera</i>	d	6.32	25.8	73.4	94.3	38.0
3M*	<i>Podocarpus macrophyllus</i>	c	6.05	19.7	88.2	94.1	37.8
4M*	<i>Abies firma</i>	c	5.47	19.4	87.8	97.2	40.7
5H	<i>Abies homolepis</i>	c	5.60	21.8	76.3	92.8	45.4
6F*	<i>Abies Mariesii</i>	c	4.64	23.4	89.2	95.0	41.6
7D	<i>Abies sachalinensis</i>	c	4.96	29.0	87.5	94.8	43.7
8H	<i>Abies Veitchii</i>	c	6.82	22.7	86.7	92.3	44.8
9J	<i>Larix leptolepis</i>	c	4.13	20.5	85.0	98.6	40.0
10C	<i>Picea jezoensis</i>	c	3.57	28.3	89.2	95.5	44.4
11C	<i>Picea Glehnii</i>	c	4.83	29.1	89.8	97.0	45.2
12J	<i>Picea hondoensis</i>	d	6.75	25.1	87.5	92.3	43.0
13M*	<i>Pseudotsuga japonica</i>	c	5.65	17.1	89.6	93.0	38.1
14M*	<i>Tsuga Sieboldii</i>	c	4.61	20.0	89.9	98.6	41.5
15L*	<i>Pinus densiflora</i>	b	5.46	18.2	87.6	97.1	43.6
15F*	"	b	4.92	19.6	89.7	95.0	43.9
15I	"	c	4.54	24.9	86.9	96.3	45.7
16K	<i>Pinus pentaphylla</i>	c	6.86	22.8	83.8	92.4	40.2
17N	<i>Pinus Thunbergii</i>	b	4.98	24.7	88.7	97.6	46.7
18N	<i>Cryptomeria japonica</i>	c	6.08	25.0	76.3	98.8	44.1
18G	"	d	8.68	22.3	73.9	90.6	43.0
18I	"	d	6.85	22.6	79.9	93.6	42.1
19J	<i>Sciadopitys verticillata</i>	e	6.47	34.7	75.8	95.5	40.8
20J	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	c	6.25	28.1	82.1	96.5	44.6
21J	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	c	6.28	31.5	65.0	92.3	41.2
22J	<i>Thuja Standishii</i>	c	5.42	24.1	84.3	98.6	40.6
23J	<i>Thujopsis dolabrata</i>	c	6.16	24.1	83.8	98.6	43.0
24F*	<i>Thujopsis dolabrata</i> (var.)	c	5.32	25.5	89.4	97.5	43.3

II. 広葉樹 Hardwood

25C	<i>Populus Maximowiczii</i>	b	2.15	32.3	90.0	96.1	55.7
26C	<i>Populus Sieboldii</i>	a	2.32	28.3	89.3	92.6	51.3
28F*	<i>Juglans Sieboldiana</i>	b	2.52	21.8	88.9	97.0	49.6
29H	<i>Pterocarya rhoifolia</i>	b	3.12	25.5	87.2	89.5	47.9
74I	<i>Alnus hirsuta</i> (var.)	c	2.90	25.3	83.3	96.8	48.2
31H	<i>Betula grossa</i>	b	2.96	21.6	87.9	96.9	49.7
32B	<i>Betula platyphylla</i>	b	2.39	27.1	88.3	96.0	51.7
33D	<i>Betula Maximowicziana</i>	b	3.10	18.5	86.6	94.9	50.1
34H	<i>Carpinus laxiflora</i>	b	2.52	20.0	86.6	96.3	50.3
35D	<i>Ostrya japonica</i>	b	3.06	23.4	88.3	95.8	47.4
36F*	<i>Castanea crenata</i>	d	3.93	13.6	90.9	95.4	43.8
37N	<i>Shiia Sieboldii</i>	d	4.63	14.7	91.6	95.3	44.6
38E	<i>Fagus crenata</i>	a	3.26	19.5	88.4	95.3	49.3
38F*	"	b	2.19	25.8	90.4	98.8	49.1
38K	"	b	1.92	20.1	88.2	98.0	48.3
38L*	"	b	2.07	28.1	88.8	95.4	46.0
38H	"	a	2.98	26.6	88.4	95.6	47.8

Table 9. (つづき) (Continued)

番号 No.	樹 種 Species	パルプ化 条件 Pulping condi- tion	ローエ価 Roe number	白 色 度 Brightness		収 率 % Yield %	
				未 漂 白 un- bleached	漂 白 bleached	対未漂白 パルプ un- bleached pulp basis	対絶乾木 材 o. d. wood basis
39H	<i>Fagus japonica</i>	a	3.56	19.0	86.5	95.9	47.6
40N	<i>Cyclobalanopsis acuta</i>	b	2.59	18.3	86.5	95.6	44.5
41N	<i>Cyclobalanopsis myrsinaefolia</i>	b	2.34	17.2	84.4	98.6	48.6
43N	<i>Cyclobalanopsis gilva</i>	b	1.86	20.7	89.6	95.5	44.9
44H	<i>Quercus acutissima</i>	b	2.77	27.1	89.6	96.7	47.2
45F*	<i>Quercus crispula</i>	b	2.10	19.8	90.4	96.0	45.7
45K	"	b	2.37	21.0	88.0	95.1	46.2
45D	"	a	3.29	19.4	86.6	93.6	47.5
45C	"	b	3.03	24.5	91.1	96.7	47.5
46H	<i>Quercus serrata</i>	b	2.55	26.1	90.8	92.3	46.5
47C	<i>Ulmus propinqua</i>	b	2.66	29.1	90.8	95.3	47.3
48H	<i>Zelkova serrata</i>	a	2.38	25.7	87.9	94.7	46.1
49N	<i>Morus bombycis</i>	c	3.36	16.5	82.9	96.0	48.2
50D	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	b	3.43	13.3	89.0	94.6	45.4
51D	<i>Magnolia obovata</i>	a	3.42	25.0	89.6	96.2	46.1
52N	<i>Cinnamomum Camphora</i>	b	2.47	22.7	85.4	95.4	45.1
53N	<i>Machilus Thunbergii</i>	b	2.16	19.1	83.4	97.9	46.9
54N	<i>Distylium racemosum</i>	b	2.76	11.0	82.4	96.0	42.6
55I	<i>Prunus donarium</i>	b	2.12	22.9	92.9	96.8	49.7
56F*	<i>Maackia amurensis</i> (var.)	b	2.66	20.7	86.0	95.2	51.4
57H	<i>Phellodendron sachalinense</i>	a	2.38	25.5	87.2	97.4	51.9
59D	<i>Acer mono</i>	a	3.33	27.3	91.4	95.6	48.4
60I	<i>Aesculus turbinata</i>	c	4.18	22.3	91.8	94.6	43.8
61C	<i>Tilia japonica</i>	b	2.09	26.8	90.4	92.9	48.3
62C	<i>Tilia Maximowicziana</i>	b	3.55	31.4	90.5	96.1	48.5
63M*	<i>Stewartia monadelphica</i>	b	2.11	21.7	90.8	95.7	45.1
64D	<i>Kalopanax ricinifolium</i>	a	2.75	18.4	86.2	95.4	50.1
65I	<i>Cornus controversa</i>	b	2.45	24.1	90.1	96.8	47.4
66H	<i>Fraxinus commemoralis</i>	c	3.20	28.1	85.0	95.4	43.3
67D	<i>Fraxinus mandshurica</i>	a	3.33	21.5	89.4	97.8	48.8
68C	<i>Fraxinus Sieboldiana</i> (var.)	a	2.81	26.2	91.6	94.3	43.9
69H	<i>Paulownia tomentosa</i>	d	2.63	26.4	87.8	96.6	45.2
70N	<i>Shiia cuspidata</i>	b	7.75	22.1	88.5	97.1	50.3
71C	<i>Toisusu Urbaniana</i>	b	2.16	29.5	90.7	92.9	52.3

* のパルプは 5 段法 (C-E-H-E-D) により漂白した。

H : Ca-ハイポ 2% (対パルプ) 有効塩素

The pulps with * sign were bleached by C-E-H-E-D Process.

H : Ca-hypo 2% (pulp basis) (available chlorine)

針葉樹パルプの場合、7 樹種のうち 4 樹種は標準ローエ価の上限值より高い値を示す試料について、実験を行なっているので、他の試料より漂白歩どまりは当然低くなることが考えられる。したがって、厳密な意味での漂白歩どまりの低い樹種は、ウラジロモミ(5H)、トガサワラ(13M)、サワラ(21J)の 3 樹種となる。またこれらのうちウラジロモミ、サワラの漂白後の白色度は、それぞれ 76.3、65.0 で漂白性もかなり悪い。

広葉樹パルプの場合は、漂白歩どまりの低い樹種のなかで、標準ローエ価の上限值以上の値を示す資料は認められなかった。漂白パルプの白色度は、86.6~90.8 で、漂白性が問題になる樹種は認められない。




Fig. 10 白色度 (漂白) の度数分布
Histogram of brightness (bleached).

漂白パルプの白色度は針葉樹では 65.0~89.9, 広葉樹では 82.4~92.9 で, 広葉樹パルプの方が高い。さきに述べたように, 未漂白パルプの白色度は広葉樹の方が針葉樹より低かったが, 漂白パルプではこの関係が逆転している。白色度の分布の状態は, Fig. 10 のとおりである。

これによると, 広葉樹パルプの場合は, 針葉樹パルプの場合より分布の範囲はかなり狭く, また平均値付近に顕著なピークが認められるが, 針葉樹パルプでは分布幅は広く, きわだったピークは認められない。

次に漂白パルプの白色度について, その大小を 3 段階に区分して類別すると次のようになる。

漂白パルプの白色度

針葉樹

高い樹種 (87.6 以上) 11 樹種

イヌマキ(3M), モミ(4M), アオモリトドマツ(6F), エゾマツ(10C), アカエゾマツ(11C), トガサワラ(13M), ツガ(14M), アカマツ(15F), アカマツ(15L), クロマツ(17N), ヒノキアスナロ(24F)

中程度の樹種 (80.6~87.5) 10 樹種

イチイ(1J), トドマツ(7D), シラベ(8H), カラマツ(9J), トウヒ(12J), アカマツ(15I), ヒメコマツ(16K), ヒノキ(20J), ネズコ(22J), アスナロ(23J)

低い樹種 (80.5 以下) 7 樹種

カヤ(2N), ウラジロモミ(5H), スギ(18N), スギ(18G), スギ(18I), コウヤマキ(19J), サワラ(21J)

広葉樹

高い樹種 (90.6 以上) 11 樹種

クリ(36F), シイ(37N), ミズナラ(45C), コナラ(46H), ハルニレ(47C), ヤマザクラ(55I), イタヤカエデ(59D), トチノキ(60I), ヒメシャラ(63M), アオダモ(68C), オオバヤナギ(71C)

中程度の樹種 (85.6~90.5) 33 樹種

ドロノキ(25C), ヤマナラシ(26C), オニグルミ(28F), サワグルミ(29H), ミズメ(31H), シラカンバ(32B), マカンバ(33D), アカシデ(34H), アサダ(35D), ブナ(38E), ブナ(38F), ブナ(38K), ブナ(38L), ブナ(38H), イヌブナ(39H), アカガシ(40N), イチイガシ(43N), クヌギ(44H), ミズナラ(45F), ミズナラ(45K), ミズナラ(45D), ケヤキ(48H), カツラ(50D), ホオノキ(51D), イヌエンジュ(56F), キハダ(57H), シナノキ(61C), オオバボダイジュ(62C), ハリギリ(64D),

ミズキ(65I), ヤチダモ(67D), キリ(69H), コジイ(70N)

低い樹種 (85.5 以下) 7 樹種

ヤマハンノキ(74I), シラカシ(41N), ヤマグワ(49N), クスノキ(52N), タブノキ(53N), イスノキ(54N), シオジ(66H)

針葉樹の場合, 7 樹種 (全体の 25%) が白色度 80.5 以下で, 漂白性の悪いグループにはいるが, スギは生産地を異にする試料が全部ここに含まれている。

広葉樹の場合は, 白色度の低い樹種は 7 樹種 (全体の 13.7%) で, 九州地区 (熊本局管内) 産の樹種が大部分を占めている (5 樹種)。

ブナ, ミズナラについては, 生産地の違いによる差は認められなかった。

4.4. パルプの強度

未漂白および漂白パルプの強度試験の結果は, Table 10, 11 のとおりである。なお, 各蒸解条件により得られた未漂白パルプの強度試験結果は, 一括して付表に示した。

パルプの諸強度は, 針葉樹の場合は密度 0.75~0.89 g/ml (平均 0.82 g/ml), 裂断長 6.1~13.8 km (平均 9.8 km), 比破裂強さ 4.0~11.2 (平均 7.6), 比引裂強さ 85.6~192.7 (平均 127.0), 耐折強さ 89~7000 (平均 2465)。

広葉樹の場合は, 密度 0.74~1.01 g/ml (平均 0.88 g/ml), 裂断長 5.9~14.6 km (平均 10.3 km), 比破裂強さ 5.0~11.4 (平均 7.7), 比引裂強さ 74.7~155.4 (平均 106.8), 耐折強さ 140~6000 (平均 1723) で, 平均値の比較では引裂強さ, 耐折強さは針葉樹が高く, 引張り, 破裂強さは両者ほぼ同程度である。

各種強度の分布状態は Fig. 11~15 のとおりである。

図に明らかなように, 各強度は広葉樹パルプでは平均値を中心にして, 鋭い大きなピークが見られるが, 針葉樹パルプの場合は, 比較的幅広いゆるやかなピークとなっている。

次にパルプの諸強度について, その大小を 3 段階に区分して (次表),

	針 葉 樹			広 葉 樹		
	C	B	A	C	B	A
シート密度 (g/ml)	~0.75	~0.85	0.86~	~0.85	~0.95	0.96~
裂断長 km	~7.5	~12.5	12.6~	~7.5	~12.5	12.6~
比破裂強さ	~5.5	~10.5	10.6~	~5.5	~10.5	10.6~
比引裂強さ	~105.5	~155.5	155.6~	~95.5	~125.5	125.6~
耐折強さ	~500	~4000	4001~	~500	~2750	2751~

A: 大きい, B: 中程度, C: 小さい。

とすると, 各樹種のパルプ強度は, 針葉樹, 広葉樹別に Table 12, Table 13 のように類別される。

上に述べられているように, 生育地域別に試料を採取したアカマツ, スギ, ブナ, ミズナラについて, パルプ強度の面で生育地の違いによる差は認められなかった。

Table 10. 硫酸塩パルプの強度
Evaluation of sulphate pulps

番号 No.	樹種 Species	パルプ化 条件 Pulping condi- tion	未漂白			漂白			耐折強さ Folding endurance
			ローエ値 number	密度 g/ml	断裂長 km	比破強 factor	比引強 factor	比引強 factor	
1 J	<i>Taxus cuspidata</i>	c	6.67	0.86	6.4	6.4	134.5	6.3	144.6
2 N	<i>Torreya nucifera</i>	d	6.32	0.84	8.7	6.1	91.2	6.3	94.2
3 M	<i>Podocarpus macrophyllus</i>	c	6.05	0.78	7.0	4.5	85.6	7.0	70.9
4 M	<i>Abies firma</i>	c	5.47	0.78	8.5	5.3	121.8	5.6	110.4
5 H	<i>Abies homolepis</i>	c	5.60	0.84	8.8	9.1	117.2	10.3	149.0
6 F	<i>Abies Mariesii</i>	c	4.64	0.83	11.4	8.3	112.1	5.7	84.7
7 D	<i>Abies sachalinensis</i>	c	4.96	0.85	12.3	9.5	128.7	7.1	128.2
8 H	<i>Abies Veitchii</i>	c	6.82	0.89	10.9	10.4	135.6	9.2	146.7
9 J	<i>Larix leptolepis</i>	c	4.13	0.76	9.9	7.3	147.1	6.1	151.4
10 C	<i>Picea jezoensis</i>	c	3.57	0.80	13.2	11.2	121.8	10.1	134.2
11 C	<i>Picea Glehnii</i>	c	4.83	0.77	13.8	10.0	122.9	8.7	127.8
12 J	<i>Picea hondoensis</i>	d	6.75	0.85	10.7	9.7	158.9	9.9	158.6
13 M	<i>Pseudotsuga japonica</i>	c	5.65	0.75	8.1	5.3	134.2	3.7	86.0
14 M	<i>Tsuga Sieboldii</i>	c	4.61	0.77	8.5	5.4	136.8	4.1	86.7
15 L	<i>Pinus densiflora</i>	b	5.46	0.76	11.1	8.3	116.9	5.2	104.0
15 F	"	b	4.92	0.77	11.4	9.7	110.3	5.0	82.7
15 I	"	c	4.54	0.81	10.2	8.0	192.7	4.6	211.4
16 K	<i>Pinus pentaphylla</i>	c	6.86	0.88	9.1	8.2	127.5	9.3	130.0
17 N	<i>Pinus thumbergii</i>	b	4.98	0.81	10.3	7.6	139.7	6.0	160.0
18 N	<i>Cryptomeria japonica</i>	c	6.08	0.81	9.2	6.6	139.9	6.4	131.1
18 G	"	d	8.68	0.80	6.1	8.0	165.8	8.3	155.1
18 I	"	d	6.85	0.83	9.6	8.2	179.4	8.3	142.2
19 J	<i>Sciadopitys verticillata</i>	e	6.47	0.83	6.5	4.0	145.6	4.7	92.8
20 J	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	c	6.25	0.86	9.8	6.9	111.7	5.8	112.6
21 J	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	c	6.28	0.79	9.5	5.0	136.0	6.1	117.9
22 J	<i>Thuja Standishii</i>	c	5.42	0.86	11.7	8.9	112.2	5.1	105.7
23 J	<i>Thuopsis dolabrata</i>	c	6.16	0.85	10.7	7.0	129.7	6.0	125.1
24 F	<i>Thuopsis dolabrata</i> (var.)	c	5.32	0.82	11.6	8.1	107.8	4.9	75.3

坪量 60 g/m², ろ水度 220 ml (カナダ規格)

強度特性は、漂白試験のための標準ローエ値を示すパルプについて比較した。

Basis weight 60 g/m², Freeeness 220 ml Canadian Standard.

Strength properties were compared with the pulps showing standard Roe numbers for bleaching.

Table 11. 硫酸塩パルプの強度
Evaluation of sulphate pulps

広葉樹 Hardwood

番 号 No.	樹 種 Species	パルプ化 条件 Pulping condi- tion	未 漂 白 Unbleached						漂 白 Bleached				
			ローエ価 Roe number	密 度 Density g/ml	裂断長 Breaking length km	比破裂 強 さ Burst factor	比引裂 強 さ Tear factor	耐折強さ Folding endurance	密 度 Density g/ml	裂断長 Breaking length km	比破裂 強 さ Burst factor	比引裂 強 さ Tear factor	耐折強さ Folding endurance
25C	<i>Populus Maximowiczii</i>	b	2.15	0.95	12.6	8.3	83.8	1400	0.98	11.4	7.8	93.6	1100
26C	<i>Populus Sieboldii</i>	a	2.32	0.89	11.5	7.5	90.4	680	0.99	10.5	7.2	92.3	800
28F	<i>Juglans Sieboldiana</i>	b	2.52	0.78	12.2	7.4	110.6	1200	0.86	7.4	4.1	45.7	19
29H	<i>Pterocarya rhoifolia</i>	b	3.12	1.00	14.4	9.5	102.6	3100	1.01	13.8	10.3	94.3	3700
74 I	<i>Alnus hirsuta</i> (var.)	c	2.90	0.91	9.1	7.3	131.1	4000	0.95	7.7	6.1	130.4	1200
31H	<i>Betula grossa</i>	b	2.96	0.91	12.7	9.9	108.2	2000	0.90	12.1	9.1	126.9	2000
32B	<i>Betula platyphylla</i>	b	2.39	0.92	9.0	9.7	109.9	6000	0.98	8.0	7.4	152.7	1400
33D	<i>Betula Maximowicziana</i>	b	3.10	0.87	7.4	6.1	120.4	840	0.88	7.2	5.1	110.2	250
34H	<i>Carpinus laxiflora</i>	b	2.52	0.91	13.3	10.6	92.7	2500	0.93	12.5	9.8	110.4	2200
35D	<i>Ostrya japonica</i>	b	3.06	0.88	11.3	8.4	105.5	1800	0.87	9.0	5.8	122.5	890
36F	<i>Castanea crenata</i>	d	3.93	0.84	11.1	8.4	103.5	1300	0.90	7.9	4.1	49.5	19
37N	<i>Shiia Sieboldii</i>	d	4.63	0.93	6.7	7.1	132.9	2300	0.94	7.3	5.4	121.6	330
38E	<i>Fagus crenata</i>	a	3.26	0.87	9.7	7.9	103.9	3600	0.92	9.7	6.8	110.7	880
38F	"	b	2.19	0.86	10.7	7.3	94.9	590	0.83	8.0	4.4	57.4	31
38K	"	b	1.92	0.86	10.2	7.0	101.4	580	0.84	7.7	4.2	89.7	80
38L	"	b	2.07	0.79	10.8	7.4	102.8	670	0.83	6.8	3.5	51.6	16
38H	"	a	2.98	0.91	9.5	6.4	90.2	760	0.91	9.1	5.6	102.1	360
39H	<i>Fagus japonica</i>	a	3.56	0.89	11.7	7.7	96.7	1400	0.90	11.2	7.7	104.0	930
40N	<i>Cyclobalanopsis acuta</i>	b	2.59	0.83	9.9	6.8	119.1	1800	0.83	7.2	4.5	112.5	220
41N	<i>Cyclobalanopsis myrsinaefolia</i>	a	2.34	0.87	10.4	7.5	119.4	3100	0.85	8.1	5.2	127.8	510
43N	<i>Cyclobalanopsis gilva</i>	b	1.86	0.85	10.1	7.3	118.2	3400	0.83	8.6	5.9	130.3	700
44H	<i>Quercus acutissima</i>	b	2.77	0.81	6.6	5.9	121.4	1500	0.86	6.6	4.4	133.3	77
45F	<i>Quercus crispula</i>	b	2.10	0.78	10.7	7.8	100.9	740	0.86	8.0	4.5	60.3	66
45K	"	b	2.37	0.76	9.3	6.6	104.4	470	0.93	8.1	4.7	104.4	140
45D	"	a	3.29	0.85	9.7	6.9	128.6	1200	0.87	8.1	6.0	113.3	1300
45C	"	b	3.03	0.87	11.4	8.1	89.5	890	0.92	9.4	6.5	107.2	590
46H	<i>Quercus serrata</i>	b	2.55	0.81	8.3	6.1	146.7	1200	0.82	6.5	4.2	144.7	77
47C	<i>Ulmus propinqua</i>	b	2.66	0.86	11.4	8.6	104.8	760	0.91	9.8	6.9	103.6	530

48H	<i>Zelkova serrata</i>	a	2.38	0.88	12.3	10.2	101.2	2000	0.89	9.9	8.3	115.4	2000
49N	<i>Morus bombycis</i>	c	3.36	0.86	5.9	5.1	96.3	140	0.88	5.0	4.1	115.7	45
50D	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	b	3.43	0.82	10.2	7.8	116.2	1600	0.82	8.8	6.0	128.5	900
51D	<i>Magnolia obovata</i>	a	3.42	0.89	10.7	7.5	105.4	1700	0.83	7.8	4.6	125.6	190
52N	<i>Cinnamomum Camphora</i>	b	2.47	0.90	10.5	7.7	98.9	1500	0.88	7.6	4.9	119.8	260
53N	<i>Machilus Thunbergii</i>	b	2.16	0.86	7.8	5.1	121.4	310	0.85	6.0	3.0	112.6	46
54N	<i>Distylium racemosum</i>	b	2.76	0.79	9.5	6.9	128.1	2500	0.80	7.2	4.3	144.0	320
55I	<i>Prunus donarium</i>	b	2.12	0.90	8.0	8.3	116.6	2800	0.96	7.8	5.6	138.0	160
56F	<i>Maackia amurensis</i> (var.)	b	2.66	0.79	7.7	5.0	92.5	170	0.82	7.1	4.1	49.9	15
57H	<i>Phellodendron sachalinense</i>	a	2.38	1.01	13.6	11.1	103.2	3000	0.97	13.2	10.1	91.3	3600
59D	<i>Acer mono</i>	a	3.33	0.95	10.9	7.4	87.8	970	0.87	7.6	4.9	90.5	250
60I	<i>Aesculus turbinata</i>	c	4.18	0.95	8.0	5.4	101.9	340	0.97	5.4	4.1	118.9	110
61C	<i>Tilia japonica</i>	b	2.09	0.95	13.9	10.0	80.3	1800	1.02	12.2	8.4	91.0	2100
62C	<i>Tilia Maximowicziana</i>	b	3.55	0.95	14.6	11.4	78.1	2500	1.03	12.5	10.0	57.4	1400
63M	<i>Stewartia monadelphica</i>	b	2.11	0.74	9.7	7.3	155.4	1300	0.76	6.7	4.1	75.2	31
64D	<i>Kalopanax ricinifolium</i>	a	2.75	0.86	8.9	6.2	74.7	410	0.89	7.6	5.3	83.0	110
65I	<i>Cornus controversa</i>	b	2.45	0.91	9.0	8.1	130.3	3800	0.92	8.2	6.0	160.7	1500
66H	<i>Fraxinus commemoralis</i>	c	3.20	0.92	10.3	7.4	112.6	1200	0.95	9.7	5.9	110.7	570
67D	<i>Fraxinus mandshurica</i>	a	3.33	0.83	9.5	7.1	121.0	850	0.87	8.2	6.2	120.9	260
68C	<i>Fraxinus Sieboldiana</i> (var.)	a	2.81	0.88	10.8	7.5	115.1	700	0.92	9.2	8.4	91.0	510
69H	<i>Paulownia tomentosa</i>	d	2.63	0.98	9.8	6.9	80.9	5500	0.99	8.7	6.3	130.3	2500
70N	<i>Shiia cuspidata</i>	b	2.75	0.91	10.0	8.0	104.7	2500	0.93	8.1	4.9	122.7	350
71C	<i>Toisusu Urbaniana</i>	b	2.16	0.85	11.3	7.6	88.0	520	0.96	11.0	6.3	98.0	620

坪量 60 g/m², ろ水度 220 ml (カナダ規格)

強度的性質は、漂白試験のための標準ローエ価を示すパルプについて比較した。

Basis weight 60 g/m², Freeness 220 ml Canadian Standard.

Strength properties were compared with the pulps showing standard Roe numbers for bleaching.




Fig. 11 シート密度の度数分布
Histogram of sheet density.




Fig. 12 裂断長の度数分布
Histogram of breaking length.




Fig. 13 比破裂強さの度数分布
Histogram of burst factor.




Fig. 14 比引裂強さの度数分布
Histogram of tear factor.




Fig. 15 耐折強さの度数分布
Histogram of folding endurance.

Table 12. パルプ強度の樹種別評価

Classification of strength properties of pulp on each tree species

針葉樹 Softwood

番 号 No.	樹 種 Species	密 度 Density g/ml	裂断長 Breaking length km	比破裂さ Burst factor	比引裂さ Tear factor	耐折強さ Folding endurance
1J	<i>Taxus cuspidata</i>	A	C	B	B	B
2N	<i>Torreya nucifera</i>	B	B	B	C	B
3M	<i>Podocarpus macrophyllus</i>	B	C	C	C	C
4M	<i>Abies firma</i>	C	B	C	B	B
5H	<i>Abies homolepis</i>	B	B	B	B	A
6F	<i>Abies Mariesii</i>	B	B	B	B	B
7D	<i>Abies sachalinensis</i>	B	B	B	B	A
8H	<i>Abies Veitchii</i>	A	B	B	B	A
9J	<i>Larix leptolepis</i>	B	B	B	B	B
10C	<i>Picea jezoensis</i>	B	A	A	B	B
11C	<i>Picea Glehnii</i>	B	A	B	B	B
12J	<i>Picea hondoensis</i>	B	B	B	A	A
13M	<i>Pseudotsuga japonica</i>	C	B	C	B	B
14M	<i>Tsuga Sieboldii</i>	B	B	C	B	B
15F	<i>Pinus densiflora</i>	B	B	B	B	B
15C	"	B	B	B	B	B
15I	"	B	B	B	A	A
16K	<i>Pinus pentaphylla</i>	A	B	B	B	A
17N	<i>Pinus thunbergii</i>	B	B	B	B	B
18N	<i>Cryptomeria japonica</i>	B	B	B	B	C
18G	"	B	C	B	A	B
18I	"	B	B	B	A	B
19J	<i>Sciadopitys verticillata</i>	B	C	C	A	C
20J	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	A	B	B	B	B
21J	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	B	B	C	B	B
22J	<i>Thuja Standishii</i>	A	B	B	B	B
23J	<i>Thujopsis dolabrata</i>	B	B	B	B	B
24F	<i>Thujopsis dolabrata</i> (var.)	B	B	B	B	B

(Note) A : large, B : medium, C : small (Details are shown in the note of Table 13.)

Table 13. パルプ強度の樹種別評価

Classification of strength properties of pulp on each tree species

広葉樹 Hardwood

番 号 No.	樹 種 Species	密 度 Density g/ml	裂断長 Breaking length km	比破裂さ Burst	比引裂さ Tear factor	耐折強さ Folding endurance
25C	<i>Populus Maximowiczii</i>	B	A	B	C	B
26C	<i>Populus Sieboldii</i>	B	B	B	C	B
28F	<i>Juglans Sieboldiana</i>	C	B	B	B	B
29H	<i>Pterocarya rhoifolia</i>	A	A	B	B	A
74I	<i>Alnus hirsuta</i> (var.)	B	B	B	A	A
31H	<i>Betula grossa</i>	B	A	B	B	B
32B	<i>Betula platyphylla</i>	B	B	B	B	A
33D	<i>Betula Maximowicziana</i>	B	C	B	B	B
34H	<i>Carpinus laxiflora</i>	B	A	A	C	B
35D	<i>Ostrya japonica</i>	B	B	B	B	B
36F	<i>Castanea crenata</i>	B	B	B	B	B
37N	<i>Shiia Sieboldii</i>	B	C	B	A	B
38E	<i>Fagus crenata</i>	B	B	B	B	A

番 号	樹 種	密 度	裂 断 長	比 破 裂 さ	比 引 裂 さ	耐 折 強 さ
No.	Species	Density g/ml	Breaking length km	Burst factor	Tear factor	Folding endurance
38F	<i>Fagus crenata</i>	B	B	B	C	B
38H	"	B	B	B	B	B
38K	"	C	B	B	B	B
38L	"	B	B	C	C	B
39H	<i>Fagus japonica</i>	B	B	B	B	B
40N	<i>Cyclobalanopsis acuta</i>	B	B	B	B	B
41N	<i>Cyclobalanopsis myrsinaefolia</i>	C	B	B	B	A
43N	<i>Cyclobalanopsis gilva</i>	B	B	B	B	A
44H	<i>Quercus acutissima</i>	C	C	B	B	B
45C	<i>Quercus crispula</i>	B	B	B	C	B
45D	"	C	B	B	A	B
45F	"	C	B	B	B	B
45K	"	C	B	B	B	C
46H	<i>Quercus serrata</i>	C	B	B	A	B
47C	<i>Ulmus propinqua</i>	B	B	B	B	B
48H	<i>Zelkova serrata</i>	B	B	B	B	B
49N	<i>Morus bombycis</i>	B	C	C	B	C
50D	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	C	B	B	B	B
51D	<i>Magnolia obovata</i>	B	B	B	B	B
52N	<i>Cinnamomum Camphora</i>	B	B	B	B	B
53N	<i>Machilus Thunbergii</i>	B	B	C	B	C
54N	<i>Distylium racemosum</i>	C	B	B	A	B
55I	<i>Prunus donarium</i>	B	B	B	B	A
56F	<i>Maackia amurensis</i> (var.)	C	B	C	C	C
57H	<i>Phellodendron sachalinense</i>	A	A	A	B	A
59D	<i>Acer mono</i>	B	B	B	C	B
60I	<i>Aesculus turbinata</i>	B	B	C	B	C
61C	<i>Tilia japonica</i>	B	A	B	C	B
62C	<i>Tilia Maximowicziana</i>	B	A	A	C	B
63M	<i>Stewartia monadelph</i>	C	B	B	A	B
64E	<i>Kalopanax ricinifolium</i>	A	B	B	C	C
65I	<i>Cornus controversa</i>	B	B	B	A	A
66H	<i>Fraxinus commeoralis</i>	B	B	B	B	B
67D	<i>Fraxinus mandshurica</i>	B	B	B	B	B
68C	<i>Fraxinus Sieboldiana</i> (var.)	B	B	B	B	B
69H	<i>Paulownia tomentosa</i>	A	B	B	C	A
70N	<i>Shiia cuspidata</i>	B	B	B	B	B
71C	<i>Toisusu Urbaniana</i>	B	B	B	C	B

Note

	Softwood			Hardwood		
	C	B	A	C	B	A
Sheet density (g/ml)	~ 0.75	~ 0.85	0.86~	~ 0.85	~ 0.95	0.96~
Breaking length (km)	~ 7.5	~ 12.5	12.6 ~	~ 7.5	~ 12.5	12.6 ~
Burst factor	~ 5.5	~ 10.5	10.6 ~	~ 5.5	~ 10.5	10.6 ~
Tear factor	~105.5	~155.5	155.6 ~	~95.5	~125.5	125.6 ~
Folding endurance	~500	~4000	4001~	~500	~2750	2751~

A : large, B : medium, C : small

5. パルプの性質と化学組成との相関

5.1. 化学組成間の相関

化学組成間の相関を Table 14 に示した。

Table 14. 供試材の性質間の相関
Correlation between wood characteristics

針葉樹 Softwood

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8
X_1 灰 分 Ash							**	
X_2 温水可溶分 Hot water extracts	-0.039		**		**	*		
X_3 アルコール・ベンゼン可 溶分 Et. OH-Benzen extracts	-0.072	0.729		*	**	**		
X_4 ペントサン Pentosan	0.124	-0.240	-0.412					
X_5 ホロセルロース Holocellulose	0.130	-0.497	-0.614	0.052		**		
X_6 α -セルロース α -cellulose	0.175	-0.450	-0.684	0.181	0.878			
X_7 リグニン Lignin	0.635	-0.161	0.182	0.133	0.055	0.260		
X_8 容積密度数(材) Basic density (wood)	0.007	0.071	-0.218	0.159	-0.247	0.018	0.142	

広葉樹 Hardwood

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8
X_1 灰 分								
X_2 温水可溶分	-0.030		**		**	**		
X_3 アルコール・ベンゼン可 溶分	-0.256	0.428			**		*	
X_4 ペントサン	-0.059	-0.153	-0.050				**	*
X_5 ホロセルロース	0.167	-0.717	-0.410	0.160		**		
X_6 α -セルロース	-0.027	-0.530	-0.218	0.016	0.644			
X_7 リグニン	-0.032	0.134	-0.335	-0.387	-0.183	-0.186		
X_8 容積密度数(材)	0.274	0.164	-0.273	0.342	-0.230	-0.105	0.160	

* 5% 水準で有意 Significant at the 5% level.

** 1% 水準で有意 Significant at the 1% level.

針葉樹 0.374 広葉樹 0.276

" 0.478 " 0.357

Table 14 に明らかなように、化学組成間の相関について、針葉樹、広葉樹は大体類似の傾向を示している。すなわち針葉樹の場合は、灰分とリグニン(—)、温水可溶分とアルコール・ベンゼン可溶分(+), ホロセルロース(—), α -セルロース(—), アルコール・ベンゼン可溶分とペントサン(—), ホロセルロース(—), α -セルロース(—), ホロセルロースと α -セルロース(+), との間に、それぞれ有意な相関が認められた。また広葉樹の場合は、温水可溶分とアルコール・ベンゼン可溶分(+), ホロセルロース(—), α -セルロース(—), アルコール・ベンゼン可溶分とホロセルロース(—), リグニン(—), ペントサンとリグニン(—), 容積密度数(+), ホロセルロースと α -セルロース(+), との間にそれぞれ有意な相関が認められた。

これらの結果は、VAN BUIJTENEN らが Loblolly pine について行なった研究結果²⁾, 筆者が南洋材について行なった研究結果³⁾ とほぼ同様である。

5.2. パルプの性質と化学組成との相関

パルプの性質と材質特性との関係については、最近重回帰を使用して解析している例が多いが⁴⁾⁷⁾, さきにも述べたように、この試験では現在のところ、パルプの物理的性質と密接な関係を示す木材繊維の形態的性質の測定値を得るに至っていないので、ここではパルプの性質と化学組成との相互関係は、重回帰による解析は行なわず、単相関を求めこの結果に基づいて検討した (Table 15)。

収 率

パルプ収率に対して有意な相関を示す変数(材の性質)は次のとおりである。

針葉樹 温水可溶分(—), アルコール・ベンゼン可溶分(—), ホロセルロース(+), リグニン(—)

広葉樹 温水可溶分(—), ホロセルロース(+), α -セルロース(+), リグニン(—), 容積密度数(—)

VAN BUIJTENEN ら²⁾は、Loblolly pine についてクラフトパルプを製造した場合、パルプ収率と、 α -セルロース(+), アルコール・ベンゼン可溶分(—), リグニン(—), 容積密度数(+), との間にそれぞれ単相関が存在することを報告しており、筆者³⁾も南洋材について、パルプ収率と温水可溶分(—), アルコール・ベンゼン可溶分(—), ホロセルロース(+), α -セルロース(+), との間にそれぞれ単相関の存在することを認めている。また従来の研究結果では⁴⁾, パルプ収率と材の容積密度数との間に正の相関が存在することが認められているが、この報告では広葉樹の場合に負の相関が認められている。

ローエ価

ローエ価に対して有意な相関を示す変数は次のとおりである。

針葉樹 なし。

広葉樹 α -セルロース(—)

さきに筆者らは³⁾⁵⁾アカマツ、南洋材について、それぞれローエ価と材の容積密度数(—)(アカマツ), ローエ価とホロセルロース(—)(南洋材)との間に単相関の存在することを認めたが、ここではこれらの変数は有意な相関を示していない。

白色度(未漂白)

白色度(未漂白)に対して有意な相関を示す変数は次のとおりである。

針葉樹 容積密度数(—)

広葉樹 温水可溶分(—), ホロセルロース(+), α -セルロース(+), 容積密度数(—)

南洋材について、未漂白パルプの白色度と材の容積密度数(—)との間に単相関の存在することが認め

Table 15. 材の性質とパルプの性質との相関係数
Correlation coefficients between wood characteristics
and pulp properties for sample trees

針葉樹材 Softwood

パルプの性質 Pulp character	X_9	X_{10}	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}	X_{15}	X_{16}	X_{17}
化学組成 Chemical component	収 率 Yield	ローエ価 Roe- No.	白色度 (未漂白) Bright- ness (unble- ached)	白色度 (漂白) Bright- ness (ble- ached)	密 度 (パルプ) Density (pulp)	裂断長 Break- ing length	比破裂 強 さ Burst factor	比引裂 強 さ Tear factor	耐 折 強 さ Folding endu- rance
X_1 灰 分 Ash	-0.201	0.288	-0.086	-0.290	-0.085	-0.233	-0.307	-0.123	-0.439*
X_2 温水可溶分 Hot water extracts	-0.591**	-0.035	0.068	-0.282	0.046	-0.237	-0.318	-0.240	-0.159
X_3 アルコール・ベ ンゼン可溶分 Et. OH-Benzene extracts	-0.457*	0.313	0.338	-0.488**	0.324	-0.372	-0.429*	0.009	-0.161
X_4 ペントサン Pentosan	0.100	-0.020	-0.283	0.183	-0.269	0.033	0.074	-0.003	-0.065
X_5 ホロセルロース Holocellulose	0.374*	-0.174	-0.173	0.284	-0.044	0.382*	0.528**	-0.082	0.221
X_6 α -セルロース α -cellulose	0.138	-0.274	-0.309	0.306	-0.228	0.240	0.267	-0.252	-0.001
X_7 リグニン Lignin	-0.400*	0.308	-0.117	-0.239	-0.111	-0.407*	-0.503**	-0.057	-0.421*
X_8 容積密度数(材) Basic density (wood)	-0.320	-0.337	-0.539**	0.492**	-0.413*	-0.115	-0.246	-0.254	-0.156

広葉樹材 Hardwood

	X_9	X_{10}	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}	X_{15}	X_{16}	X_{17}
X_1 灰 分	0.038	-0.006	-0.024	0.017	-0.207	0.138	0.057	0.079	-0.042
X_2 温水可溶分	-0.450**	0.255	-0.496**	-0.053	-0.139	-0.278*	-0.197	0.223	0.078
X_3 アルコール・ベ ンゼン可溶分	-0.018	0.047	-0.138	-0.254	0.166	-0.174	-0.178	-0.248	0.110
X_4 ペントサン	0.194	-0.149	-0.092	0.028	-0.087	0.115	0.266	-0.101	0.094
X_5 ホロセルロース	0.508**	-0.268	0.502**	0.094	0.174	0.508**	0.322*	-0.490*	-0.101
X_6 α -セルロース	0.334*	-0.379**	0.358**	-0.163	-0.002	0.081	-0.032	-0.182	0.000
X_7 リグニン	-0.551**	0.234	-0.252	-0.122	-0.134	-0.048	-0.189	0.243	-0.219
X_8 容積密度数(材)	-0.416**	-0.103	-0.452**	-0.151	-0.602**	-0.366**	-0.310*	0.533**	-0.187

* 5% 水準で有意

Significant at the 5% level.

** 1% 水準で有意

Significant at the 1% level.

られているが、上に認められたような化学組成との相関は認められていない³⁾。

白色度 (漂白)

白色度 (漂白) に対して有意な相関を示す変数は次のとおりである。

針葉樹 アルコール・ベンゼン可溶分(－), 容積密度数(+)

広葉樹 なし。

針葉樹パルプの場合、アルコール・ベンゼン可溶分含有量の多い樹種は白色度が低く、材の容積密度数との関係は、未漂白パルプの場合とは逆に正の相関を示している。

パルプシートの密度

パルプシートの密度に対して有意な相関を示す変数は次のとおりである。

針葉樹 容積密度数(－)

広葉樹 容積密度数(－)

パルプシートの密度と材の容積密度数、晩材率、細胞膜壁厚、細胞膜壁厚/ルーメン幅 との間にそれぞれ負の相関が存在することは、多くの研究者によって報告されており⁴⁾、南洋材について筆者もパルプシートの密度と灰分(+), 繊維幅(+), ルーメン幅(+), 細胞膜壁厚(－), 容積密度数(－) との間にそれぞれ単相関の存在することを認めている⁵⁾。このようにパルプシートの密度に対しては、主として材の物理的性質との間に密接な関係の存在することが明らかであるが、しかしここでは、容積密度数以外の材の形態的性質の測定は行っていないので、これらとパルプシートの密度との関係は不明である。このことは、以下に述べるパルプの諸強度についても同様である。また、ここでは化学組成との有意な相関は認められていない。

裂断長および比破裂強さ

引張り強さ(裂断長)と破裂強さ(比破裂強さ)とは密接な関係を有し(針葉樹: $r=0.740$, 広葉樹: $r=0.807$)、この両者は材の形態的性質、化学組成によってほぼ同様の影響を受けることが知られており、しばしば同一項目の中で論じられている。

この研究においても上記の理由から、これら両強度を同一項目の中で検討、考察することとした。

裂断長、比破裂強さに対して有意な相関を示す変数は次のとおりである。

裂断長

針葉樹 ホロセルロース(+), リグニン(－)

広葉樹 温水可溶分(－), ホロセルロース(+), 容積密度数(－)

比破裂強さ

針葉樹 アルコール・ベンゼン可溶分(－), ホロセルロース(+), リグニン(－)

広葉樹 ホロセルロース(+), 容積密度数(－)

材質特性のうち晩材率(－), 容積密度数(－), 細胞膜壁厚(－), 繊維長(+), ヘミセルロース含有量(+)などと引張り、および破裂の両強度との間には、それぞれ高度の単相関の存することは、多くの研究者によって報告されている⁴⁾。DINWOODIE⁶⁾は Sitka spruce について、裂断長、比破裂強さに対しては、材の形態的性質の中で細胞膜壁厚、細胞膜壁厚/繊維幅、繊維長が有意であり、化学組成の影響は有意でなかったことを報告している。また南洋材についてヘキササン可溶分(－), 容積密度数(－)が有意であることが認められている⁵⁾。

この報告の場合は、裂断長、比破裂強さに影響を及ぼす材質特性は、従来の報告と大体同一の傾向を示しているが、化学組成の影響がかなりはっきりと示されていることが注目される。

比引裂強さ

比引裂強さに対して有意な相関を示す変数は次のとおりである。

針葉樹 なし。

広葉樹 ホロセルロース(-), 容積密度数(+)

従来の研究結果では⁴⁾、材の容積密度数(+), 晩材率(+), 繊維ディメンジョンの中で、特に繊維長(+)と細胞膜壁厚(+)は、引裂強さとそれぞれ密接な関係を有することが知られている。

この報告の場合は、繊維長の測定値を得ていないので、これと引裂強さとの関係についての解析を行なうことはできなかった。

耐折強さ

耐折強さに対して有意な相関を示す変数は次のとおりである。

針葉樹 リグニン(-), 灰分(-)

広葉樹 なし。

耐折強さと材の容積密度数(-), 晩材率(-), 繊維の柔軟性(たとえば l/D で表わされる)(+), 繊維長(+), ペントサン(+)との間に単相関が存在することが知られており⁴⁾、南洋材の場合もほぼ上記と同様の変数と、耐折強さとの間に相関が存在することが認められている⁵⁾。

この報告の場合は針葉樹、広葉樹ともに容積密度数との相関は認められず、広葉樹では有意な相関を示す変数は全然認められていない。

6. 要 約

日本産主要樹種、針葉樹 24 種、広葉樹 46 種、合計 70 種について、化学組成の分析およびパルプ化試験を行なった。

その結果を要約すれば、次のとおりである。

1. 化学組成成分含有量は、樹種によりかなり異なるが、ホロセルロース、 α -セルロース、リグニン等の主成分に比較すると、灰分、可溶分等の副成分は比較的狭い範囲に集中的に分布している。また広葉樹の場合は、主成分も針葉樹と異なり、かなり狭い範囲に集中的に分布している。

2. パルプ化試験の結果、ほとんどの樹種は与えられた実験条件の範囲内で容易に蒸解され、パルプ化困難と認められる樹種は非常に少ない。また蒸解にさいして、活性アルカリ添加量が増加すると、パルプ収率、ローエ価は減少し、未漂白パルプの白色度は増加している。

得られたパルプは針葉樹、広葉樹ともに収率、白色度の分布はかなり広範囲にわたっており、しかも広葉樹パルプの収率以外はきわだったピークが見られない。このことは、日本産の樹種は、パルプ化は比較的容易であるが、パルプの性質は樹種によりかなりの差があることを示しているものと思われる。

3. 漂白試験の結果、針葉樹では、漂白歩どまりが低く、漂白後の白色度の低い樹種が 2~3 認められる(ウラジロモミ、サワラ等)。広葉樹では、漂白歩どまりが低い樹種は数樹種認められるが、漂白性が悪いものは認められない。

4. パルプの諸強度は、かなり広範囲にわたって分布しているが、特に問題になる樹種は認められない。

平均値の比較では引裂強さ、耐折強さは針葉樹が高く、引張り、破裂強さは針葉樹、広葉樹、両者はほぼ同程度である。また各強度は広葉樹では平均値を中心にして、鋭い大きなピークが見られるが、針葉樹の場合は比較的幅広い、ゆるやかなピークとなっている。

5. 生育地の異なる試料について試験の行なわれた針葉樹ではアカマツ、スギ、広葉樹ではブナ、ミズナラについて、化学組成、パルプの諸性質に地域差の影響は認められていない。

6. パルプの性質と化学組成との関連性は、Table 15 に示されるように、各種の有意な単相関が認められる。

文 献

- 1) 上村 武・梅原 誠：日本産主要樹種の性質・試験計画，林試研報，153，1～14，(1963)
- 2) VAN BUIJTENEN, J. P., ZOBEL, B. J. and JORANSON, P. N.: Variation of some wood and pulp properties in an even-aged Loblolly pine stand. *Tappi*, **44**, 141～144, (1961)
- 3) 香山 彊：南洋材の化学組成，形態的性質とパルプの性質との関係，紙パ技協誌，**22**，581～590，(1968)
- 4) DINWOODIE, J. M.: The relationship between fiber morphology and paper properties: A review of literature. *Tappi*, **48**, 440～447, (1965)
- 5) 材質育種研究班：材質育種に関する研究 第1報，東北地方アカマツ，林試研報，222，1～113，(1969)
- 6) DINWOODIE, J. M.: The influence of anatomical and chemical characteristics of softwood fibers on the properties of sulfate pulp. *Tappi*, **49**, 57～67, (1966)
- 7) 三宅基夫：北海道産広葉樹における材の特性とクラフトパルプの性質，紙パ技協誌，**22**，600～610，(1968)

写 真 説 明

1. クラフトパルプ（未漂白）の写真である。
2. 写真 1～24（針葉樹）は，上から未叩解パルプ ×100，叩解パルプ（ランペンミル）220±20 ml (CSF)，×100 である。
3. 写真 25～67（広葉樹）は，上から未叩解パルプ ×100，および叩解パルプ（2. と同様），×100 である。
4. 写真 68～110 の道管は，パルプ中より取り出して写したもので，×100 である。
5. 写真撮影は，万能投影機（ニコン 6 C T 型）を用い，フジグラビアフィルム（キャビネ判）に撮影し，利根 F 4 に密着した。

Explanation of Plates

- Photos. 1～24 Softwood unbleached kraft pulp from top to bottom
unbeaten, ca.×100
beaten, ca.×100
(220 ml, C. S. F.)
- Photos. 25～67 Hardwood unbleached kraft pulp from top to bottom
unbeaten, ca.×100
beaten, ca.×100
(220 ml, C. S. F.)
- Photos. 68～110 Vessel element, ca.×100

The Properties of the Important Japanese Woods
Chemical analysis, kraft pulping and papermaking characteristics
of the important Japanese woods

Yasumasa YONEZAWA⁽¹⁾, Tsutomu KAYAMA⁽²⁾, Fumihiko KIKUCHI⁽³⁾, Kuninori USAMI⁽⁴⁾,
Isao TAKANO⁽⁵⁾, Takehiko OGINO⁽⁶⁾ and Osamu HONDA⁽⁷⁾

Summary

The research project on the properties of the important Japanese wood species has been carried out at the Wood Technology Division and Forest Products Chemistry Division of the Government Forest Experiment Station, Tokyo, Japan.

This paper presents results on the chemical analysis, kraft pulping and papermaking of seventy species of Japanese softwoods and hardwoods.

The wood samples used are twenty-four species of softwoods and forty-six species of hardwoods. These species are shown in Table 1.

The results are summarized as follows:

- 1) The results of the chemical analysis of the wood samples are shown in Table 5.

There were considerable variations in the content of chemical constituents among wood samples. The variations in ash and extracts content were smaller as compared with the variations in holocellulose, α -cellulose and lignin content. The distribution of the contents of the main chemical constituents of hardwood samples concentrate in a relatively narrow range (Fig. 5~7).

- 2) The results of pulping tests are given in Table 7 and 8.

Most species of wood samples were well cooked by the ordinal cooking method and conditions. Pulp yield and Roe number decreased, and brightness of unbleached pulp increased with increasing addition of active alkali. Pulp yield and brightness of unbleached pulp distribute in a relatively wide range, and the sharp peaks are not shown in the histograms of these properties except pulp yield of the hardwood samples (Fig. 8, 9). It is considered that the pulping of Japanese woods is rather easy, but there are considerable variations in the properties of these pulps.

- 3) The results of the bleaching tests are given in Table 9.

Most pulps produced clear and white pulps, but the pulps from several species of softwoods showed relatively low brightness.

- 4) Evaluation data for the unbleached and bleached pulps are shown in Table 10 and 11.

Strength properties of the pulps distribute in relatively wide range, although all pulps show reasonable strength properties. Average tearing strength and folding endurance of the pulps from softwood samples were higher than those of the pulps from hardwood samples. Average tensile strength and bursting strength of the pulps from softwood samples were similar to those of the pulps from hardwood samples.

High and sharp peaks are shown in the histograms of the strength properties of the

pulps from hardwood samples; however, low and wide peaks are shown in the histograms of those of the pulps from softwood samples (Fig. 13~16).

6) The wood samples of Akamatsu (*Pinus densiflora*), Sugi (*Cryptomeria japonica*), Buna (*Fagus crenata*) and Mizunara (*Quercus crispula*), which were collected from different localities, gave no significant differences in the chemical constituents and pulp properties in the species.

6) Correlations between chemical constituents of the wood samples and pulp properties are shown in Table 15.

Results showed that the pulp properties were partly related to the chemical properties of the wood.

付 表 Appendix

硫酸塩パルプの強度 (I)

Evaluation of sulphate pulps (I)

針葉樹 Softwood

番号 No.	樹 種 Species	パルプ化 条件 Pulping condi- tion	ローエ価 Roe number	密 度 Density g/ml	裂断長 Break- ing length km	比破裂 強 さ Burst factor	比引裂 強 さ Tear factor	耐 折 強 さ Folding endu- rance	備 考 Note
1J	イチイ ICHII <i>Taxus cuspidata</i>	a b c	13.10 11.66 6.67	0.91 0.88 0.86	7.6 8.6 6.4	7.5 8.0 6.4	108.1 119.9 134.5	2100 3400 3800	
2N	カ ヤ KAYA <i>Torreya nucifera</i>	a b c d	15.92 13.20 8.32 6.32	0.79 0.80 0.82 0.84	9.5 9.6 10.1 8.7	6.4 6.8 6.9 6.1	88.5 86.8 88.2 91.2	670 810 1400 790	
3M	イヌマキ INUMAKI <i>Podocarpus macrophyllus</i>	a b c	10.57 7.18 6.05	0.77 0.77 0.78	7.9 7.3 7.0	5.1 4.4 4.5	85.2 84.2 85.6	250 86 120	
4M	モ ミ MOMI <i>Abies firma</i>	a b c	11.95 7.16 5.47	0.78 0.78 0.77	9.1 9.3 8.5	6.3 6.1 5.3	104.8 109.1 121.8	1100 1300 730	
5H	ウラジロモミ URAJIROMOMI <i>Abies homolepis</i>	a b c	11.65 9.38 5.60	0.86 0.80 0.84	9.0 6.3 8.8	9.7 8.2 9.1	201.6 185.0 117.2	6200 4700 4900	
6F	アオモリトドマツ AOMORITODO- MATSU <i>Abies Mariesii</i>	a b c	7.57 5.77 4.64	0.85 0.83 0.83	12.4 12.6 11.4	10.3 9.7 8.3	112.0 114.0 112.1	3900 2600 2600	
7D	トドマツ TODO- MATSU <i>Abies sachalinensis</i>	a b c	10.50 7.42 4.96	0.81 0.81 0.85	11.8 11.6 12.3	9.1 8.8 9.5	109.0 127.0 128.7	4100 3500 5000	
8H	シラベ SHIRABE <i>Abies Veitchii</i>	a b c	11.73 9.86 6.82	0.85 0.84 0.89	8.0 9.8 10.9	9.6 10.7 10.4	121.8 118.1 135.6	8100 8500 6200	
9J	カラマツ KARA- MATSU <i>Larix leptolepis</i>	a b c	8.95 5.63 4.13	0.72 0.74 0.76	10.7 10.1 9.9	8.2 7.2 7.3	143.9 155.2 147.1	1600 1400 1800	
10C	エゾマツ EZO- MATSU <i>Picea jezoensis</i>	a b c	10.84 6.95 3.57	0.80 0.83 0.80	13.4 14.2 13.2	11.6 10.5 11.2	102.0 104.9 121.8	1700 1300 3400	
11C	アカエゾマツ AKAEZOMATSU <i>Picea Glehnii</i>	a b c	9.29 6.98 4.83	0.77 0.79 0.77	13.4 12.7 13.8	11.6 10.6 10.0	116.0 124.3 122.9	2100 1800 2100	
12J	トウヒ TÔHI <i>Picea hondoensis</i>	a b c d	11.63 8.10 7.49 6.75	0.86 0.87 0.86 0.85	10.0 10.4 10.1 10.7	10.1 11.3 11.1 9.7	109.4 119.3 115.0 158.9	7100 6400 10000 5200	
13M	トガサワラ TOGA- SAWARA <i>Pseudotsuga japonica</i>	a b c	9.61 6.92 5.65	0.71 0.73 0.75	7.4 8.3 8.1	5.2 6.0 5.3	138.2 125.2 134.2	470 680 630	
14M	ツ ガ TSUGA <i>Tsuga Sieboldii</i>	a b c	9.11 6.58 4.61	0.72 0.70 0.77	9.5 8.8 8.5	6.1 5.7 5.4	129.5 162.6 138.8	850 1300 710	

番号 No.	樹 種 Species	パルプ化 条件 Pulping condi- tion	ローエ価 Roe number	密 度 Density g/ml	断裂長 Break- ing length km	比破裂 強 ざ Burst factor	比引裂 強 ざ Tear factor	耐 折 強 ざ Folding endu- rance	備 考 Note
15F	アカマツ AKA- MATSU <i>Pinus densiflora</i>	a b c	6.19 4.92 3.51	0.78 0.77 0.77	11.6 11.4 10.0	8.9 9.7 7.8	111.8 110.3 118.7	2800 2200 1900	
15L	" "	a b c	6.64 5.46 3.64	0.73 0.76 0.79	11.8 11.1 10.7	8.9 8.3 7.5	125.0 116.9 117.8	1800 1600 1200	
15I	" "	a b c	7.32 6.85 4.54	0.79 0.81 0.81	9.5 9.6 10.2	8.6 9.4 8.0	158.0 160.7 172.7	5600 4800 7000	
16K	ヒメコマツ HIMEKOMATSU <i>Pinus pentaphylla</i>	a b c	12.27 9.68 6.86	0.84 0.88 0.88	8.9 10.2 9.1	9.2 9.1 8.2	96.2 108.9 127.5	3100 6600 5600	
17N	クロマツ KURO- MATSU <i>Pinus Thunbergii</i>	a b c	6.48 4.98 3.78	0.75 0.81 0.77	10.6 10.3 9.6	7.8 7.6 7.2	137.6 139.7 134.8	1200 1700 2000	
18N	スギ SUGI <i>Cryptomeria japonica</i>	a b c	13.50 9.72 6.08	0.77 0.78 0.81	9.9 10.0 9.2	7.2 7.7 6.6	112.4 117.3 130.9	870 770 400	
18G	" "	a b c d	12.23 10.35 9.55 8.68	0.82 0.80 0.82 0.80	9.2 8.4 9.7 6.1	8.5 9.8 9.2 8.0	121.3 151.3 122.8 165.8	4500 4900 6400 2400	
18I	" "	a b c d	13.70 12.49 8.03 6.85	0.77 0.79 0.82 0.83	7.9 7.8 10.0 9.6	7.6 8.5 7.9 8.2	120.6 135.7 149.2 179.4	2000 4800 7200 3000	
19J	コウヤマキ KŌYAMAKI <i>Sciadopitys verticillata</i>	a b c d e	16.23 12.54 9.74 8.22 6.47	0.81 0.80 0.81 0.81 0.83	8.2 7.9 6.8 6.6 6.5	5.3 5.2 4.3 4.2 4.0	115.7 132.9 137.8 139.9 145.6	330 260 170 90 89	
20J	ヒノキ HINOKI <i>Chamaecyparis obtusata</i>	a b c	10.97 8.05 6.25	0.84 0.85 0.86	11.4 10.2 9.8	8.3 7.3 6.9	108.3 124.9 111.7	2000 1900 950	
21J	サワラ SAWARA <i>Chamaecyparis pisifera</i>	a b c	12.71 8.17 6.28	0.81 0.79 0.79	10.1 9.9 9.5	7.3 7.2 5.0	123.2 151.2 136.0	1900 2800 1300	
22J	ネズコ NEZUKO <i>Thuja Standishii</i>	a b c	12.00 7.71 5.42	0.82 0.83 0.86	11.1 12.3 11.7	8.7 10.2 8.9	96.6 114.1 112.2	1400 1500 2100	
23J	アスナロ ASUNARO <i>Thujopsis dolabrata</i>	a b c	12.90 8.02 6.16	0.86 0.84 0.85	12.5 11.4 10.7	8.4 7.8 7.0	100.5 115.9 129.7	1300 1800 1300	
24F	ヒノキアスナロ HINOKIASUNARO <i>Thujopsis dolabrata (var.)</i>	a b c	8.31 6.36 5.32	0.81 0.83 0.82	11.1 11.2 11.6	8.8 8.3 8.1	108.9 103.7 107.8	2500 1500 1400	

硫酸塩パルプの強度 (II)
Evaluation of sulphate pulps (II)

広葉樹 Hardwood

番号 No.	樹 種 Species	パルプ化 条件 Pulping condition	ローエ価 Roe number	密 度 Density g/m ³	裂断長 Break- ing length km	比破裂 強 さ Burst factor	比引裂 強 さ Tear factor	耐 折 強 さ Folding endu- rance	備 考 Note
25C	ドロノキ DORONOKI <i>Populus</i> <i>Maximowiczii</i>	a	5.03	0.90	10.6	8.0	77.3	2500	
		b	2.15	0.95	12.6	8.3	83.8	1400	
		c	1.43	0.86	11.8	7.8	95.6	620	
26C	ヤマナラシ YAMANARASHI <i>Populus Sieboldii</i>	a	2.32	0.89	11.5	7.5	90.4	680	
		b	1.65	0.91	12.0	7.8	82.3	700	
		c	1.50	0.89	10.9	6.6	76.8	310	
28F	オニグルミ ONIGURUMI <i>Juglans Sieboldiana</i>	a	4.88	0.84	11.9	7.3	108.8	1500	
		b	2.52	0.78	12.2	7.4	110.6	1200	
		c	2.07	0.78	9.7	6.7	106.3	370	
29H	サワグルミ SAWAGURUMI <i>Pterocarya rhoifolia</i>	a	4.15	0.99	13.9	9.8	92.8	3500	
		b	3.12	1.00	14.4	9.5	102.6	3100	
		c	1.33	0.99	12.8	8.7	93.3	4000	
74 I	ヤマハンノキ YAMAHANNOKI <i>Alnus hirsuta (var.)</i>	a	6.10	0.93	9.3	8.3	115.6	4800	
		b	3.36	0.93	8.7	7.8	112.7	3600	
		c	2.90	0.91	9.1	7.3	131.1	4000	
31H	ミズメ MIZUME <i>Betula grossa</i>	a	4.57	0.92	12.4	9.6	105.0	2500	
		b	2.96	0.91	12.7	9.9	108.2	2000	
		c	2.22	0.91	12.1	8.8	106.2	1500	
32B	シラカンバ SHIRAKANBA <i>Betula platyphylla</i>	a	4.63	0.94	7.4	9.5	121.9	8400	
		b	2.39	0.92	9.0	9.7	109.9	6000	
		c	2.42	0.96	11.0	9.4	112.9	5100	
33D	マカンバ MAKANBA <i>Betula</i> <i>Maximowicziana</i>	a	4.07	0.89	9.6	6.7	126.2	1600	
		b	3.10	0.87	7.4	6.1	120.4	840	
		c	2.35	0.87	6.7	4.9	107.6	220	
34H	アカシデ AKASHIDE <i>Carpinus laxiflora</i>	a	6.68	0.89	12.5	10.7	94.6	2900	
		b	2.52	0.91	13.3	10.6	92.7	2500	
		c	2.23	0.93	13.5	9.9	95.3	1800	
35D	アサダ ASADA <i>Ostrya japonica</i>	a	8.30	0.87	11.6	8.9	89.6	2200	
		b	3.06	0.88	11.3	8.4	105.5	1800	
		c	2.82	0.87	10.2	7.4	102.4	1100	
36F	ク リ KURI <i>Castanea crenata</i>	a	12.35	0.82	10.9	7.4	92.0	1200	
		b	10.11	0.82	10.0	7.4	97.8	780	
		c	5.62	0.79	11.6	8.1	100.9	1500	
		d	3.93	0.84	11.1	8.4	103.5	1300	
37N	シイノキ SHIINOKI <i>Shiia Sieboldii</i>	a							
		b	9.80	0.90	9.4	7.8	95.3	2800	
		c	6.10	0.90	8.6	8.3	109.0	3100	
		d	4.63	0.93	6.7	7.1	132.9	2300	
38E	ブ ナ BUNA <i>Fagus crenata</i>	a	3.26	0.87	9.7	7.9	103.9	3600	
		b	2.03	0.88	9.9	7.2	108.8	2000	
		c	1.52	0.88	8.9	6.3	107.3	950	
38F	"	a	5.10	0.86	11.6	8.2	95.2	1000	
		b	2.19	0.86	10.7	7.3	94.9	590	
		c	1.75	0.86	9.8	6.2	92.7	430	
38H	"	a	2.98	0.91	9.5	6.4	90.2	760	
		b	2.08	0.92	9.3	5.8	82.8	430	
		c	1.49	0.88	9.1	5.5	93.2	340	

番号 No.	樹 種 Species	パルプ化 条件 Pulping condition	ローエ価 Roe number	密 度 Density g/ml	裂断長 Break- ing length km	比破裂 強 さ Burst factor	比引裂 強 さ Tear factor	耐 折 強 さ Folding endu- rance	備 考 Note
38K	ブ ナ BUNA <i>Fagus crenata</i>	a b c	3.98 1.92 1.73	0.83 0.86 0.85	11.2 10.2 8.9	7.3 7.0 5.6	104.4 101.4 92.9	690 580 270	
38L	" "	a b c	5.00 2.07 1.48	0.83 0.79 0.83	10.3 10.8 9.3	7.1 7.4 5.9	89.6 102.8 85.1	650 670 240	
39H	イヌブナ INUBUNA <i>Fagus japonica</i>	a b c	3.56 2.22 1.48	0.90 0.89 0.87	11.7 10.8 9.0	7.7 7.5 6.8	96.7 100.8 104.4	1400 910 650	
40N	アカガシ AKAGASHI <i>Cyclobalanopsis acuta</i>	a b c	5.61 2.59 1.94	0.83 0.83 0.85	10.3 9.9 8.5	7.3 6.8 6.0	107.8 119.1 115.5	940 1800 990	
41N	シラカシ SHIRAKASHI <i>Cyclobalanopsis myrsinaefolia</i>	a b c	5.01 2.34 1.57	0.85 0.87 0.87	9.6 10.4 9.2	7.4 7.5 6.2	123.7 119.4 122.6	2900 3100 1200	
43N	イチイガシ ICHIIGASHI <i>Cyclobalanopsis gilva</i>	a b c	2.49 1.86 1.57	0.86 0.85 0.88	10.0 10.1 8.0	8.2 7.3 5.7	119.1 118.2 107.1	5000 3400 600	
44H	クヌギ KUNUGI <i>Quercus acutissima</i>	a b c	4.86 2.77 2.32	0.83 0.81 0.83	6.5 6.6 7.5	5.7 5.9 5.3	122.5 121.4 118.6	1300 1500 190	
45C	ミズナラ MIZUNARA <i>Quercus crispula</i>	a b c	6.28 3.03 2.29	0.88 0.87 0.86	11.4 11.4 10.5	7.7 8.1 7.2	89.3 89.5 82.4	520 890 530	
45D	" "	a b c	3.29 1.74 1.55	0.85 0.85 0.85	9.7 9.8 9.5	6.9 6.5 6.4	128.6 129.5 98.0	1200 970 890	
45F	" "	a b c	11.96 2.10 1.93	0.78 0.78 0.77	10.6 10.7 10.5	7.0 7.8 7.3	101.7 100.9 105.8	790 740 540	
45K	" "	a b c	5.21 2.37 1.73	0.85 0.76 0.87	10.9 9.3 9.6	7.3 6.6 5.9	109.0 104.4 90.9	800 470 400	
46H	コナラ KONARA <i>Quercus serrata</i>	a b c	4.32 2.55 2.25	0.85 0.81 0.82	8.6 8.3 7.6	7.2 6.1 5.8	132.4 146.7 122.0	2500 1200 510	
47C	ハルニレ HARUNIRE <i>Ulmus propinqua</i>	a b c	4.88 2.66 1.70	0.88 0.86 0.83	12.8 11.4 9.9	9.2 8.6 6.8	93.2 104.8 97.5	920 760 260	
48H	ケヤキ KEYAKI <i>Zelkova serrata</i>	a b c	2.38 1.63 1.49	0.88 0.92 0.92	12.3 11.7 11.0	10.2 8.8 7.7	101.2 92.4 93.6	2000 1200 770	
49N	ヤマグワ YAMAGUWA <i>Morus bombycis</i>	a b c	6.29 4.51 3.36	0.89 0.88 0.86	5.0 7.3 5.9	6.0 6.3 5.1	98.9 144.9 96.3	950 460 140	
51D	カツラ KATSURA <i>Cercidiphyllum japonicum</i>	a b c	5.65 3.43 2.49	0.82 0.82 0.81	8.0 10.2 9.2	7.0 7.3 7.1	123.7 116.2 104.1	1600 1600 1200	

番号	樹 種	パルプ化 条 件	ローエ価 Roe number	密 度 Density g/ml	裂断長 Break- ing length km	比破裂 強 さ Burst factor	比引裂 強 さ Tear factor	耐 折 さ Folding endu- rance	備 考 Note
No.	Species	Pulping condi- tion	Roe number	Density g/ml	Break- ing length km	Burst factor	Tear factor	Folding endu- rance	Note
51D	ホオノキ HÔNOKI <i>Magnolia obovata</i>	a b c	3.42 2.23 1.74	0.89 0.88 0.91	10.7 10.4 9.3	7.5 7.0 6.0	105.4 109.1 95.6	1700 1200 720	
52N	クスノキ KUSUNOKI <i>Cinnamomum Camphora</i>	a b c	4.91 2.47 2.02	0.93 0.90 0.88	10.9 10.5 9.1	8.3 7.7 6.2	108.5 98.9 95.1	3300 1500 700	
53N	タブノキ TABUNOKI <i>Machilus Thunbergii</i>	a b c	5.07 2.16 2.02	0.88 0.86 0.85	8.7 7.8 6.9	6.4 5.1 4.1	115.4 121.4 109.7	1000 310 81	
54N	イスノキ ISUNOKI <i>Distylium racemosum</i>	a b c	5.35 2.76 2.00	0.79 0.79 0.81	9.5 9.5 8.4	7.1 6.9 5.9	123.2 128.1 128.7	1500 2500 990	
55 I	ヤマザクラ YAMAZAKURA <i>Prunus donarium</i>	a b c	5.76 2.12 1.95	0.92 0.90 0.95	8.3 8.0 8.1	7.4 8.3 6.5	119.4 116.6 113.0	4500 2800 1800	
56F	イヌエンジュ INUENJU <i>Maackia amurensis (var.)</i>	a b c	4.93 2.66 2.14	0.78 0.79 0.79	8.9 7.7 7.2	5.7 5.0 4.5	104.2 92.5 87.6	240 170 74	
57H	キハダ KIHADA <i>Phellodendron sachalinense</i>	a b c	2.38 1.93 1.49	1.01 0.96 0.98	13.6 13.8 13.2	11.1 10.4 9.3	103.2 97.1 89.9	3000 3000 2200	
59D	イタヤカエデ ITAYAKAEDE <i>Acer mono</i>	a b c	3.33 1.89 1.45	0.95 0.94 0.92	10.9 10.6 8.6	7.4 7.0 5.9	87.8 87.8 86.1	970 840 360	
60 I	トチノキ TOCHINOKI <i>Aesculus turbinata</i>	a b c	7.81 5.80 4.18	0.96 0.96 0.95	7.7 8.0	6.2 5.4	101.5 101.9	1400 340	
61C	シナノキ SHINANOKI <i>Tilia japonica</i>	a b c	3.89 2.09 1.87	0.94 0.95 0.91	12.9 13.9 12.7	10.1 10.0 8.8	71.3 80.3 85.3	1800 1800 1200	
62C	オオバボダイジュ ÔBABODAIJU <i>Tilia Maximowicziana</i>	a b c	5.28 3.55 1.98	0.96 0.95 0.86	14.0 15.7 14.6	10.8 11.4 11.0	71.8 78.1 82.8	1800 2500 1400	
63M	ヒメシャラ HIMESHARA <i>Stewartia monadelph</i>	a b c	5.00 2.11 1.93	0.72 0.74 0.78	10.2 9.7 9.5	7.6 7.3 6.7	156.4 155.4 137.0	1700 1300 510	
64D	ハリギリ HARIGIRI <i>Kalopanax ricinifolium</i>	a b c	2.75 2.60 2.24	0.86 0.90 0.90	8.9 6.7 7.0	6.2 5.2 4.6	74.7 71.9 57.8	410 170 110	
65 I	ミズキ MIZUKI <i>Cornus controversa</i>	a b c	6.06 2.45 1.91	0.86 0.91 0.88	9.0 9.0 7.0	7.7 8.1 7.1	155.1 130.3 130.0	3900 3800 3600	
66H	シオジ SHIOJI <i>Fraxinus commemoralis</i>	a b c	6.67 4.90 3.20	0.93 0.93 0.92	12.5 11.3 11.0	8.9 8.0 7.4	107.3 114.2 112.6	1900 1600 1200	
67D	ヤチダモ YACHIDAMO <i>Fraxinus mandshurica</i>	a b c	3.33 2.24 2.02	0.83 0.84 0.84	9.5 8.7 7.8	7.1 6.0 5.8	121.0 109.6 102.9	850 330 210	

番号 No.	樹 種 Species	パルプ化 条件 Pulping condi- tion	ローエ価 Roe number	密 度 Density g/ml	裂断長 Break- ing length km	比破裂 強 さ Burst factor	比引裂 強 さ Tear factor	耐 折 強 さ Folding endu- rance	備 考 Note
68C	アオダモ AODAMO <i>Fraxinus Sieboldiana</i> (var.)	a	2.81	0.88	10.8	7.5	115.1	700	
		b	1.70	0.88	10.6	6.5	107.9	650	
		c	1.41	0.87	8.7	6.3	101.9	310	
69H	キ リ KIRI <i>Paulownia tomentosa</i>	a	8.90	1.03	7.8	6.3	60.0	8300	
		b	6.07	1.00	10.3	7.1	64.2	3700	
		c	3.48	1.00	10.4	7.4	107.7	5800	
		d	2.63	0.98	9.8	6.9	80.9	5500	
70N	コジイ KOJII <i>Shiia cuspidata</i>	a	3.81	0.92	10.0	8.5	97.6	3400	
		b	2.75	0.91	10.0	8.0	104.7	2500	
		c	2.15	0.91	8.9	6.4	101.0	2100	
71C	オオバヤナギ OBAYANAGI <i>Toisusu Urbaniana</i>	a	8.47	0.88	12.1	8.7	76.3	700	
		b	2.16	0.85	11.3	7.6	88.0	520	
		c	1.41	0.89	11.4	7.5	78.7	460	




Photo. 1

1. ICHII *Taxus cuspidata*



Photo. 2

2. KAYA *Torreya nucifera*




Photo. 3

3. INUMAKI *Podocarpus macrophyllus*




Photo. 4

4. MOMI *Abies firma*




Photo 5.

5. URAJIROMOMI *Abies homolepis*




Photo. 6

6. AOMORITODOMATSU *Abies Mariesii*



Photo. 7

7. TODOMATSU *Abies sachalinensis*




Photo. 8

8. SHIRABE *Abies Veitchii*




Photo. 9

9. KARAMATSU *Larix leptolepis*



Photo. 10

10. EZOMATSU *Picea jezoensis*



Photo. 11

11. AKAEZOMATSU *Picea Glehnii*




Photo. 12

12. TÔHI *Picea hondoensis*



Photo. 13 13. TOGASAWARA *Pseudotsuga japonica*




Photo. 14 14. TSUGA *Tsuga Sieboldii*




Photo. 15

15. AKAMATSU *Pinus densiflora*



Photo. 16

16. HIMEKOMATSU *Pinus pentaphylla*




Photo. 17

17. KUROMATSU *Pinus Thunbergii*




Photo. 18

18. SUGI *Cryptomeria japonica*

—Plate 10—




Photo. 19 19. KÔYAMAKI *Sciadopitys verticillata*




Photo. 20 20. HINOKI *Chamaecyparis obtusa*




Photo. 21 21. SAWARA *Chamaecyparis pisifera*




Photo. 22 22. NEZUKO *Thuja Standishii*




Photo. 23

23. ASUNARO *Thujaopsis dolabrata*




Photo. 24

24. HINOKIASUNARO *Thujaopsis dolabrata*
var. *Hondai* MAKINO




Photo. 25 25. DORONOKI *Populus Maximowiczii*




Photo. 26 26. YAMANARASHI *Populus Sieboldii*




Photo. 27

28. ONIGURUMI *Juglans Sieboldiana*




Photo. 28

29. SAWAGURUMI *Pterocarya rhoifolia*




Photo. 29

31. MIZUME *Betula grossa*




Photo. 30

32. SHIRAKANBA *Betula platyphylla*




Photo. 31 33. MAKANBA *Betula Maximowicziana*




Photo. 32 34. AKASHIDE *Carpinus laxiflora*




Photo. 33

35. ASADA *Ostrya japonica*




Photo. 34

36. KURI *Castanea crenata*




Photo. 35

37. SHIINOKI *Shiia Sieboldii*




Photo. 36

38. BUNA *Fagus crenata*




Photo. 37

39. INUBUNA *Fagus japonica*



Photo. 38

40. AKAGASHI *Cyclobalanopsis acuta*




Photo. 39 41. SHIRAKASHI *Cyclobalanopsis myrsinaefolia*




Photo. 40 43. ICHIIGASHI *Cyclobalanopsis gilva*




Photo. 41

44. KUNUGI *Quercus acutissima*




Photo. 42

45. MIZUNARA *Quercus crispula*




Photo. 43

46. KONARA *Quercus serrata*



Photo. 44

47. HARUNIRE *Ulmus propinqua*



Photo. 45

48. KEYAKI *Zelkova serrata*



Photo. 46

49. YAMAGUWA *Morus bombycis*




Photo. 47 50. KATSURA *Cercidiphyllum japonicum*



Photo. 48 51. HÔNOKI *Magnolia obovata*




Photo. 49

52. KUSUNOKI *Cinnamomum Camphora*



Photo. 50

53. TABUNOKI *Machilus Thunbergii*




Photo. 51

54. ISUNOKI *Distylium racemosum*



Photo. 52

55. YAMAZAKURA *Prunus donarium*



Photo. 53

56. INUENJU *Maackia amurensis*
var. *Buergeri*




Photo. 54

57. KIHADA *Phellodendron sachalinense*



Photo. 55

59. ITAYAKAEDE *Acer mono*



Photo. 56

60. TOCHINOKI *Aesculus turbinata*




Photo. 57

61. SHINANOKI *Tilia japonica*



Photo. 58

63. HIMESHARA *Stewartia monadelphica*




Photo. 59

64. HARIGIRI *Kalopanax ricinifolium*




Photo. 60

65. MIZUKI *Cornus controversa*




Photo. 61

66. SHIOJI *Fraxinus commemoralis*




Photo. 62

67. YACHIDAMO *Fraxinus mandshurica*



Photo. 63

68. AODAMO *Fraxinus Sieboldiana*
var. *serrata* NAKAI



Photo. 64

69. KIRI *Paulownia tomentosa*



Photo. 65

70. KOJII *Shiia cuspidata*



Photo. 66

71. ÔBAYANAGI *Toisusu Urbaniana*




Photo. 67

74. YAMAHANNOKI *Alnus hirsta* var. *sibirica*




Photo. 68

25. DORONOKI




Photo. 69

26. YAMANARASHI




Photo. 70

28. ONIGURUMI




Photo. 71

29. SAWAGURUMI




Photo. 72

31. MIZUME




Photo. 73

32. SHIRAKANBA




Photo. 74

33. MAKANBA




Photo. 75

34. AKASHIDE




Photo. 76

35. ASADA




Photo. 77

36. KURI




Photo. 78

37. SHIINOKI




Photo. 79

38. BUNA




Photo. 80

39. INUBUNA




Photo. 81

40. AKAGASHI




Photo. 82

41. SHIRAKASHI




Photo. 83

43. ICHIGASHI




Photo. 84

44. KUNUGI




Photo. 85

45. MIZUNARA




Photo. 86

46. KONARA




Photo. 87

47 HARUNIRE




Photo. 88

48. KEYAKI



Photo. 89

49. YAMAGUWA




Photo. 90

50. KATSURA




Photo. 91

51. HÔNOKI




Photo. 92

52. KUSUNOKI




Photo. 93

53. TABUNOKI




Photo. 94

54. ISUNOKI




Photo. 95

55. YAMAZAKURA




Photo. 96

56. INUENJU




Photo. 97

57. KIHADA




Photo. 98

59. ITAYAKAEDE




Photo. 99

60. TOCHINOKI




Photo. 100

61. SHINANOKI




Photo. 101

63. HIMESHARA




Photo. 102

64. HARIGIRI




Photo. 103

65. MIZUKI




Photo. 104

66. SHIOJI




Photo. 105

67. YACHIDAMO




Photo. 106

68. AODAMO




Photo. 107

69. KIRI




Photo. 108

70. KOJII




Photo. 109

71. ÔBAYANAGI




Photo. 110

74. YAMAHANNOKI