(研究資料)

林業試験場電算機プログラミング報告 (11)

数量化(Ⅱ型)

川 端 幸 藏⁽¹⁾

Kozo KAWABATA : Report on Computer Programming (11)

—Quantification (Type II)—

(Research note)

要 旨 : この報告は数量化Ⅱ型のプログラムドキュメンテーションである。数量化Ⅱ型は名義尺度で観測される特性(外的基準)を他の M 個の要因項目を用いて分類しようとする手法であり、特に項目がカテゴリーとして扱える点は林業研究の分野でも広く利用できる手法である。

この報告は数量化Ⅱ型を用いるデータ解析に必要な一連の解説を与えてある。数量化Ⅱ型の理論的内容を理解し、得られる計算結果を正しく解釈するために計算内容の概説をしてある(第2節)。ここは数量化Ⅱ型を説明したどの解説書よりも理解しやすいであろう。

数量化Ⅱ型を用いた解析をする場合には、第3節で指定したようにデータを揃えれば、必要な一連の計算結果が得られるようにこのプログラムは作成されている。

このプログラムの使用例は阿賀野川流域を対象に、森林の水資源かん養機能を評価するために行われたデータを用いて解説してある。

このプログラムは Fortran (JIS 水準 7000) で書いてあり、11個のサブルーチン副プログラムを連結して実行する構造になっている。必要な主記憶量は約45,000語であるが、これに満たない計算機を使う場合には、オーバーレイ構造で実行できるように作成してある。

1. はじめに

対象とする特性 Y が名義尺度すなわち分類値として測定されていて、この Y を他の M 個の項目 $X_1, X_2, \dots, X_M$ を用いて

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_M X_M \quad \dots\dots\dots(1)$$

で分類する問題は $X_1, X_2, \dots, X_M$ が間隔尺度すなわち計量データであれば線型判別関数を求める問題であり、 $X_1, X_2, \dots, X_M$ が分類データであれば数量化Ⅱ型の手法で処理される。これらの手法は、2つ以上の群(母集団)から取り出した多変量(M 個の項目)のデータにもとづいて、所属不明の新しい標本を、そのいずれの群に属するものであるかを判別しようとする手法である。

数量化Ⅱ型の手法は林 知己夫(現 文部省統計数理研究所長)によって開発されたものであり、特に項目が分類値でもよいという点は林業研究の分野でも広く利用できる手法である。

この報告は、数量化Ⅱ型の手法を利用しようとする際に必要とする一連の計算を林業試験場の電算機 OKITAC-4500 で行うものを対象に開発したプログラムと、その使用法をとりまとめたものである。

2. 計算内容の概説

数量化 II 型の理論的内容については、林ら¹⁾が述べているが、ここでは理解を深めるために計算式の誘導やプログラムで実行している計算内容を含めて概要を説明する。

2.1 スコアの計算

数量化 II 型では、項目 $X_1, X_2, \dots, X_M$ が分類値データとして扱われるから、その分類規準はカテゴリ (範疇) として表わされる。外的基準 Y はもともとその所属する群を識別するものであるから、これもカテゴリとしてとらえられる。したがって数量化 II 型のデータは表 1 の形で表わせる。これを反応パターン表と呼ぶ。この表で、 $\surd$ 印は第 i 標本が各項目でどのカテゴリに分類されているかを示す印である。

いま、表 1 の各カテゴリ C_{jk} に“ある数量 x_{jk} ” (これを求めることが当面の目標になる) を 1 対 1 に対応させるとすれば、式 (1) は、つぎのように書くことができる。

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^{K_j} \delta_i(j, k) x_{jk} \dots\dots\dots (2)$$

$(i=1, 2, \dots, N)$

ここに N は標本数, M は項目数, K_j は第 j 番目の項目のカテゴリ数, $\delta_i(j, k)$ は第 i 標本が j 番目の項目の k 番目のカテゴリに分類されているとき、つまり表 1 で $\surd$ 印のついている所で値 1 をとり、それ以外の所で値 0 をとる記号である。

なお、 α_i と Y_i の関係、つまり α_i による判別の効果が最もうまくいくようにするには、“ある数量 x_{jk} ” をつぎのように決めればよい。

α_i に関する群 (グループ) 間の分散 (σ_b^2) とグループを込みにした全体の分散 (σ^2) を作り、この比

$$\eta^2 = \sigma_b^2 / \sigma^2 \dots\dots\dots (3)$$

が最大になるようにする。このことは、 α_i に対するグループ分け、つまり層別の効果を最大にしようと

表 1. 反応パターン表 (数量化 II 型の原始データの一般形)

標本番号	項 目 と カ テ ゴ リ										外的基準 (グループ)						
	X_1			X_2				X_M									
	C_{11}	C_{12}	$\dots$	C_{1K_1}	C_{21}	C_{22}	C_2	C_{2K_2}	$\dots$	C_{M1}	C_{M2}	$\dots$	C_{MKM}	G_1	G_2	$\dots$	G_T
1		$\surd$			$\surd$						$\surd$						$\surd$
2				$\surd$		$\surd$					$\surd$				$\surd$		
3	$\surd$							$\surd$				$\surd$		$\surd$			
$\vdots$																	
$N-1$			$\surd$				$\surd$					$\surd$					$\surd$
N		$\surd$			$\surd$						$\surd$				$\surd$		
列の計	n_{11}	n_{12}	$\dots$	n_{1K_1}	n_{21}	n_{22}	$\dots$	n_{2K_2}	$\dots$	n_{M1}	n_{M2}	$\dots$	n_{MKM}	n_1	n_2	$\dots$	n_T
	計 = N				計 = N				$\dots$	計 = N			計 = N				

するものである。

ここで η は相関比と呼ばれている。

式 (3) の分散 σ_b^2 , σ^2 は, それぞれつぎのように表わせる。

$$\bar{\alpha} = \sum_{i=1}^N \alpha_i / N = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^{K_j} \delta_i(jk) x_{jk} / N \quad \dots\dots\dots(4)$$

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (\alpha_i - \bar{\alpha})^2 / N \quad \dots\dots\dots(5)$$

総数 N の標本が T 個のグループから集められているとすれば, 各グループにおける α の平均値は

$$\bar{\alpha}_t = \sum_{i(t)=1}^{n_t} \alpha_{i(t)} / n_t = \sum_{i(t)=1}^{n_t} \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^{K_j} \delta_{i(t)}(jk) x_{jk} / n_t \quad \dots\dots\dots(6)$$

$$(t=1, 2, \dots, T)$$

ここに n_t は t 番目のグループに属する標本の数で, $i(t)$ は t 番目のグループ内を動く添字である。もちろん

$$\sum_{t=1}^T n_t = N \quad \dots\dots\dots(7)$$

である。

これらを用いて, グループ間の分散 σ_b^2 は

$$\sigma_b^2 = \sum_{t=1}^T (\bar{\alpha}_t - \bar{\alpha})^2 n_t / N \quad \dots\dots\dots(8)$$

と書ける。

式 (3) は $\sigma_b^2 = \eta^2 \sigma^2$ と書け, これは式 (4), (5), (6), (8) から x_{jk} の関数であるから, η^2 を最大にする x_{jk} を求めるには

$$\frac{\partial \sigma_b^2}{\partial x_{jk}} = \eta^2 \frac{\partial \sigma^2}{\partial x_{jk}} \quad \dots\dots\dots(9)$$

を解けばよい。この解は

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^{K_j} \left\{ \sum_{t=1}^T \left(n^t(jk) n^t(uv) / n_t \right) - \frac{1}{N} n_{jk} n_{uv} \right\} x_{jk} \\ & = \eta^2 \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^{K_j} \left\{ f_{uv}(jk) - \frac{1}{N} n_{jk} n_{uv} \right\} x_{jk} \quad \dots\dots\dots(10) \end{aligned}$$

である。(付録(1)参照)

ここに $n^t(jk)$ は t 番目のグループ内での標本数 n_t のうち, j 項目の k カテゴリに分類された標本数を表わす記号であり,

$$n^t(jk) = \sum_{i(t)=1}^{n_t} \delta_{i(t)}(jk) \quad \dots\dots\dots(11)$$

で定義される。

また $f_{uv}(jk)$ は u 項目の v カテゴリに分類された標本のうち, j 項目の k カテゴリに分類される標本数を表わす記号であり,

$$f_{uv}(jk) = \sum_{i=1}^N \delta_i(uv) \cdot \delta_i(jk) = f_{jk}(uv) \quad \dots\dots\dots(12)$$

で定義される。これをクロス表と呼ぶ。

n_{jk} または n_{uv} は総数 N の標本のうち、 j 項目の k カテゴリまたは u 項目の v カテゴリに分類された標本数である。

式 (10) は添字が $u=1, 2, \dots, M, v=1, 2, \dots, K_u$ と動くから、カテゴリの総個数 $\left(\sum_{u=1}^M K_u\right)$ の方程式があつて、これを固有方程式 (特性方程式) と呼ぶ。これを行列記号を用いて表わせばつぎのようになる。式 (10) の左辺の $\{ \}$ の中を行列 $\mathbf{H}$ の uv 行、 jk 列の要素 $h_{uv, jk}$ とおけば

$$h_{uv, jk} = \sum_{t=1}^T \left(n^t(jk)n^t(uv)/n_t \right) - n_{jk}n_{uv}/N \quad \dots\dots\dots(13)$$

同様に、右辺の $\{ \}$ の中を行列 $\mathbf{F}$ の uv 行 jk 列要素 $f_{uv, jk}$ とおけば

$$f_{uv, jk} = f_{uv}(jk) - n_{jk}n_{uv}/N \quad \dots\dots\dots(14)$$

となる。また $\mathbf{X}$ を列ベクトル

$$\mathbf{X} = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1K_1}, x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2K_2}, \dots, x_{M1}, x_{M2}, \dots, x_{MK_M})' \quad \dots\dots\dots(15)$$

とする。

これらを用いると式 (10) はつぎのように書ける。

$$\mathbf{H}\mathbf{X} = \eta^2 \mathbf{F}\mathbf{X} \quad \dots\dots\dots(16)$$

行列 $\mathbf{H}$ と $\mathbf{F}$ は式 (13), (14) から対称行列であるから式 (16) は η^2 を固有値とする一般固有方程式であり、 $\eta^2 \neq 0$ でない根は $T-1$ 個であるが、 $\eta^2 = 1$ でない最大固有値とそれに応ずる固有ベクトル $\mathbf{X}$ を求めることができる。ここで求められる固有値の平方根が相関比であり、固有ベクトルが “ある数量 x_{jk} ” である。これをスコアと呼び $\{x_{jk}\}$ で表わす。

外的基準 Y が 2 分類すなわちグループ数が 2 である場合は、式 (3) は

$$\eta^2 = (\bar{\alpha}_1 - \bar{\alpha}_2) / \sigma^2 \quad \dots\dots\dots(17)$$

におきかえることができ、 η^2 を最大にする x_{jk} を求める問題となる。これは式 (12), (16) の記号を用いて

$$\mathbf{F}\mathbf{X} = \mathbf{h} \quad \dots\dots\dots(18)$$

の連立 1 次方程式の解として求められる。ここに $\mathbf{h}$ は次数 $\sum_{j=1}^M K_j$ の列ベクトルで、その jk 行の要素は

$$n^1(jk)/n_1 - n^2(jk)/n_2 \quad \dots\dots\dots(19)$$

である。(付録 (2) 参照)

式 (18) の解 $\mathbf{X}$ が求めれば、相関比は

$$\frac{n_1 \cdot n_2}{N} (\mathbf{X}, \mathbf{h}) \quad \dots\dots\dots(20)$$

で計算できる。ここで $(\mathbf{X}, \mathbf{h})$ はベクトルの内積である。

式 (16) や (18) の行列 $\mathbf{H}, \mathbf{F}$ はカテゴリの総数 $\left(= \sum_{j=1}^M K_j \right)$ 元の行列であるが、その階数 (rank) は $\sum_{j=1}^M K_j - M$ になっている。したがって、式 (16), (18) を解く際には各項目において、どれか 1 つのカテゴリに応ずる方程式を削除して解かねばならない。このとき、削除された方程式に対する数量 x_{jk} は任意の値でよいが、このプログラムでは 0 を与える。式 (16) の数値解法は付録 (3) で説明してある。式 (18) の数値解法には消去法を用いた。

求められた数量 x_{jk} に対して各項目ごとにカテゴリの反応数 n_{jk} を荷重した平均数量

$$\bar{x}_j = \frac{\sum_{k=1}^{K_j} n_{jk} x_{jk}}{N} \dots\dots\dots(21)$$

$$(j=1, 2, \dots, M)$$

を求める。これを用いて

$$x_{jk}' = x_{jk} - \bar{x}_j \dots\dots\dots(22)$$

$$(j=1, 2, \dots, M, k=1, 2, \dots, K_j)$$

を計算する。この数量 x_{jk}' は統一をはかるためどの項目の中でも $\sum_{k=1}^{K_j} n_{jk} x_{jk}' = 0$ ($j=1, 2, \dots, M$) が成立つようにしてある。これを正規化した数量と呼んでいる。

数量 x_{jk}' が求まれば、式 (2) から個々の標本に対する α_i の値が計算できる。これをサンプルスコアと呼ぶ。これを用いて、グループごとの度数分布を作る。この度数分布がグループ間で完全に離れたものになれば、数量化II型の結果は成功したとみなされる。その尺度を求めるために標本スコア α_i を用いて、判別のため規準を作る必要がある。

2.2 適中率の決定

いま外的基準 Y が2つのグループに分類されているとし、それを G_1 と G_2 で表わす。総数 N の標本は G_1 から n_1 個、 G_2 から n_2 個 ($n_1+n_2=N$) 集められたとし、 α_i の G_1 , G_2 における度数分布を近似的に正規分布で表現し、それを $f_1(\alpha)$, $f_2(\alpha)$ で表わす。これは α_i の G_1 , G_2 での平均値 $\bar{\alpha}_1$, $\bar{\alpha}_2$, 標準偏差 σ_1 , σ_2 を用いて作ることができる。いま、 $\bar{\alpha}_1 < \bar{\alpha}_2$ であるとしたとき、任意の x_0 を用いて、 $\alpha_i > x_0$ ならその標本は G_2 グループに属し、 $\alpha_i \leq x_0$ ならその標本は G_1 グループに属すると判別するとき、判別の適中率は

$$P(x_0) = \frac{n_1}{N} \int_{-\infty}^{x_0} f_1(\alpha) d\alpha + \frac{n_2}{N} \int_{x_0}^{\infty} f_2(\alpha) d\alpha \dots\dots\dots(23)$$

で求まる。 $P(x_0)$ の値は x_0 のとり方に依存するから、 $P_0(x_0)$ を最大にするような x_0 を求めればよい。そのような x_0 を x^* とすれば、 x^* は

$$\frac{n_1}{N} f_1(x^*) = \frac{n_2}{N} f_2(x^*) \dots\dots\dots(24)$$

を満たすことが知られている。この x^* に対する最大適中率は式 (23) の x_0 を x^* でおきかえたものになる。

外的基準 Y が3以上のグループに分類されているときも同様にして

$$\pi_i f_i(x_i^*) = \pi_{i+1} f_{i+1}(x_i^*) \dots\dots\dots(25)$$

$$(i=1, 2, \dots, T-1)$$

を満たす x_i^* を用いて最大適中率は

$$P(x_1^*, x_2^*, \dots, x_{T-1}^*) = \pi_1 \int_{-\infty}^{x_1^*} f_1(\alpha) d\alpha + \sum_{t=2}^{T-1} \pi_t \int_{x_{t-1}^*}^{x_t^*} f_t(\alpha) d\alpha + \pi_T \int_{x_{T-1}^*}^{\infty} f_T(\alpha) d\alpha \dots\dots\dots(26)$$

で計算できる。ここに $\pi_i = \frac{n_i}{N}$ ($n_1+n_2+\dots+n_T=N$) である。

式 (24) を満たす x^* はつぎのようにして求められる。 G_1, G_2 グループでの α_i の度数分布の正規分布近似が

$$f_1(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left\{-\frac{(\alpha - \bar{\alpha}_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}$$

$$f_2(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp\left\{-\frac{(\alpha - \bar{\alpha}_2)^2}{2\sigma_2^2}\right\}$$

であり、 $\bar{\alpha}_1 < \bar{\alpha}_2$, $\pi_1 = n_1/N$, $\pi_2 = n_2/N$ ($n_1 + n_2 = N$) とする。このとき式 (24) を満たす x^* は

$$\left(\frac{1}{\sigma_1^2} - \frac{1}{\sigma_2^2}\right)x^2 + 2\left(\frac{\bar{\alpha}_1}{\sigma_2^2} - \frac{\bar{\alpha}_2}{\sigma_1^2}\right)x + \left(\frac{\bar{\alpha}_1^2}{\sigma_1^2} - \frac{\bar{\alpha}_2^2}{\sigma_2^2}\right) - 2\ln\left(\frac{\pi_1\sigma_2}{\pi_2\sigma_1}\right) = 0$$

の解から求まる。これは x に関する 2 次方程式であるから 2 根あり、それを x_{12}, x_{12}' とするとき、これらが実根で $\bar{\alpha}_1 < x_{12} < \bar{\alpha}_2$ または $\bar{\alpha}_1 < x_{12}' < \bar{\alpha}_2$ を満たし、かつ $P(x_{12})$ または $P(x_{12}')$ のうち大きい方の根を x^* とする。この点を分布の分割点と呼ぶ。

分類が 3 の場合には式 (25) による解は、分布 f_1 と f_2 から 2 根 (x_{12}, x_{12}')、分布 f_2 と f_3 とから 2 根 (x_{23}, x_{23}') の 4 個となる。したがって、分布の分割点の可能な組合せは (x_{12}, x_{23})、(x_{12}, x_{23}')、(x_{12}', x_{23})、(x_{12}', x_{23}') の 4 通りがある。分布の平均値が $\bar{\alpha}_1 < \bar{\alpha}_2 < \bar{\alpha}_3$ となっていれば、それに応じて $x_{12} < x_{23}$, $x_{12} < x_{23}'$, $x_{12}' < x_{23}$, $x_{12}' < x_{23}'$ が成立していなければならない。これが成立しない組合せは分割点として利用できない。もちろん $x_{12}, x_{12}', x_{23}, x_{23}'$ に虚根があれば、それに対する組合せは除外される。こうして決められた分割点の組合せに対して、式 (26) を最大にする根の組合せが分割点として決定し、それに応ずる式 (26) の値が適中率として使われる。(付録 (4) 参照)

分布の分割点が決定了ら、個々の標本スコア α_i の値が上記で分割されたグループの分布のどれに属するかを決定できる。この決定によるグループ番号ともの所属グループ番号とが一致していれば、その標本は正しく分類されたことになる。正しく分類された個数 (m_0) を総数 N で割ったものは適中率であり、これは式 (26) から計算したものと計算誤差の範囲内で一致する。

以上のようにスコア $\{x_{jk}\}$ から α_i を計算しそれによる分布にもとづいて行う分類 (判別) は α_i を 1 次元的な尺度として扱う場合である。外的基準が 3 分類以上になっているときは多次元的な尺度を構成することが可能である¹⁴⁾。3 分類以上のとき、式 (16) は $T-1$ 個の固有値とそれに応ずる固有ベクトル解を持つ。いまその固有値を大ききの順に $\eta_1^2 > \eta_2^2 > \dots > \eta_{T-1}^2$ とし、それに応ずる固有ベクトルを $\{x_{jk}^{(l)}\}$ $l=1, 2, \dots, T-1$ とする。もちろん、 η_1^2 と $\{x_{jk}^{(1)}\}$ は、これまで説明の中で用いたスコア $\{x_{jk}\}$ そのものである。各 η_l^2 に応ずるスコアを式 (2) に代入して標本に対する判別値 $\alpha_i^{(l)}$ $l=1, 2, \dots, T-1$ が計算できる。つまり、各標本にベクトル判別値 ($\alpha_i^{(1)}, \alpha_i^{(2)}, \dots, \alpha_i^{(T-1)}$) を対応させることができる。これを用いて判別 (分類) を行う方法は一通りではないが、このプログラムではつぎの方法を用いた。

η_l^2 に対応するスコアの各グループごとの中心値 $\bar{x}_i^{(l)}$ を次式で求める。

$$\bar{x}_i^{(l)} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^{K_j} n_{jk}^{(l)} x_{jk}^{(l)} / N \dots\dots\dots (27)$$

$$(l=1, 2, \dots, T, i=1, 2, \dots, T-1)$$

いま i 標本の各グループの中心値からの距離の尺度として

$$D_{li} = \sqrt{\sum_{l=1}^{T-1} (\alpha_i^{(l)} - \bar{x}_{li})^2} \dots\dots\dots(28)$$

$$(l=1, 2, \dots, T, i=1, 2, \dots, N)$$

を用いる。l をグループ間で動かしたときの最小値は i 標本が最も近いグループを示すから、これを用いて標本の所属するグループを決めることができる。この方法を用いたとき、判別の適中率は上のようにして判別したグループの番号と、もとのグループの番号が一致した個数 (m_l) をそのグループの標本数 (n_l) で割ったものがそのグループの適中率になる、したがって全体の判別の適中率 P は

$$P = \sum_{l=1}^T \pi_l P_l, P_l = m_l/n_l$$

で計算できる。

3. プログラムの内容

3.1 プログラムの識別

- a) プログラム名; QUNT 2
- b) 作成者; 川端幸蔵
- c) 作成年月; 1977・2
- d) 形式; 独立したプログラム
- e) 使用言語; FORTRAN (JIS 水準 7,000)

3.2 目的

このプログラムは数量化Ⅱ型の解析を反応パタン表を原データとし、その解析に必要な一連の結果を得るものである。

3.3 プログラムの機能

このプログラムで処理できる内容の概要はつぎの通りである。

- a) 項目数は 20 までで、項目のカテゴリ数と外的基準のグループ数の総数が 40 までの反応パタン表をデータとして数量化Ⅱ型の計算ができる。
- b) 項目に適当な名前をつけて扱うことが任意機能としてある。
- c) データが、このプログラムで指定された以外の様式で作成されているときは、可変フォーマットカードを使用して入力できる機能を持っている。
- d) 入力された項目の適当な組合せを、セレクトカードで指定して解析できる機能を持っている。
- e) データを読み込ませる機器をカード、紙テープもしくは磁気テープ等に使い分けられるように、入力機器を論理名で与えてある。
- f) 数量化Ⅰ型⁹⁾のデータと互換できるようになっている。

4. 印刷結果の見方

このプログラムは以下に述べる 8 種類の表を印刷する。(図 4 参照)

***** TABLE 1;

これは入力されたデータのモニタを取る部分で、タイトル、標本数、項目数、各項目のカテゴリ数、項

目に与えた名前綴り（名前づけカードを用いたときのみ）、可変 FORMAT カードのモニタ（可変 FORMAT カードを用いたときのみ）に続いて、標本データのモニタを印刷する。この標本のモニタを印刷する際に、カテゴリ番号のチェックを行う。このチェックによって誤りがあったときは、その行に ERROR と印刷する。このときはデータのチェックをして再計算させればよい。

***** TABLE 2;

この見出しで印刷されるものはクロス表である。クロス表は2つの部分に分かれていて、第1の部分は式(12)のクロス集計であり、第2の部分は項目・カテゴリのグループ内へのクロス集計である。

***** TABLE 3;

この表は式(16)の解である固有値と相関比を印刷し、続いて、見出し SCORE の列は固有ベクトルであり、その右2列は式(21)、式(22)から計算した平均スコア、正規化したスコアである。外的基準が2分類のときは固有値は印刷されず、見出し SCORE の列は式(18)の解である。

***** TABLE 4;

この表は、上記の正規化されたスコアの項目ごとの平均値、標準偏差、変動係数、分散・共分散行列、相関係数行列をグループ別と全体について印刷する。

***** TABLE 5;

この表は、正規化されたスコアを用いた式(2)を用いた標本スコアである。表の後半はこの標本スコアのグループごとの平均値、分散と標準偏差である。

***** TABLE 6;

この表は上記標本スコアに対するグループ別の度数分布である。度数分布の階級数は、標本数が200以下のときは15にし、200以上のときは20に設定してある。表の後半の部分に分類の適中率と、分布の分割点が印刷してある。

***** TABLE 7;

この表は前表に印刷されている分布の分割点を用いて、設定した各グループに個々の標本を分類した結果である。もとのグループ番号と分類されたグループ番号の一致した割合は上記の適中率とほぼ一致する。

***** TABLE 8;

この表は、ベクトル標本スコアによる分類結果であって、外的基準が3分類以外のときにのみ印刷される。

表は3つの部分に分かれており、第1の部分は式(16)の解である固有ベクトルスコアである。見出し SOLUTION の番号は固有値の大きさの順に対応している。

第2の部分には式(27)によるグループごとの重心点を固有ベクトルスコアの順に印刷してある。

第3の部分はベクトル標本スコアによる分類結果で、もとのグループ番号と新しく分類されたグループ番号を対にして印刷してある。2つの番号が合致した割合が分類の適中率である。

TABLE 8 は TABLE 7 における適中率が求められないときに利用するとよい。

5. データシートの書き方

5.1 カードの種類

このプログラムを実行させるには、つぎのようにデータカードをセットすることが必要である。データカードの種類は8種類あるが、このうち、*印のついたものは、必要でないときには省略できる。(図1,

図2. データデッキの構成

2参照)。

- ① プロブレムカード (1枚)
- ② コントロールカード (1枚)
- ③ カテゴリ指定カード (1枚)
- ④* 名前づけカード (②の中で指定した枚数)
- ⑤* 可変フォーマットカード (②の中で指定されたときのみ1枚)
- ⑥ 標本データカード(②の中で指定した枚数)
- ⑦* セレクトカード (②の中で指定した枚数)
- ⑧ END (または STOP) カード (1枚)

5.2 個々のカードの書き方

上記8種類のカードは個々にその使用欄が決め

られている。その書き方の一般型を図1に示す。なお、この項の説明で〔 〕内に書いてあるのは、そのカードが読み込まれるときの FORMAT 文の欄記述子である。

- ① プロブレムカード [A7, 3X, A5, 5X, 15A4]

欄 欄

1~7 PROBLEM と書く。

8~10 空白にする。

11~15 QUNT 2 と書く。

16~20 空白にする。

21~80 この計算を行うデータを明示するために60字までの任意名(タイトル)を書くことができる。ここに書かれた60字(カタカナも使用してよい)までのタイトルはそのまま計算結果に印刷される。

- ② コントロールカード [10X, 7(A4, 2X, I4)]

このカードは計算に使うパラメタを与えるために使う。パラメタは下記の5種類あるが、そのうち必要なものだけをつぎのように書く。パラメタ綴りのうち「」は空白の記号である。

欄 欄

1~10 このカードを明示するために、この間に CONTROL と書くことよい。読み込みには、この10欄は無視される。

11~14 次表に示すパラメタ名(4文字)を書く。

15~16 空白にする。

17~20 上のパラメタ名をもつパラメタの値をこの4欄に右ヅメで書く。小数点をつけてはならない。

21~30 上記11欄~20欄と同じように、別のパラメタを与える。

31~40, 41~50, 51~60, 61~70, 71~80の各10欄も同様に使える。

パラメタの種類

パラメタ名	パラメタの値 (意味と注意)
a) ITEM	入力される項目の個数。
b) DATA	標本数。{1つの標本はカードの1枚に入れられるから、この値は標本カードの枚数でもある。}
c) NAME	入力される各項目に、名前綴り(8文字まで)を与えるために用いるカードの枚数。
d) FMT□	可変 FORMAT カードを使うときのみ 1 にする。{標本データの記入様式が標準(10X, 20 I 2, 30X) 以外のときは可変 FORMAT でその書式を与えなければならない。そのとき、このパラメタの値は 1 とする。}
e) SEL□	セレクトカードの枚数。{⑦で説明するセレクトカードは入力された項目を任意に指定して解析させるために使われる。そのセレクトカードの枚数がこのパラメタの値となる。なお、セレクトカードを用いないときは、入力された項目がすべて解析の対象になり、最後の項目が外的基準の項目になる。}

なお、パラメタ a), b) は必ず必要であるが、c), d), e) は必要がなければ省略してよい。
また、これらのパラメタはどの順に書いてもよい。

③ カテゴリ指定カード(10X, 20 I 2)

欄 欄

1~10 このカードを明示するために、CATEGORY と書くのがよい。読み込みにはこの 10 欄は無視される。

11~12 第 1 項目のカテゴリ数を右ヅメに書く。

13~14 第 2 項目のカテゴリ数を右ヅメに書く。

以下同様に、2 欄ずつを用いて、項目のカテゴリ数を書く。その個数は②のコントロールカードで与えるパラメタ(パラメタ名 ITEM)の値と同じでなければならない。第 1 項目、第 2 項目、……の順は⑥で説明する標本データカードに書かれる項目の、左側からの順に対応する。

④ 名前づけカード(10X, 7(I 2, A 8))

欄 欄

1~10 このカードを明示するために、NAME と書くのがよい。読み込みにはこの 10 欄は無視される。

11~12 項目の番号を右ヅメに書く。項目の番号は、⑥で説明する標本データカードに書かれる項目の左側から順に、1, 2, 3, …… が対応する。

13~20 上の 2 欄に書かれた番号の項目に与える綴り名をこの間に書く。カタカナや特殊記号を含めて、8 文字まで使用できる。

21~30, 31~40, …… , 71~80 の各 10 欄も上と同様に使用できる。そのとき、どれかの 10 欄が全く空白でもよいし、どれかの 10 欄に同じ番号のものがあれば、後の方が利用される。

このカードは②で、パラメタ名が NAME で、その値が m のときは、 m 枚必要である。このカードを用いないときは、各項目に ITEM 1, ITEM 2, …… という綴りをプログラムで与える。

⑤ 可変 FORMAT カード(10X, 17A 4, A 2)

欄 欄

1~10 このカードを明示するために、FORMAT と書くがよい。読み込みにはこの 10 欄は無視される。

11~80 標本データカードを読み込むための FORMAT 文の欄記述子群を左カッコ (から右カッコ)

にはさんで書く。途中で空白をいれてもよい。

このカードは②でパラメタ名が、FMT でその値が1のときのみ必要である。

⑥ 標本データカード [10X, 20 I 2]

このカードは標本ごとに1枚が使用されるから、その枚数は②のカードで与えるパラメタ名 DATA のとる値 N 枚を必要とする。個々の標本カードは、下記の欄指定に従って書くことを標準とし、これ以外の書式を用いるときは、可変 FORMAT カードで指定しなければならない。

欄 欄

1~10 個々の標本を明示するための標本番号を書くことよい。読み込みには無視するが誤記カードを探すには便利である。

11~12 第1項目について、この標本がチェックされたカテゴリ番号を右ヅメに書く。

13~14 第2項目について、この標本がチェックされたカテゴリ番号を右ヅメに書く。

以下同様に各2欄ずつを用いて、各項目のカテゴリ番号を書く。その個数は、②のカードで与えたパラメタ名 ITEM の値 k に等しくなければならない。

⑦ セレクトカード [10X, 20 I 2]

このカードは、入力された項目に対して、どのような項目の組合せで解析するかを指定するためのもので、つぎのように書く。

欄 欄

1~10 このカードを明示するために、SELECT と書くのがよい。読み込みではこの10欄は無視される。

11~12 解析に組み入れる項目の番号を右ヅメに書く。

13~14, 15~16, ……の各2欄も同様に、解析に組み入れる項目の番号を書く。そのとき、最後に書かれた番号の項目が外的基準になる。

このカードは、②のカードでパラメタ名 SEL が値 l を持つとき、 l 枚が必要になる。このカードを用いないときは、入力されたすべての項目が解析に組み入れられ、⑥の標本カードの一番最後の項目が外的基準になる。

⑧ END (または STOP) カード [①と同じ]

欄 欄

1~4 END (または STOP) と書く。

5~80 空白にする。

6. 使 用 例

森林の機能別調査の一環として行われたデータを用いて、このプログラムの使用法を示す。ここで用いるデータは前橋営林局から借用した。森林の水資源かん養機能を地質、土壌、傾斜、標高の4つの項目により評価分類するために、259箇所の調査点が選ばれた。各アイテムは表2のようにカテゴリ化されている。

各調査点でのアイテムごとの観測結果と、既往の調査結果、現地の状況等を総合的に勘案し、その地点の水資源かん養機能発揮の可能性の大きさを、3段階評価したものを外的基準とした。この調査データの反応パタン表の1部分を表3に示す。表3をデータシートに記入したものが図3(1部省略)である。

このデータシートの計算結果は図4の通りである。

表2. 項目のカテゴリ規準

地質のカテゴリ規準		
カテゴリー C ₁₁	カテゴリー C ₁₂	カテゴリー C ₁₃
第四紀の地質・岩石	第三紀の地質・岩石	第三紀以前の地質・岩石
土壌のカテゴリ規準		
カテゴリー C ₂₁	カテゴリー C ₂₂	カテゴリー C ₂₃
森林造成適地の土壌型	中庸地の土壌型	森林造成不適地の土壌型
傾斜 (S) のカテゴリ規準		
カテゴリー C ₃₁	カテゴリー C ₃₂	カテゴリー C ₃₃
$S \leq 15^\circ$	$15^\circ < S \leq 30^\circ$	$30^\circ < S$
標高 (H) のカテゴリ規準		
カテゴリー C ₄₁	カテゴリー C ₄₂	カテゴリー C ₄₃
$\frac{H_h+2H_l}{3} \leq H < \frac{2H_h+H_l}{3}$	$H \geq \frac{2H_h+H_l}{3}$	$H < \frac{H_h+2H_l}{3}$

ここに H_h は対象地域内の山峰の高木群落の分布上限標高の平均値, H_l は対象地域内の森林分布下限標高値である。

表3. 水資源かん養機能調査反応パターン表

(阿賀野川流域：前橋営林局)

標本番号	項目とカテゴリ												外的基準		
	地 質			土 壌			傾 斜			標 高					
	C ₁₁	C ₁₂	C ₁₃	C ₂₁	C ₂₂	C ₂₃	C ₃₁	C ₃₂	C ₃₃	C ₄₁	C ₄₂	C ₄₃	群1	群2	群3
1			✓	✓				✓			✓				✓
2		✓			✓			✓			✓				✓
3		✓		✓					✓		✓				✓
4		✓		✓				✓			✓				✓
5		✓			✓				✓		✓				✓
中 略															
257		✓			✓		✓				✓				✓
258		✓		✓				✓			✓		✓		
259			✓	✓					✓		✓				✓
列の計	70	133	56	85	90	84	50	138	71	95	51	113	77	121	61

数量化Ⅱ型(使用例) DATA SHEET

PROBLEM

WRITTEN BY

PAGE

OF

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
1	PROBLEM	QUANT2	キノコベニツクシ(ミズシカクカシヨキノ)																				マエハシ	1977										
2	CONTROL	ITEM	5DATA	259	NAME	1SEL	1																											
3	CATEGORY	3	3	3	3	3																												
4	NAME	1	キノ	ツク	2	トシヨウ	3	ケイシヤ	4	ヒヨウ	5	スイク	ツ	=	Y																			
5		3	1	2	3	2																												
6		2	2	2	3	2																												
7		2	1	3	3	2																												
8		2	1	2	3	2																												
9		2	2	3	3	2																												
10		3	2	2	3	3																												
11		2	2	3	3	2																												
12		3	1	2	3	2																												
13	~~~~~																																	
14	以下中略																																	
15	~~~~~																																	
16	~~~~~																																	
17	~~~~~																																	
18	~~~~~																																	
19	~~~~~																																	
20		2	3	1	3	2																												
21		2	1	2	2	1																												
22		3	1	3	3	3																												
23	SELECT-A	1	2	3	4	5																												
24	END																																	
25																																		

図3. 使用例のデータ(一部省略)

☒ 4.

***** QUANTIFICATION (TYPE 2) *****

***** TABLE 1: INPUT MONITOR

DATA NAME キノウハツチヨウリ(ミスシカシカチヨウキノ) マシヨキヨ 1977
 SAMPLES 259
 ITEMS 5
 CATEGORY IN ITEM 3, 3, 3, 3, 3,
 NAME OF ITEM チシツ, トシヨウ, カイシト, ヒヨコウ, スイカシ=Y,

NO.	ITEM CATEGORY NO.	NO.	ITEM CATEGORY NO.
1	3 1 2 3 2	2	2 2 2 3 2
3	2 1 3 3 2	4	2 1 2 3 2
5	2 2 3 3 2	6	3 2 2 3 3
7	2 2 3 3 2	8	3 1 2 3 2
9	2 3 3 3 3	10	2 2 2 3 2
11	2 1 1 1 1	12	2 1 2 1 1
13	2 3 3 1 3	14	2 1 2 1 1
15	3 1 3 1 2	16	3 3 3 2 3
17	1 3 1 3 2	18	2 2 3 3 2
19	3 2 1 3 2	20	3 1 1 3 2
21	3 2 1 3 2	22	2 1 1 3 1
23	3 2 1 3 2	24	2 2 2 3 2
25	2 3 3 3 3	26	1 2 2 1 1
27	1 1 2 3 1	28	2 2 1 1 1
29	3 3 3 3 3	30	2 3 2 1 2
31	2 1 3 3 2	32	2 2 2 1 2
33	3 2 2 1 2	34	2 1 2 1 1
35	2 3 3 2 3	36	2 3 3 2 3
37	1 3 1 3 2	38	1 3 1 3 2
39	3 3 2 3 3	40	3 2 1 3 2
41	2 1 2 3 2	42	3 1 2 3 2
43	2 2 3 3 2	44	3 2 2 3 3
45	3 2 2 3 3	46	3 1 2 3 2
47	3 3 1 3 3	48	3 3 1 3 3
49	1 1 2 3 1	50	3 2 2 3 3
51	2 3 3 1 3	52	2 3 2 3 3
53	1 3 1 3 2	54	1 3 1 3 2
55	3 2 2 3 3	56	2 2 2 3 2
57	1 1 2 3 1	58	2 1 2 3 2
59	1 3 3 3 3	60	1 1 2 3 1
61	1 2 2 3 2	62	1 3 2 2 2
63	1 1 2 3 1	64	2 2 2 2 2
65	2 3 3 2 3	66	2 2 2 3 2
67	1 3 2 3 2	68	1 1 3 3 2
69	1 1 2 3 1	70	2 2 2 3 2
71	1 3 2 3 2	72	2 1 2 3 2
73	2 3 3 1 3	74	2 2 3 1 2
75	2 1 1 3 1	76	2 2 2 3 2
77	2 1 1 3 1	78	3 2 1 3 2
79	2 1 1 3 1	80	1 2 2 3 2
81	2 3 3 3 3	82	2 2 2 3 2

図 4. つ つ 木

83	2	1	2	3	2
85	2	3	2	2	2
87	2	3	3	2	3
89	1	3	3	3	3
91	2	3	3	1	3
93	1	2	2	1	1
95	1	2	2	1	1
97	2	3	3	1	3
99	3	3	3	1	3
101	2	1	2	1	1
103	2	2	2	3	2
105	1	1	3	3	2
107	1	3	2	1	2
109	2	1	2	1	1
111	3	2	3	1	3
113	3	2	2	1	2
115	3	2	2	3	3
117	2	3	2	2	2
119	3	1	2	1	1
121	2	1	3	1	1
123	1	1	1	2	1
125	1	3	1	2	2
127	1	1	1	2	1
129	2	3	3	1	3
131	3	2	2	3	3
133	2	3	3	3	3
135	2	1	3	3	2
137	2	2	2	3	2
139	1	2	1	3	1
141	1	3	1	1	1
143	1	1	1	1	1
145	1	3	3	2	2
147	2	1	2	1	1
149	1	1	1	2	1
151	1	1	2	2	1
153	2	3	3	1	3
155	3	3	3	3	3
157	2	2	3	1	2
159	3	2	2	1	2
161	2	1	3	3	2
163	3	2	3	3	3
165	3	3	3	1	3
167	2	1	3	2	1
169	2	3	3	2	3
171	2	3	2	3	3
173	2	2	2	3	2
175	2	1	1	3	1
177	2	2	2	1	2
179	1	3	1	1	1
181	2	1	2	1	1
183	1	3	3	1	2
185	1	1	1	1	1
187	2	3	2	3	3
189	2	3	3	2	3
191	1	2	2	1	1
193	2	2	3	1	2
195	2	2	2	1	2
197	2	2	2	1	2
199	2	2	1	1	1
201	2	1	2	1	1
203	3	1	1	1	1
205	3	2	3	1	3
207	2	1	2	1	1
209	2	3	2	1	2

84	1	1	2	3	1
86	2	2	2	3	1
88	2	2	3	2	2
90	2	3	3	3	3
92	1	3	3	3	3
94	3	1	1	3	2
96	3	2	2	3	3
98	3	1	2	3	2
100	2	2	2	3	2
102	2	1	2	2	1
104	3	2	2	3	3
106	2	3	2	1	2
108	2	3	3	2	3
110	1	1	2	3	1
112	3	3	2	3	3
114	3	2	2	2	2
116	2	2	1	3	2
118	2	2	2	1	2
120	1	3	1	1	1
122	2	1	2	2	1
124	1	1	2	1	1
126	2	3	1	2	2
128	3	3	3	3	3
130	2	2	2	3	2
132	3	3	1	2	3
134	2	2	2	3	3
136	2	3	2	3	3
138	3	3	2	3	3
140	1	1	2	3	1
142	1	2	2	3	2
144	1	1	1	1	1
146	2	2	3	1	2
148	1	2	2	1	1
150	1	2	2	1	1
152	3	1	2	1	1
154	2	1	2	1	1
156	2	2	2	3	2
158	2	3	3	3	3
160	2	3	3	1	3
162	1	2	2	3	2
164	3	3	2	1	3
166	3	1	2	3	2
168	3	2	2	3	3
170	2	2	2	1	2
172	3	3	2	3	3
174	2	2	3	1	2
176	2	1	2	3	2
178	2	3	2	1	2
180	2	2	2	1	2
182	2	3	3	1	3
184	1	3	3	1	2
186	1	3	2	2	2
188	1	1	2	3	1
190	2	1	1	3	1
192	1	1	2	1	1
194	2	2	2	1	2
196	2	1	2	1	1
198	2	3	2	1	2
200	2	3	2	1	2
202	3	1	1	1	2
204	2	2	2	1	2
206	2	3	2	2	2
208	2	2	2	1	2
210	2	2	3	1	2

211	2 1 3 3 2	212	1 2 1 1 1
213	1 3 3 1 2	214	1 1 1 3 1
215	1 2 3 1 1	216	1 3 2 1 2
217	3 3 3 1 3	218	2 1 2 1 1
219	3 3 3 2 3	220	1 1 2 1 1
221	2 1 3 1 1	222	1 3 2 2 2
223	2 3 2 2 2	224	2 1 3 2 2
225	2 2 2 2 2	226	2 2 2 1 2
227	1 1 2 1 1	228	3 2 2 2 2
229	1 2 2 2 1	230	2 1 2 1 1
231	2 3 3 2 3	232	2 2 2 1 2
233	3 1 1 1 1	234	2 2 1 2 1
235	2 3 2 2 2	236	1 3 3 2 2
237	2 2 2 2 2	238	3 2 1 2 2
239	3 1 1 1 1	240	2 3 3 2 3
241	2 1 2 1 1	242	2 1 2 1 1
243	2 1 2 1 1	244	2 2 3 1 2
245	2 2 2 2 2	246	2 1 3 2 2
247	2 3 1 2 2	248	1 3 1 2 2
249	1 1 1 2 1	250	1 1 2 2 1
251	1 2 2 2 1	252	2 3 1 2 2
253	1 1 3 1 1	254	1 2 1 3 1
255	1 2 3 3 2	256	1 2 3 2 2
257	2 3 1 3 2	258	2 1 2 2 1
259	3 1 3 3 3		

***** TABLE 1-1: SELECTED ITEMS AND OUTSIDER FOR ANALYSIS BY SELECT CARD (SELECT-A)

OUTSIDER Y = スイクン=Y (GROUP = 3)
 ITEM X(1) = チシツ (CATEGORY = 3)
 ITEM X(2) = トシマコ (CATEGORY = 3)
 ITEM X(3) = ケイシト (CATEGORY = 3)
 ITEM X(4) = ヒヨウク (CATEGORY = 3)

***** TABLE 2: CROSS TABLE (1) ***** F(I;J;L;M)

ITEM-CATEGORY	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
チシツ	1	70	0	27	18	25	21	35	14	23	17	30		
	2	0	133	0	42	47	44	16	73	44	57	29	47	
	3	0	0	56	16	25	15	13	30	13	15	5	36	
トシマコ	1	4	27	42	16	85	0	0	20	52	13	33	12	40
	2	5	18	47	25	0	90	0	13	59	18	34	13	43
	3	6	25	44	15	0	0	84	17	27	40	28	26	30
ケイシト	1	7	21	16	13	20	13	17	50	0	0	14	11	25
	2	8	35	73	30	52	59	27	0	138	0	52	23	61
	3	9	14	44	13	13	18	40	0	0	71	29	17	25
ヒヨウク	1	10	23	57	15	33	34	28	14	52	29	95	0	0
	2	11	17	29	5	12	13	26	11	23	17	0	51	0
	3	12	30	47	36	40	43	30	25	63	25	0	0	113

図 4. つづき

***** TABLE 2: CROSS TABLE (2) CROSS SECTION ON OUTSIDER GROUP (G(T;J;K) T=1,2,....,NGROUP)

ITEM.CATEGORY	NO.	GROUP 1	GROUP 2	GROUP 3
チシツ	1 1	40	27	3
	2 2	32	75	28
	3 3	5	21	30
トシマヨ	1 4	59	25	1
	2 5	15	61	14
	3 6	3	35	46
クイシト	1 7	27	21	2
	2 8	46	72	20
	3 9	4	28	39
ヒヨク	1 10	44	36	15
	2 11	14	26	11
	3 12	19	59	35
GROUP TOTAL OF OUTSIDER		77	121	61

***** TABLE 3: THE SOLUTION SCORE

EIGEN VALUE = 0.83871,

CORRELATION RATIO = 0.9158

ITEM	CATEGORY	SCORE	MEAN SCORE	NORMAL SCORE
チシツ	1	-0.475394E 00	-0.258467	-0.216928
	2	-0.253122E 00		0.005344
	3	0.000000E 00		0.258467
トシマヨ	1	-0.599327E 00	-0.301315	-0.298012
	2	-0.301087E 00		0.000228
	3	0.000000E 00		0.301315
クイシト	1	0.000000E 00	0.223791	-0.223791
	2	0.200581E 00		-0.023210
	3	0.426502E 00		0.202711
ヒヨク	1	-0.832658E-01	0.046291	-0.129557
	2	0.000000E 00		-0.046291
	3	0.176103E 00		0.129812

***** TABLE 4: STATISTICS ON NORMAL SCORE

..... FOR GROUP NO. 1

	** MEAN **	** S.D **	** C.V(%) **
チシフ	-0.93685E-01	0.14149E 00	-151.02
トシヨク	-0.21656E 00	0.15712E 00	-72.55
ケイシト	-0.81807E-01	0.11543E 00	-141.11
ヒヨク	-0.50417E-01	0.10769E 00	-213.60

** VARIANCE COVARIANCE MATRIX **

	チシフ	トシヨク	ケイシト	ヒヨク
チシフ	0.200181E-01			
トシヨク	-0.745528E-02	0.246878E-01		
ケイシト	-0.979198E-03	-0.369727E-02	0.133252E-01	
ヒヨク	-0.405930E-02	-0.314657E-02	-0.252792E-02	0.115971E-01

** CORRELATION MATRIX **

	チシフ	トシヨク	ケイシト	ヒヨク
チシフ	1.0000			
トシヨク	-0.3354	1.0000		
ケイシト	-0.0600	-0.2038	1.0000	
ヒヨク	-0.2664	-0.1860	-0.2034	1.0000

..... FOR GROUP NO. 2.

	** MEAN **	** S.D **	** C.V(%) **
チシフ	-0.32357E-03	0.14870E 00	-45955.03
トシヨク	0.25699E-01	0.20964E 00	815.76
ケイシト	-0.57420E-02	0.13597E 00	-2367.99
ヒヨク	0.14804E-01	0.11598E 00	783.44

図4. つづき

** VARIANCE COVARIANCE MATRIX **

	チシフ	トシヨク	ケイシト	ヒヨウク
チシフ	0.221113E-01			
トシヨク	-0.155075E-01	0.439507E-01		
ケイシト	-0.394104E-02	-0.764627E-02	0.184880E-01	
ヒヨウク	0.104290E-02	-0.988082E-02	-0.310939E-02	0.134516E-01

** CORRELATION MATRIX **

	チシフ	トシヨク	ケイシト	ヒヨウク
チシフ	1.0000			
トシヨク	-0.4975	1.0000		
ケイシト	-0.1949	-0.2682	1.0000	
ヒヨウク	0.0605	-0.4064	-0.1972	1.0000

..... FOR GROUP NO. 3.

** MEAN ** ** S.D ** ** C.V(%) **

チシフ	0.11890E 00	0.14507E 00	122.01
トシヨク	0.22239E 00	0.14306E 00	64.33
ケイシト	0.11466E 00	0.12225E 00	106.62
ヒヨウク	0.34276E-01	0.11405E 00	332.74

** VARIANCE COVARIANCE MATRIX **

	チシフ	トシヨク	ケイシト	ヒヨウク
チシフ	0.210452E-01			
トシヨク	-0.110154E-01	0.204649E-01		
ケイシト	-0.853980E-02	0.531637E-02	0.149443E-01	
ヒヨウク	0.292950E-02	-0.497986E-02	-0.745185E-02	0.130077E-01

** CORRELATION MATRIX **

	チシフ	トシヨク	ケイシト	ヒヨウク
チシフ	1.0000			
トシヨク	-0.5308	1.0000		
ケイシト	-0.4815	0.3040	1.0000	
ヒヨウク	0.1771	-0.3052	-0.5345	1.0000

***** FOR GROUP TOTAL

	** MEAN **	** S.D **	** C.V(%) **
チシツ	-0.45290E-06	0.16485E 00	
トシヨク	-0.29825E-06	0.24206E 00	
カイシト	0.18042E-06	0.14567E 00	
ヒヨクク	-0.11046E-07	0.11803E 00	

** VARIANCE COVARIANCE MATRIX **				
	チシツ	トシヨク	カイシト	ヒヨクク
チシツ	0.271769E-01			
トシヨク	0.199833E-03	0.585921E-01		
カイシト	0.134649E-02	0.778410E-02	0.212196E-01	
ヒヨクク	0.233222E-02	-0.150539E-02	-0.184719E-02	0.139305E-01

** CORRELATION MATRIX **				
	チシツ	トシヨク	カイシト	ヒヨクク
チシツ	1.0000			
トシヨク	0.0050	1.0000		
カイシト	0.0561	0.2208	1.0000	
ヒヨクク	0.1199	-0.0527	-0.1074	1.0000

..... STATISTICS ON SAMPLE SCORE

	GROUP 1.	GROUP 2	GROUP 3
MEAN	-0.44247	0.03444	0.49022
VARIANCE	0.02590	0.01992	0.02198
S.D.	0.16094	0.14113	0.14826

MAX. SCORE (FOR ALL) = 0.89231

MIN. SCORE (FOR ALL) = -0.86829

..... TABLE 6: FREQUENCY DISTRIBUTION

CLASS INTERVAL	GROUP 1	GROUP 2	GROUP 3	TOTAL
LESS -0.868	3	0	0	3
-0.867 -0.771	4	0	0	4
-0.770 -0.674	0	0	0	0
-0.673 -0.577	8	0	0	8
-0.576 -0.480	1	0	0	1
-0.479 -0.383	36	0	0	36
-0.382 -0.286	13	0	0	13
-0.285 -0.189	11	0	0	11
-0.188 -0.092	1	32	0	33
-0.091 0.005	0	15	0	15
0.006 0.102	0	25	0	25
0.103 0.199	0	37	0	37
0.200 0.296	0	8	1	9
0.297 0.393	0	4	22	26
0.394 0.490	0	0	19	19
0.491 0.587	0	0	0	0
0.588 0.684	0	0	14	14
0.685 0.781	0	0	2	2
0.782 0.878	0	0	0	0
0.879 OVER	0	0	3	3
TOTAL	77	121	61	259

..... TABLE 6-1: CLASSIFICATION ON DISTRIBUTION

CLASSIFICATION PROBABILITY = 0.921

FREQUENCY DISTRIBUTION GROUP 1 BETWEEN GROUP 2 DIVIDES -0.2159

FREQUENCY DISTRIBUTION GROUP 2 BETWEEN GROUP 3 DIVIDES 0.2903

図 4. つづき

**** TABLE 7: CLASSIFICATION BY A SAMPLE SCORE

SAMPLE -NO.	ORIGI -NAL	CLASSI -FIED	SAMPLE -NO.	ORIGI -NAL	CLASSI -FIED	SAMPLE -NO.	ORIGI -NAL	CLASSI -FIED	SAMPLE -NO.	ORIGI -NAL	CLASSI -FIED	SAMPLE -NO.	ORIGI -NAL	CLASSI -FIED
1	2	2	2	2	2	3	2	2	4	2	2	5	2	3
6	3	3	7	2	3	8	2	2	9	3	3	10	2	2
11	1	1	12	1	1	13	3	3	14	1	1	15	2	2
16	3	3	17	2	2	18	2	3	19	2	2	20	2	2
21	2	2	22	1	1	23	2	2	24	2	2	25	3	3
26	1	1	27	1	1	28	1	1	29	3	3	30	2	2
31	2	2	32	2	2	33	2	2	34	1	1	35	3	3
36	3	3	37	2	2	38	2	2	39	3	3	40	2	2
41	2	2	42	2	2	43	2	3	44	3	3	45	3	3
46	2	2	47	3	3	48	3	3	49	1	1	50	3	3
51	3	3	52	3	3	53	2	2	54	2	2	55	3	3
56	2	2	57	1	1	58	2	2	59	3	3	60	1	1
51	2	2	62	2	2	63	1	1	64	2	2	65	3	3
56	2	2	67	2	2	68	2	2	69	1	1	70	2	2
71	2	2	72	2	2	73	3	3	74	2	2	75	1	1
76	2	2	77	1	1	78	2	2	79	1	1	80	2	2
81	3	3	82	2	2	83	2	2	84	1	1	85	2	2
86	2	2	87	3	3	88	2	2	89	3	3	90	3	3
91	3	3	92	3	3	93	1	1	94	2	2	95	1	1
96	3	3	97	3	3	98	2	2	99	3	3	100	2	2
101	1	1	102	1	1	103	2	2	104	3	3	105	2	2
106	2	2	107	2	2	108	3	3	109	1	1	110	1	1
111	3	3	112	3	3	113	2	2	114	2	2	115	3	3
116	2	2	117	2	2	118	2	2	119	1	1	120	1	1
121	1	1	122	1	1	123	1	1	124	1	1	125	2	2
126	2	2	127	1	1	128	3	3	129	3	3	130	2	2
131	3	3	132	2	2	133	3	3	134	3	3	135	2	2
136	3	3	137	2	2	138	3	3	139	1	1	140	1	1
141	1	1	142	2	2	143	1	1	144	1	1	145	2	2
146	2	2	147	1	1	148	1	1	149	1	1	150	1	1
151	1	1	152	1	2	153	3	3	154	1	1	155	3	3
156	2	2	157	2	2	158	3	3	159	2	2	160	3	3
151	2	2	162	2	2	163	3	3	164	3	3	165	3	3
156	2	2	167	1	1	168	3	3	169	3	3	170	2	2
171	3	3	172	3	3	173	2	2	174	2	2	175	1	1
176	2	2	177	2	2	178	2	2	179	1	1	180	2	2
181	1	1	182	3	3	183	2	2	184	2	2	185	1	1
186	2	2	187	3	3	188	1	1	189	3	3	190	1	1
191	1	1	192	1	1	193	2	2	194	2	2	195	2	2
196	1	1	197	2	2	198	2	2	199	1	1	200	2	2
201	1	1	202	2	2	203	1	1	204	2	2	205	3	3
206	2	2	207	1	1	208	2	2	209	2	2	210	2	2
211	2	2	212	1	1	213	2	2	214	1	1	215	1	1
216	2	2	217	3	3	218	1	1	219	3	3	220	1	1
221	1	1	222	2	2	223	2	2	224	2	2	225	2	2
226	2	2	227	1	1	228	2	2	229	1	1	230	1	1
231	3	3	232	2	2	233	1	1	234	1	1	235	2	2
236	2	2	237	2	2	238	2	2	239	1	1	240	3	3
241	1	1	242	1	1	243	1	1	244	2	2	245	2	2
246	2	2	247	2	2	248	2	2	249	1	1	250	1	1
251	1	1	252	2	2	253	1	1	254	1	1	255	2	2
256	2	2	257	2	2	258	1	1	259	3	3			

***** TABLE 8: CLASSIFICATION BY VECTOR SCORES

... VECTOR SCORES

ITEM	CATEGORY	SOLUTION 1	SOLUTION 2
チシフ	1	-0.21693	-0.07991
	2	0.00534	0.20418
	3	0.25847	-0.38504
トシヤク	1	-0.29801	-0.32550
	2	0.00023	0.44482
	3	0.30132	-0.14722
ケイシト	1	-0.22379	0.06561
	2	-0.02321	0.09678
	3	0.20271	-0.23431
ヒラキ	1	-0.12956	-0.19407
	2	-0.04629	0.09942
	3	0.12981	0.11828

... MEAN SCORE OF GROUP ON SOLUTION

SOLUTION	GROUP 1	GROUP 2	GROUP 3
1	-0.44247	0.03444	0.49022
2	-0.14513	0.18899	-0.19169

... CLASSIFICATION ON SAMPLE

SAMPLE-NO.	ORIGI-NAL	CLASSI-FIED												
1	2	===> 3	2	2	===> 2	3	2	===> 2	4	2	===> 2	5	2	===> 2
6	3	===> 2	7	2	===> 2	8	2	===> 3	9	3	===> 3	10	2	===> 2
11	1	===> 1	12	1	===> 1	13	3	===> 3	14	1	===> 1	15	2	===> 3
16	3	===> 3	17	2	===> 2	18	2	===> 2	19	2	===> 2	20	2	===> 1
21	2	===> 2	22	1	===> 1	23	2	===> 2	24	2	===> 2	25	3	===> 3
26	1	===> 2	27	1	===> 1	28	1	===> 2	29	3	===> 3	30	2	===> 2
31	2	===> 2	32	2	===> 2	33	2	===> 2	34	1	===> 1	35	3	===> 3
36	3	===> 3	37	2	===> 2	38	2	===> 2	39	3	===> 3	40	2	===> 2
41	2	===> 2	42	2	===> 3	43	2	===> 2	44	3	===> 2	45	3	===> 2
46	2	===> 3	47	3	===> 3	48	3	===> 3	49	1	===> 1	50	3	===> 2
51	3	===> 3	52	3	===> 2	53	2	===> 2	54	2	===> 2	55	3	===> 2
56	2	===> 2	57	1	===> 1	58	2	===> 2	59	3	===> 3	60	1	===> 1
51	2	===> 2	62	2	===> 2	63	1	===> 1	64	2	===> 2	65	3	===> 3
56	2	===> 2	67	2	===> 2	68	2	===> 1	69	1	===> 1	70	2	===> 2
71	2	===> 2	72	2	===> 2	73	3	===> 3	74	2	===> 2	75	1	===> 1

図 4. 3 3 表

76	2 ==>	2	77	1 ==>	1	78	2 ==>	2	79	1 ==>	1	80	2 ==>	2
81	3 ==>	3	82	2 ==>	2	83	2 ==>	2	84	1 ==>	1	85	2 ==>	2
86	2 ==>	2	87	3 ==>	3	88	2 ==>	2	89	3 ==>	3	90	3 ==>	3
91	3 ==>	3	92	3 ==>	3	93	1 ==>	2	94	2 ==>	1	95	1 ==>	2
96	3 ==>	2	97	3 ==>	3	98	2 ==>	3	99	3 ==>	3	100	2 ==>	2
101	1 ==>	1	102	1 ==>	1	103	2 ==>	2	104	3 ==>	2	105	2 ==>	1
106	2 ==>	2	107	2 ==>	1	108	3 ==>	3	109	1 ==>	1	110	1 ==>	1
111	3 ==>	3	112	3 ==>	3	113	2 ==>	2	114	2 ==>	2	115	3 ==>	2
116	2 ==>	2	117	2 ==>	2	118	2 ==>	2	119	1 ==>	1	120	1 ==>	1
121	1 ==>	1	122	1 ==>	1	123	1 ==>	1	124	1 ==>	1	125	2 ==>	1
126	2 ==>	2	127	1 ==>	1	128	3 ==>	3	129	3 ==>	3	130	2 ==>	2
131	3 ==>	2	132	2 ==>	3	133	3 ==>	3	134	3 ==>	2	135	2 ==>	2
136	3 ==>	2	137	2 ==>	2	138	3 ==>	3	139	1 ==>	2	140	1 ==>	1
141	1 ==>	1	142	2 ==>	2	143	1 ==>	1	144	1 ==>	1	145	2 ==>	3
146	2 ==>	2	147	1 ==>	1	148	1 ==>	2	149	1 ==>	1	150	1 ==>	2
151	1 ==>	1	152	1 ==>	1	153	3 ==>	3	154	1 ==>	1	155	3 ==>	3
156	2 ==>	2	157	2 ==>	2	158	3 ==>	3	159	2 ==>	2	160	3 ==>	3
151	2 ==>	2	162	2 ==>	2	163	3 ==>	3	164	3 ==>	3	165	3 ==>	3
156	2 ==>	3	167	1 ==>	1	168	3 ==>	2	169	3 ==>	3	170	2 ==>	2
171	3 ==>	2	172	3 ==>	3	173	2 ==>	2	174	2 ==>	2	175	1 ==>	1
176	2 ==>	2	177	2 ==>	2	178	2 ==>	2	179	1 ==>	1	180	2 ==>	2
181	1 ==>	1	182	3 ==>	3	183	2 ==>	3	184	2 ==>	3	185	1 ==>	1
186	2 ==>	2	187	3 ==>	2	188	1 ==>	1	189	3 ==>	3	190	1 ==>	1
191	1 ==>	2	192	1 ==>	1	193	2 ==>	2	194	2 ==>	2	195	2 ==>	2
196	1 ==>	1	197	2 ==>	2	198	2 ==>	2	199	1 ==>	2	200	2 ==>	2
201	1 ==>	1	202	2 ==>	2	203	1 ==>	1	204	2 ==>	2	205	3 ==>	3
206	2 ==>	2	207	1 ==>	1	208	2 ==>	2	209	2 ==>	2	210	2 ==>	2
211	2 ==>	2	212	1 ==>	1	213	2 ==>	3	214	1 ==>	1	215	1 ==>	2
216	2 ==>	1	217	3 ==>	3	218	1 ==>	1	219	3 ==>	3	220	1 ==>	1
221	1 ==>	1	222	2 ==>	2	223	2 ==>	2	224	2 ==>	1	225	2 ==>	2
226	2 ==>	2	227	1 ==>	1	228	2 ==>	2	229	1 ==>	2	230	1 ==>	1
231	3 ==>	3	232	2 ==>	2	233	1 ==>	1	234	1 ==>	2	235	2 ==>	2
236	2 ==>	3	237	2 ==>	2	238	2 ==>	2	239	1 ==>	1	240	3 ==>	3
241	1 ==>	1	242	1 ==>	1	243	1 ==>	1	244	2 ==>	2	245	2 ==>	2
246	2 ==>	1	247	2 ==>	2	248	2 ==>	1	249	1 ==>	1	250	1 ==>	1
251	1 ==>	2	252	2 ==>	2	253	1 ==>	1	254	1 ==>	2	255	2 ==>	2
256	2 ==>	2	257	2 ==>	2	258	1 ==>	1	259	3 ==>	3			

... CLASSIFICATION PROBABILITY = .0.799

7. プログラムとその構造

このプログラムは 11 個のサブルーチン副プログラムを結合したもので構成されている (図 6)。このようにサブルーチン化した理由は使用計算機の主記憶容量の制限のためである。すなわち、数量化 II 型について、2. で解説した一連の結果を得るためには、約 45,000 語の主記憶容量を必要とするが、これに満たない主記憶容量の計算機にもこのプログラムが使えるようにするためである。したがって、主記憶容量が 45,000 語に満たない計算機でこのプログラムを実行するには、図 5 のようにオーバレイ構造をとらせて実行すればよいし、主記憶容量が 45,000 語以上の計算機が使えるときにはこれらのサブルーチン副プログラムを直列にした単一構造で実行してよい。

主プログラムは必要なサブルーチン副プログラムの呼び出しのみを行い、計算はすべてサブルーチン副プログラムで行う。

各サブルーチン副プログラムの処理内容を下記に概説する。ここで [] 内はサブルーチン名である。

[INPUT]

これはデータを読み込み、計算に必要な各種パラメタをセットし、それらの結果を ***** TABLE 1 として印刷させる。ここで読み込むカードの種類とその順は、① PROBLEM カード、② CONTROL カード、③ CATEGORY 指定カード、④ NAME カード、⑤ 可変 FORMAT カード、⑥ 標本データカードである。このうち、④ と ⑤ は ② のカードにその使用が指定されていないときは省略される。⑥ のカードを読み込むとき、そのカテゴリ番号が ③ で指定された通りであるか否かのチェックを行う。このチェックで誤記あるいはパンチミスが検出されたときは、そのデータに ERROR と表示する。この ERROR の表示が 1 つでもあったときは、このサブルーチン副プログラムから主プログラムに復帰したとき、以下の各サブルーチン副プログラムの実行を無視して、次の組のデータ読み込みに進む。⑥ のデータが正しく読み込まれたときそれらは 12 標本ずつを 1 論理レコードとして、論理名 MDATA の作業用ファイルに書き込まれる。主プログラムに復帰したときは、次のサブルーチン副プログラムの実行へと進む。

[SELECT]

これは、計算にとり入れる項目と外的基準の組合せを作り、それに応ずるクロス表 (***** TABLE 2)

() 内は使用語数である。MAINにはサブルーチン副プログラムとの共通領域と基本外部関数を含んでいる。

図 5. プログラムのオーバレイ構造

の印刷をさせる。項目と外的基準の組合せは、[INPUT] で読み込まれた ② のカードで SELECT カードが指定されていれば、ここでそのカードを読み込み、その内容に従った組合せを作る。SELECT カードの使用が指定されていないときは、[INPUT] での ⑥ のカードで読み込まれた項目順がそのまま計算にとり入れられる項目となる。このとき、一番最後の項目が外的基準となる。クロス表を作るとき [INPUT] で作成した作業用ファイル MDATA を使用する。

[MATRIX]

ここでは、クロス表から式 (16) または式 (18) の行列を作る。入出力の作業はない。

[SOLVE]

ここでは式 (16) または式 (18) の数値解を求める。すなわち、外的基準が 3 分類以上のときは式 (16) の数値解のためのサブルーチン副プログラム [EIGAB] を呼び出し、そこで数値計算される。[EIGAB] はさらに固有値・固有ベクトルをヤコビ法で求めるためのサブルーチン副プログラム [JACOBI] を呼び出し、ヤコビ法による数値解を求める。外的基準が 2 分類のときは、式 (18) の数値解のためのサブルーチン副プログラム [EQU] を呼び出し、そこで式 (18) の数値解を消去法で計算する。

[OUTX]

これは [SOLVE] の結果を受けとり、***** TABLE 3 を作成する。

[STATX]

ここでは ***** TABLE 4 を作成する。

[ESTM]

ここでは ***** TABLE 5 を作成する。このとき、標本スコアを作成するために [INPUT] で作られた作業用ファイル MDATA を使用し、作られた標本スコアは 12 サンプルを 1 論理レコードにして論理名 MTESTM の作業用ファイルに書き出す。

[FREQ]

ここでは ***** TABLE 6 を作成する。そのとき、作業用ファイル MTESTM を使用する。

[PROB]

ここでは ***** TABLE 6-1 を作成する。そのとき、付録 4 の式 ①, ②, ③ の積分計算のためのサブルーチン副プログラム [NQ] を呼び出し、積分計算を実行させる。

[CLASS]

ここでは ***** TABLE 7 を作成する。そのとき、作業用ファイル MTESTM を使用する。

[CLASSN]

ここでは ***** TABLE 8 を作成する。そのとき、作業用ファイル MTESTM を使用する。

8. 入出力機器に関する注意

このプログラムを実行するには、つぎの周辺機器を必要とする。

- 1) 論理名 IPT で使えるカード読取装置、紙テープ読取装置もしくは磁器テープ読取装置。
- 2) 論理名 6 で使用できる印刷装置。特に 1 行の印字幅は 132 桁以上なければならないし、カナ文字を含んでいなければならない。
- 3) 論理名 MDATA, MTESTM で使える補助入出力装置。MDATA は 1 論理レコード長は 240 語

(480 Byte) で最大レコード数は標本データ数 N に対して $\lfloor N/12 \rfloor + 1$ が必要である。また MTESTM は 1 論理レコードが 252 語 (504 Byte) で最大レコード数は $\lfloor N/12 \rfloor + 1$ である。

9. 制限事項と注意

9.1 制限事項

- 1) $2 \leq \text{項目数} \leq 20$
- 2) 計算に入るときの項目のカテゴリの合計 ≤ 40
- 3) 外的基準のグループ数 ≤ 10
- 4) 標本データ数 ≤ 32767

9.2 注意

プログラムの実行過程で、つぎのメッセージが印刷されると、それ以降の計算を中止し、新しいデータまたはセレクトカードの読み込みに進む。

- 1) ***** TABLE 1 の印刷段階で ERROR の表示があるとき、このときは標本データのカテゴリ番号がカテゴリ指定カードのものと一致しないので、両方のチェックが必要である。
- 2) ??? PARAMETER SET ERROR が表示されたときは、カードの種類のうち②の CONTROL カードに与えたパラメタが正しく与えられていない。
- 3) THIS SELECT CARD MISSING ERROR が表示されたときは、カードの種類 SELECT カードが正しく書かれていない。
- 4) TOTAL CATEGORY OVER LIMIT (=40) ERROR が表示されたときは、計算に入る項目のカテゴリの合計が 41 以上になっている。
- 5) ??? MATRIX CROSS IS SINGULAR ERROR が表示されたときは、式 (16) の数値解法の解に F 行列が正値行列でない。このときは解が求められない。(付録 (3) 参照)
- 6) CLASSIFICATION PROBABILITY CAN NOT FIND が表示されたときは、適中率の計算ができない。これが表示されたあとに (BECAUSE THE DIVIDING POINT ON DISTRIBUTION ** BETWEEN ** NOT FIND) が表示されたときは、** と ** のグループ間の分割点が存否しない場合であり、(BECAUSE THE DIVIDING POINT ON DISTRIBUTIONS ARE NOT ASCENDING) が表示されたら、分割点は求められるが、それらが分布の平均値間に入っていないときである。

付 録 (1)

式 (9) の解が式 (10) になることはつぎのように証明される。

$$\frac{\partial \sigma^2}{\partial x_{jk}} = \frac{\partial}{\partial x_{jk}} \left\{ \sum_{i=1}^N (\alpha_i - \bar{\alpha})^2 / N \right\} = \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N (\alpha_i - \bar{\alpha}) \left(\frac{\partial \alpha_i}{\partial x_{jk}} - \frac{\partial \bar{\alpha}}{\partial x_{jk}} \right) \quad \text{①}$$

右辺の微分はつぎのようになる。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \alpha_i}{\partial x_{jk}} &= \frac{\partial}{\partial x_{jk}} \left\{ \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^{K_j} \delta_i(jk) x_{jk} \right\} = \delta_i(jk) \\ \frac{\partial \bar{\alpha}}{\partial x_{jk}} &= \frac{\partial}{\partial x_{jk}} \left\{ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \alpha_i \right\} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\partial \alpha_i}{\partial x_{jk}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_i(jk) \end{aligned}$$

これらを式 ① へ代入し、 $\sum_{i=1}^N \delta_i(jk) = n_{jk}$ を用いれば、

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma^2}{\partial x_{jk}} &= \frac{2}{N} \left\{ \sum_{i=1}^N \delta_i(jk) \alpha_i - \frac{n_{jk}}{N} \sum_{i=1}^N \alpha_i - \bar{\alpha} n_{jk} + \bar{\alpha} n_{jk}/N \right\} \\ &= \frac{2}{N} \left\{ \sum_{i=1}^N \delta_i(jk) \alpha_i - \bar{\alpha} n_{jk} \right\} \end{aligned}$$

式 (2) と式 (4) を uv の添字で書き直し、さらに式 (12) を用いれば

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma^2}{\partial x_{jk}} &= \frac{2}{N} \left\{ \sum_{i=1}^N \sum_{u=1}^M \sum_{v=1}^{K_u} \delta_i(jk) \delta_i(uv) x_{uv} - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{u=1}^M \sum_{v=1}^{K_u} \delta_i(uv) x_{uv} n_{jk} \right\} \\ &= \frac{2}{N} \sum_{u=1}^M \sum_{v=1}^{K_u} \left\{ f_{uv}(jk) - \frac{1}{N} n_{jk} n_{uv} \right\} x_{uv} \quad \textcircled{2} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial \sigma^2}{\partial x_{jk}} = \frac{\partial}{\partial x_{jk}} \left\{ \frac{1}{N} \sum_{t=1}^T (\bar{\alpha}_t - \bar{\alpha})^2 n_t \right\} = \frac{2}{N} \sum_{t=1}^T n_t (\bar{\alpha}_t - \bar{\alpha}) \left(\frac{\partial \bar{\alpha}_t}{\partial x_{jk}} - \frac{\partial \bar{\alpha}}{\partial x_{jk}} \right) \quad \textcircled{3}$$

右辺の微分はそれぞれつぎのようになる。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{\alpha}}{\partial x_{jk}} &= n_{jk}/N \\ \frac{\partial \bar{\alpha}_t}{\partial x_{jk}} &= \frac{1}{n_t} \sum_{i(t)=1}^{n_t} \frac{\partial \alpha_{i(t)}}{\partial x_{jk}} = \frac{1}{n_t} \sum_{i(t)=1}^{n_t} \delta_{i(t)}(jk) \quad \textcircled{4} \end{aligned}$$

これらを③へ代入し、式 (6)、(7) を考慮すると

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma^2}{\partial x_{jk}} &= \frac{2}{N} \left\{ \sum_{t=1}^T \left(\sum_{i(t)=1}^{n_t} \alpha_{i(t)} \right) \left(\frac{1}{n_t} \sum_{i(t)=1}^{n_t} \delta_{i(t)}(jk) \right) - \bar{\alpha} \sum_{t=1}^T \sum_{i(t)=1}^{n_t} \delta_{i(t)}(jk) \right. \\ &\quad \left. - \frac{n_{jk}}{N} \sum_{t=1}^T n_t \bar{\alpha}_t + \bar{\alpha} \frac{n_{jk}}{N} \sum_{t=1}^T n_t \right\} \\ &= \frac{2}{N} \left\{ \sum_{t=1}^T \sum_{i(t)=1}^{n_t} \alpha_{i(t)} \frac{n^t(jk)}{n_t} - \frac{n_{jk}}{N} \sum_{t=1}^T \sum_{i(t)=1}^{n_t} \alpha_{i(t)} \right\} \\ &= \frac{2}{N} \left\{ \sum_{t=1}^T \sum_{i(t)=1}^{n_t} \sum_{u=1}^M \sum_{v=1}^{K_u} \delta_{i(t)}(uv) x_{uv} \frac{n^t(jk)}{n_t} - \frac{1}{N} n_{jk} \sum_{i=1}^N \alpha_i \right\} \\ &= \frac{2}{N} \left\{ \sum_{u=1}^M \sum_{v=1}^{K_u} \sum_{t=1}^T \frac{n^t(uv) n^t(jk)}{n_t} x_{uv} - \frac{n_{jk}}{N} \sum_{u=1}^M \sum_{v=1}^{K_u} \sum_{i=1}^N \delta_i(uv) x_{uv} \right\} \\ &= \frac{2}{N} \sum_{u=1}^M \sum_{v=1}^{K_u} \left\{ \sum_{t=1}^T \frac{n^t(uv) n^t(jk)}{n_t} - \frac{1}{N} n_{jk} n_{uv} \right\} x_{uv} \quad \textcircled{5} \end{aligned}$$

②と⑤より式 (10) が導ける。

付 録 (2)

式 (17) の解が式 (18) になることはつぎのように証明される。

$\eta^2 = (\bar{\alpha}_1 - \bar{\alpha}_2)^2 / \sigma^2$ を最大にするには、 $\frac{\partial \eta^2}{\partial x_{jk}} = 0$ を解けばよい。すなわち

$$\frac{\partial \eta^2}{\partial x_{jk}} = \frac{1}{(\sigma^2)^2} \left\{ \left(\frac{\partial (\bar{\alpha}_1 - \bar{\alpha}_2)^2}{\partial x_{jk}} \right) \sigma^2 - (\bar{\alpha}_1 - \bar{\alpha}_2)^2 \frac{\partial \sigma^2}{\partial x_{jk}} \right\} = 0$$

これより

$$\frac{\partial \sigma^2}{\partial x_{jk}} = \frac{\sigma^2}{(\bar{\alpha}_1 - \bar{\alpha}_2)^2} \frac{\partial}{\partial x_{jk}} \left\{ (\bar{\alpha}_1 - \bar{\alpha}_2)^2 \right\} = \frac{2\sigma^2}{(\bar{\alpha}_1 - \bar{\alpha}_2)} \left(\frac{\partial \bar{\alpha}_1}{\partial x_{jk}} - \frac{\partial \bar{\alpha}_2}{\partial x_{jk}} \right)$$

右辺の微分は前項の式④より

$$\frac{\partial \bar{\alpha}_1}{\partial x_{jk}} = \sum_{i(1)=1}^{n_1} \delta_{i(1)}(jk) / n_1 = n^{(1)}(jk) / n_1, \quad \frac{\partial \bar{\alpha}_2}{\partial x_{jk}} = n^{(2)}(jk) / n_2$$

であるから

$$\frac{\partial \sigma^2}{\partial x_{jk}} = \frac{2\sigma^2}{(\bar{\alpha}_1 - \bar{\alpha}_2)} \left\{ \frac{n^{(1)}(jk)}{n_1} - \frac{n^{(2)}(jk)}{n_2} \right\}$$

この左辺は、前項の式 ② であるから

$$\sum_{u=1}^M \sum_{v=1}^{K_u} \left\{ f_{uv}(jk) - \frac{n_{uv}n_{jk}}{N} \right\} x_{uv} = \frac{\sum_{i=1}^N (\alpha_i - \bar{\alpha})^2}{(\bar{\alpha}_1 - \bar{\alpha}_2)} \left\{ \frac{n^{(1)}(jk)}{n_1} - \frac{n^{(2)}(jk)}{n_2} \right\}$$

jk を項目・カテゴリにわたって動かせば、上式はカテゴリ総数 $\left(\sum_{j=1}^M k_j \right)$ 元の連立 1 次方程式となる。

右辺に現れる $\sum_{i=1}^N (\alpha_i - \bar{\alpha})^2 / (\bar{\alpha}_1 - \bar{\alpha}_2)$ の値は η^2 を最大にするという問題に関する限り任意である。なんとすれば、左辺に定数 C を乗ずるとすべての x_{jk} の値は増加したりまたは減少したりするが、相互の関係は変わらないからである。そこで、これを 1 に等しくとり、式 (14) を用いると式 (18) を得る。

付 録 (3)

式 (16) の数値解法はつぎのように行った。

式 (16) をみたく固有値 (η^2) と固有ベクトル $\mathbf{X}$ を求めることは「一般の固有値問題」という。 $\mathbf{F}$ に逆行列 $\mathbf{F}^{-1}$ があれば、式 (16) の左から $\mathbf{F}^{-1}$ を乗じて

$$(\mathbf{F}^{-1}\mathbf{H})\mathbf{X} = \eta^2\mathbf{X} \tag{1}$$

となるから、式 (16) は行列 $(\mathbf{F}^{-1}\mathbf{H})$ の固有値問題に帰着される。しかし、 $\mathbf{H}$ も $\mathbf{F}$ もともに実対称行列であるが、 $(\mathbf{F}^{-1}\mathbf{H})$ 行列は必ずしも対称でなくなるため、式 ① の数値解法に安定した手法がない。

固有値問題の数値解法として最も安定している JACOBI 法を用いるために、 $\mathbf{H}$ と $\mathbf{F}$ が対称で、かつ $\mathbf{F}$ が正値行列であればよい。このとき、式 (16) はつぎのように解ける⁵⁾。

(i) 対称行列 $\mathbf{F}$ の固有値問題

$$\mathbf{F}\mathbf{V} = \mu\mathbf{V}$$

を JACOBI 法で解く。このときの固有値 μ_i がすべて正つまり $\mu_i > 0$ ($i=1, 2, \dots, l$) であれば $\mathbf{F}$ は正値行列である。ここに l は行列 $\mathbf{F}$ の次数で、カテゴリ総数に等しい。

$\mathbf{F}$ が正値行列であることが確かめられたら、直交変換して対角化された行列 $\mathbf{V}'\mathbf{F}\mathbf{V} = \mathbf{M}$ を作る。

(ii) $\mathbf{M}^{-\frac{1}{2}}$ を作る。これは $\mathbf{M} = [\mu_{ij}\delta_{ij}]$ とすれば

$$\mathbf{M}^{-\frac{1}{2}} = [\mu_{ij}^{-\frac{1}{2}}\delta_{ij}]$$

で求められる。ここに δ_{ij} は $i=j$ で 1, $i \neq j$ で 0 をとる。

(iii) 行列 $(\mathbf{V}\mathbf{M}^{-\frac{1}{2}})$ および $\mathbf{C} = (\mathbf{V}\mathbf{M}^{-\frac{1}{2}})' \mathbf{H} (\mathbf{V}\mathbf{M}^{-\frac{1}{2}})$ を計算する。 $\mathbf{C}$ は対称行列であるから、 $\mathbf{C}$ の固有値問題 $\mathbf{C}\mathbf{W} = \nu\mathbf{W}$ を JACOBI 法で解き、直交変換により対角化された行列 $\mathbf{W}'\mathbf{C}\mathbf{W} = \mathbf{S}$ を求める。同時に、 $\mathbf{V}\mathbf{M}^{-\frac{1}{2}}\mathbf{W}$ も計算する。

以上の結果、式 (16) の固有値の行列は $\mathbf{S}$ に等しく、固有ベクトル行列 $\mathbf{X}$ は

$$\mathbf{X} = \mathbf{V}\mathbf{M}^{-\frac{1}{2}}\mathbf{W}$$

で与えられる。

なお、JACOBI 法による固有値問題の数値解法のアルゴリズムは JOHN GREENSTADT²⁾ によるものを採用した。

付 録 (4)

適中率を求める式 (26) の計算にはつぎの 3 つの積分値を計算しなければならない。

$$\int_{-\infty}^{x_1^*} f_1(\alpha) d\alpha \quad \text{①}$$

$$\int_{x_{t-1}^*}^{x_t^*} f_t(\alpha) d\alpha \quad (t=2, 3, \dots, T-1) \quad \text{②}$$

$$\int_{x_{T-1}^*}^{\infty} f_T(\alpha) d\alpha \quad \text{③}$$

これらの被積分関数は規準正規分布の密度関数であるから、これらの 3 つの積分は正規分布の上側確率を求めることに他ならない。これを計算する手法は一通りではないが、ここでは引用文献 6) にあるプログラムを若干変更して使用してある。このプログラムは SUBROUTINE NQ (U, Q) として組み入れている。このサブルーチンは規準化変数 U を与えると、正規分布の上側確率を Q に与えるものであるから、① の積分は x_1^* の規準化した値を U に与えれば $1-Q$ として求められる。同時に② の積分は x_{t-1}^* を用いた上側確率 Q_{t-1} から x_t^* を用いた上側確率 Q_t を差し引いて求め、③ の積分は x_{T-1}^* を用いた上側確率そのものである。従ってこれらを加えたものが適中率になる。

引 用 文 献

- 1) 林 知己夫・樋口伊佐夫・駒沢 勉：情報処理と統計数理，産業図書 (1970)
- 2) JOHN GREENSTADT: The determination of the characteristic roots of a matrix by the Jacobi method. Edited by A. RALSTON and H. S. WILF; Mathematical methods for digital Computers (1965)
- 3) 川端幸蔵：林業試験場電算機プログラミング報告 (5)一数量化 (I 型)一，林試研報，288, (1977)
- 4) 小島忠三郎：数量化 II 一外的基準が分類で与えられている場合一，農林研究計算センター報告 A 第 10 号，農林水産技術会議事務局，(1974)
- 5) 山内二郎・森口繁一・一松 信：電子計算機のための数値計算法 I，培風館，(1965)
- 6) 山内二郎編：統計数値表 JAS-1972，日本規格協会，(1972)

Report on Computer Programming (11)

—Quantification (Type II)—

(Research note)

KOZO KAWABATA⁽¹⁾

Summary

This report describes a program documentation for the Quantification of type II. The theory of Quantification of type II, that observed characters Y in nominal scale are classified with other M categorized items has been developed by Dr. Chikio HAYASHI.

Data in the Quantification of type II are observed in Table 1 form. We have to rewrite them as Table 1 in the data sheets shown in Figure 1 to get the necessary solutions.

In applied example, data are used for evaluation of the function of water resources potential in the Agano river basin. Geology, soil, slope and altitude are used as the items; each of them are classified into three-type of categories. At 259 sampling points, every item and category are observed and the functions of water resources where evaluated. An example, response pattern is shown in Table 3. Data in Table 3 are arranged in a data sheet form as Figure 3, calculation results of them are shown as Figure 4.

This program is written in FORTRAN IV and carried out with combinations of 11 sub-routine subprogram. Necessary total memories are 45,000 words, but overlay techniques should be taken as Figure 5, when this program is processed on a smaller scale computer system.

In this program, data must be used under 40 in total of numbers of category and group.

Received December 19, 1978

(1) Forest Management Division

☒ 6.

```

OKITAC 4500  FORTRAN  SOURCE PROGRAM LIST                PAGE 0001

LINE NO.      STATEMENT

0001          C      MAIN PROGRAM                                ** MAIN
0002          C ..... MAIN0000
0003          C ***** Q U A N T I F I C A T I O N (TYPE 2)  CODED BY K.KAWABATA*****
0004          C ... I/O WORKING FILE NAMES AND ITS REQUIRES SECTOR. MAIN0010
0005          C      MDATA( FOR INPUT DATA ) REQUIRES (N DATA)/12 SECTORS. MAIN0020
0006          C      MTESTM(FOR ESTIMATED Y) NEEDS (N DATA)/NBUFF(=12) SECTORS. MAIN0030
0007          C      COMMON INITEM, ITEM, ITEMX, NDATA, FNDATA, NCATG, NCATGX, NSELS COMMON00
0008          C      1      ,NGROUP, NSOL, NHF, NBUFF, XNAME(20), SELNAM(20) COMMON01
0009          C      2      ,INCATG(20), JCATG(20), ISEL(20), ISTART(21), LOSI(20) COMMON02
0010          C      3      ,CROSSI(40), CROSS(40,40), H(40,40), V(40,40), NGJK(40,10) COMMON03
0011          C      DOUBLE PRECISION XNAME, SELNAM MAIN0040
0012          C *****-----MAIN0050
0013          C      1      CALL INPUT( $999 ) MAIN0060
0014          C      10     CALL SELECT( $20 ) MAIN0070
0015          C      CALL MATRIX MAIN0080
0016          C      CALL SOLVE( $20 ) MAIN0090
0017          C      CALL OUTX MAIN0100
0018          C      CALL STATX MAIN0110
0019          C      CALL ESTMX MAIN0120
0020          C      CALL FREQ MAIN0130
0021          C      CALL PROB MAIN0140
0022          C      CALL CLASS MAIN0150
0023          C      CALL CLASSN MAIN0160
0024          C      20 IF(NSELS .GT. 0) GO TO 10 MAIN0170
0025          C      GO TO 1 MAIN0180
0026          C      999 STOP MAIN0190
0027          C      END MAIN0200

```

```

LINE NO.      STATEMENT
0001          SUBROUTINE INPUT ( * )
0002          C ..... ** INPUT
0003          COMMON INITEM, ITEM, ITEMX, NDATA, FNDATA, NCATG, NCATGX, NSELS INPU0000
0004          1 ,NGROUP, NSQL, NHF, NBUFF, XNAME(20), SELNAM(20) COMMON01
0005          2 ,INCATG(20), JCATG(20), ISEL(20), ISTART(21), LOSI(20) COMMON02
0006          3 ,CROSSII(40), CROSS(40,40), H(40,40), V(40,40), NGJK(40,10) COMMON03
0007          DOUBLE PRECISION XNAME, SELNAM, PROBLM, PNAME, HEND, BLANK8 INPU0010
0008          1 ,HPROB, DEFNAM, CRNAME, ERROR, HERROR INPU0020
0009          DIMENSION TITLE(15), PARAM(7), JPARAM(7), HPARAM(5), KEEP(5) INPU0030
0010          1 ,NAMENO(7), FMT(18), FMTDEF(3), IX(12,20) INPU0040
0011          2 ,DEFNAM(20), CRNAME(7), ERROR(12) INPU0050
0012          DATA HEND/3HEND/, BLANK8/1H /, HPARAM/4HITEM,4HDATA,4HNAME,4HFMT INPU0060
0013          1 ,4HSEL /, FMTDEF/4H(10X, 4H,20I, 4H2) /, HPROB/7HPROBLEM/ INPU0070
0014          2 ,DEFNAM/8H ITEM 1,8H ITEM 2,8H ITEM 3,8H ITEM 4,8H ITEM 5INPU0080
0015          3,8H ITEM 6,8H ITEM 7,8H ITEM 8,8H ITEM 9,8H ITEM 10,8H ITEM 11INPU0090
0016          4,8H ITEM 12,8H ITEM 13,8H ITEM 14,8H ITEM 15,8H ITEM 16,8H ITEM 17INPU0100
0017          5,8H ITEM 18,8H ITEM 19,8H ITEM 20/, HERROR/5HERROR/ INPU0110
0018          C *****-----INPU0120
0019          1 READ(IPT,500) PROBLM, PNAME, TITLE INPU0130
0020          IF(PROBLM .EQ. HEND .OR. PROBLM .EQ. BLANK8) RETURN 1 INPU0140
0021          2 READ(IPT,502) (PARAM(J),JPARAM(J),J=1, 7) INPU0150
0022          DO 10 I=1, 5 INPU0160
0023          DO 12 J=1, 7 INPU0170
0024          IF(PARAM(J) .EQ. HPARAM(I)) GO TO 14 INPU0180
0025          12 CONTINUE INPU0190
0026          KEEP(I)=0 INPU0200
0027          GO TO 10 INPU0210
0028          14 KEEP(I)=JPARAM(J) INPU0220
0029          10 CONTINUE INPU0230
0030          INITEM=KEEP(1) INPU0240
0031          NDATA=KEEP(2) INPU0250
0032          NSELS=KEEP(5) INPU0260
0033          IF(INITEM.LE.0 .OR. NDATA .LE. 0) GO TO 900 INPU0270
0034          READ(IPT,504) (INCATG(J),J=1, INITEM) INPU0280
0035          WRITE(6,600) TITLE, NDATA, INITEM, (INCATG(J),J=1, INITEM) INPU0290
0036          DO 20 I=1, 20 INPU0300
0037          XNAME(I)=DEFNAM(I) INPU0310
0038          20 SELNAM(I)=DEFNAM(I) INPU0320
0039          IF(KEEP(3) .EQ. 0) GO TO 26 INPU0330
0040          NAMECR=KEEP(3) INPU0340
0041          DO 22 I=1, NAMECR INPU0350
0042          READ(IPT,506) (NAMENO(J),CRNAME(J),J=1,7) INPU0360
0043          DO 22 J=1, 7 INPU0370
0044          NOJ=NAMENO(J) INPU0380
0045          IF(NOJ .LE. 0 .OR. NOJ .GT. 20) GO TO 22 INPU0390
0046          XNAME(NOJ)=CRNAME(J) INPU0400
0047          22 CONTINUE INPU0410
0048          WRITE(6,602) (XNAME(J),J=1, INITEM) INPU0420
0049          26 FMT(1)=FMTDEF(1) INPU0430
0050          FMT(2)=FMTDEF(2) INPU0440

```

図6. つづき

```

                                OKITAC 4500  FORTRAN  SOURCE PROGRAM LIST                                PAGE 0003
LINE NO.      STATEMENT
0051          FMT(3)=FMTDEF(3)                                INPU0450
0052          DO 28 I=4,18                                    INPU0460
0053          28 FMT(I)=BLANK4                                  INPU0470
0054          IF(KEEP(4) .LE. 0)                               GO TO 30          INPU0480
0055          READ(IPT,508) FMT                                INPU0490
0056          WRITE(6,604) FMT                                  INPU0500
0057          30 IF(INITEM .GT. 15) WRITE(6,610)              INPU0510
0058          IF(INITEM .LE. 15) WRITE(6,611)                 INPU0520
0059          C ----- SAMPLE CARD READ IN.                  INPU0530
0060          REWIND MDATA                                       INPU0540
0061          NERROR=0                                           INPU0550
0062          NCR=0                                               INPU0560
0063          NBUFF=12                                           INPU0570
0064          DO 32 I=1, NDATA                                    INPU0580
0065          NCR=NCR+1                                           INPU0590
0066          READ(IPT,FMT) ((IX(NCR,J),J=1, INITEM)          INPU0600
0067          IERROR=0                                           INPU0610
0068          ERROR(NCR)=BLANK8                                    INPU0620
0069          DO 34 J=1, INITEM                                    INPU0630
0070          IF(IX(NCR,J).LE.0 .OR. IX(NCR,J).GT.INCATG(J)) IERROR=1 INPU0640
0071          34 CONTINUE                                         INPU0650
0072          IF(IERROR .EQ. 0)                                   GO TO 35          INPU0660
0073          ERROR(NCR)=HERROR                                    INPU0670
0074          NERROR=-1                                           INPU0680
0075          35 IF(INITEM .GT. 15)                               GO TO 36          INPU0690
0076          IF(MOD(I,2).EQ.1) WRITE(6,631) I,ERROR(NCR),(IX(NCR,J),J=1,INITEM) INPU0700
0077          IF(MOD(I,2).EQ.0) WRITE(6,632) I,ERROR(NCR),(IX(NCR,J),J=1,INITEM) INPU0710
0078          GO TO 37                                           INPU0720
0079          36 WRITE(6,630) I,ERROR(NCR),(IX(NCR,J),J=1, INITEM) INPU0730
0080          37 IF(NCR .LT. NBUFF)                               GO TO 32          INPU0740
0081          WRITE(MDATA) ((IX(K,J),J=1,20),K=1,NBUFF)        INPU0750
0082          NCR=0                                               INPU0760
0083          32 CONTINUE                                         INPU0770
0084          IF(NCR .GT. 0) WRITE(MDATA) ((IX(K,J),J=1,20),K=1,NBUFF) INPU0780
0085          END FILE MDATA                                       INPU0790
0086          IF(NERROR .LT. 0)                                   GO TO 902         INPU0800
0087          RETURN                                             INPU0810
0088          900 WRITE(6,690)                                    INPU0820
0089          902 READ(IPT,500) PROBLM, PNAME, TITLE            INPU0830
0090          IF(PROBLM .EQ. HEND) RETURN 1                      INPU0840
0091          IF(PROBLM .EQ. HPROB)                               GO TO 2           INPU0850
0092          GO TO 902                                           INPU0860
0093          500 FORMAT(A7,3X,A5,5X,15A4)                       INPU0870
0094          502 FORMAT(10X,7(A4,2X,I4))                        INPU0880
0095          504 FORMAT(10X,20I2)                               INPU0890
0096          506 FORMAT(10X,7(12,A8))                          INPU0900
0097          508 FORMAT(10X,17A4,A2)                            INPU0910
0098          600 FORMAT(1H1,30X,38H***** QUANTIFICATION (TYPE 2) *****////// INPU0920
0099          1          32H ***** TABLE 1; INPUT MONITOR//20X, 9HDATA NAME,14X INPU0930
0100          2          ,15A4//20X, 7HSAMPLES,13X,I4//20X, 5HITEMS,15X, 14//20X INPU0940

```

LINE NO.	STATEMENT	
0101	3 ,16HCATEGORY IN ITEM, 4X,20(I4,1H,)	INPU0950
0102	602 FORMAT(/20X,12HNAME OF ITEM,11X,7(A8,1H,,3X)/(43X,7(A8,1H,,3X)))	INPU0960
0103	604 FORMAT(/20X,24HUSED VARIABLE FORMAT IS ,17A4,A2)	INPU0970
0104	610 FORMAT(///22X,3HNO.,13X,17HITEM CATEGORY NO.//)	INPU0980
0105	611 FORMAT(/// 7X,3HNO.,10X,17HITEM CATEGORY NO.,37X,3HNO.,10X	INPU0990
0106	1 ,17HITEM CATEGORY NO./)	INPU1000
0107	630 FORMAT(21X,I4,3X, A5,3X,20I3)	INPU1010
0108	631 FORMAT(1H , 5X,I4,3X,A5,2X,I5I3)	INPU1020
0109	632 FORMAT(1H*,72X,I4,3X,A5,2X,I5I3)	INPU1030
0110	690 FORMAT(///25H ??? PARAMETER SET ERROR)	INPU1040
0111	END	INPU1050

図6. つづき

OKITAC 4500 FORTRAN SOURCE PROGRAM LIST

PAGE 0005

LINE NO.	STATEMENT	
0001	SUBROUTINE SELECT(*)	**SELECT
0002	C	SELE0000
0003	COMMON INITEM, ITEM, ITEMX, NDATA, FNDDATA, NCATG, NCATGX, NSELS	COMMON00
0004	1 ,NGROUP, NSQL, NHF, NBUFF, XNAME(20), SELNAM(20)	COMMON01
0005	2 ,INCATG(20), JCATG(20), ISEL(20), ISTART(21), LOSI(20)	COMMON02
0006	3 ,CROSSI(40), CROSS(40,40), H(40,40), V(40,40), NGJK(40,10)	COMMON03
0007	DOUBLE PRECISION XNAME, SELNAM, SELCRB, SPEL	SELE0010
0008	DIMENSION IX(12,20), LPCROS(40)	SELE0020
0009	DATA SPEL/5HGROUP/	SELE0030
0010	C *****-----	SELE0040
0011	ITEM=INITEM	SELE0050
0012	ITEMX=ITEM-1	SELE0060
0013	DO 10 I=1, ITEM	SELE0070
0014	10 ISEL(I)=I	SELE0080
0015	IF(NSELS .LE. 0) GO TO 25	SELE0090
0016	READ(IPT,500) SELCRB,SELCR2, ISEL	SELE0100
0017	WRITE(6,600) SELCRB,SELCR2	SELE0110
0018	ITEM=0	SELE0120
0019	DO 20 I=1, 20	SELE0130
0020	IF(ISEL(I) .LE. 0 .OR. ISEL(I) .GT. INITEM) GO TO 20	SELE0140
0021	ITEM=ITEM+1	SELE0150
0022	ISEL(ITEM)=ISEL(I)	SELE0160
0023	20 CONTINUE	SELE0170
0024	IF(ITEM .LE. 1) GO TO 90	SELE0180
0025	25 NCATG=0	SELE0190
0026	ISTART(1)=0	SELE0200
0027	DO 30 I=1, ITEM	SELE0210
0028	ISELI=ISEL(I)	SELE0220
0029	JCATG(I)=INCATG(ISELI)	SELE0230
0030	SELNAM(I)=XNAME(ISELI)	SELE0240
0031	NCATG=NCATG+INCATG(ISELI)	SELE0250
0032	IF(I .LT. ITEM) NCATGX=NCATG	SELE0260
0033	30 ISTART(I+1)=ISTART(I)+INCATG(ISELI)	SELE0270
0034	ITEMX=ITEM-1	SELE0280
0035	NGROUP=JCATG(ITEM)	SELE0290
0036	IF(NSELS .LE. 0) GO TO 45	SELE0300
0037	NSELS=NSELS-1	SELE0310
0038	WRITE(6,601) SELNAM(ITEM), JCATG(ITEM)	SELE0320
0039	DO 40 I=1, ITEMX	SELE0330
0040	40 WRITE(6,602) ISEL(I), SELNAM(I), JCATG(I)	SELE0340
0041	45 IF(NCATG .GT. 40) GO TO 95	SELE0350
0042	DO 50 I=1, NCATG	SELE0360
0043	DO 50 J=1, NCATG	SELE0370
0044	50 CROSS(I,J)=0.	SELE0380
0045	N=0	SELE0390
0046	REWIND MDATA	SELE0400
0047	DO 60 I=1, NDATA	SELE0410
0048	READ(MDATA) ((IX(K,J),J=1,20), K=1, NBUFF)	SELE0420
0049	DO 62 K=1, NBUFF	SELE0430
0050	DO 64 J=1, ITEM	SELE0440

LINE NO.	STATEMENT	
0051	ISELJ=ISEL(J)	SELE0450
0052	II=ISTART(J)+IX(K,ISELJ)	SELE0460
0053	CROSS(II,II)=CROSS(II,II)+1.	SELE0470
0054	J1=J+1	SELE0480
0055	IF(J1.GT.ITEM) GO TO 64	SELE0490
0056	DO 64 L=J1, ITEM	SELE0500
0057	ISELL=ISEL(L)	SELE0510
0058	JJ=ISTART(L)+IX(K,ISELL)	SELE0520
0059	CROSS(II,JJ)=CROSS(II,JJ)+1.	SELE0530
0060	CROSS(JJ,II)=CROSS(II,JJ)	SELE0540
0061	64 CONTINUE	SELE0550
0062	N=N+1	SELE0560
0063	IF(N.EQ.NDATA) GO TO 70	SELE0570
0064	62 CONTINUE	SELE0580
0065	60 CONTINUE	SELE0590
0066	70 CONTINUE	SELE0600
0067	WRITE(6,610)	SELE0610
0068	DO 72 J=1, NCATGX, 30	SELE0620
0069	JEND=J+29	SELE0630
0070	IF(JEND.GE.NCATGX) JEND=NCATGX	SELE0640
0071	L=0	SELE0650
0072	LL=1	SELE0660
0073	WRITE(6,612) (I,I=J, JEND)	SELE0670
0074	DO 74 I=1, NCATGX	SELE0680
0075	L=L+1	SELE0690
0076	DO 76 K=J, JEND	SELE0700
0077	76 LPCROS(K)=CROSS(I,K)	SELE0710
0078	IF(L.EQ.1) WRITE(6,616) SELNAM(LL),L,I,(LPCROS(K),K=J, JEND)	SELE0720
0079	IF(L.GT.1) WRITE(6,618) L,I,(LPCROS(K),K=J, JEND)	SELE0730
0080	IF(L.NE.JCATG(LL)) GO TO 74	SELE0740
0081	LL=LL+1	SELE0750
0082	L=0	SELE0760
0083	74 CONTINUE	SELE0770
0084	WRITE(6,615)	SELE0780
0085	72 CONTINUE	SELE0790
0086	WRITE(6,620) (SPEL,J, J=1,NGROUP)	SELE0800
0087	MCR05=NCATGX+1	SELE0810
0088	L=0	SELE0820
0089	LL=1	SELE0830
0090	DO 80 I=1, NCATGX	SELE0840
0091	L=L+1	SELE0850
0092	DO 82 K=MCR05, NCATGX	SELE0860
0093	LPCROS(K)=CROSS(I,K)	SELE0870
0094	J=K-NCATGX	SELE0880
0095	82 NGJK(I,J)=CROSS(I,K)	SELE0890
0096	IF(L.EQ.1) WRITE(6,621)SELNAM(LL),L,I,(LPCROS(K),K=MCR05,NCATGX)	SELE0900
0097	IF(L.GT.1) WRITE(6,622) L,I,(LPCROS(K),K=MCR05,NCATGX)	SELE0910
0098	IF(L.NE.JCATG(LL)) GO TO 80	SELE0920
0099	LL=LL+1	SELE0930
0100	L=0	SELE0940

図 6. つづき

LINE NO.	STATEMENT	PAGE 0007
0101	80 CONTINUE	SELE0950
0102	DO 86 I=MCR05, NCATG	SELE0960
0103	86 LPCROS(I)=CROSS(I,I)	SELE0970
0104	WRITE(6,625) (LPCROS(I),I=MCR05,NCATG)	SELE0980
0105	RETURN	SELE0990
0106	90 WRITE(6,690)	SELE1000
0107	690 FORMAT(///20X,31HTHIS SELECT CARD MISSING ERROR. //)	SELE1010
0108	RETURN 1	SELE1020
0109	95 WRITE(6,695)	SELE1030
0110	695 FORMAT(///20X,37HTOTAL CATEGORY OVER LIMIT(=40) ERROR.//)	SELE1040
0111	RETURN 1	SELE1050
0112	500 FORMAT(A8,A2,20I2)	SELE1060
0113	600 FORMAT(53H1***** TABLE 1-1; SELECTED ITEMS AND OUTSIDER FOR	SELE1070
0114	1 ,26HANALYSIS BY SELECT CARD (,A8,A2,2H))	SELE1080
0115	601 FORMAT(//22X,13HOUTSIDER Y = ,A8,15H (GROUP =,13,1H))	SELE1090
0116	602 FORMAT(//22X, 7HITEM X(,12,4H) = ,A8,15H (CATEGORY =,13,1H))	SELE1100
0117	610 FORMAT(55H1***** TABLE 2; CROSS TABLE (1) F(I,J;L,M))	SELE1110
0118	612 FORMAT(//20X,18HITEM.CATEGORY NO.,3X,30I3)	SELE1120
0119	615 FORMAT(1H1)	SELE1130
0120	616 FORMAT(/20X,A8,3X,I2,3X,I2,3X,30I3)	SELE1140
0121	618 FORMAT(31X, I2,3X,I2,3X,30I3)	SELE1150
0122	620 FORMAT(56H ***** TABLE 2; CROSS TABLE (2) CROSS SECTI	SELE1160
0123	1 ,55HON ON OUTSIDER GROUP (G(T;J,K) T=1,2,...,NGROUP)	SELE1170
0124	2 //20X,18HITEM.CATEGORY NO.,3X,10(2X,A5,I2))	SELE1180
0125	621 FORMAT(/20X,A8,3X,I2,3X,I2,3X,10I9)	SELE1190
0126	622 FORMAT(31X, I2,3X,I2,3X,10I9)	SELE1200
0127	625 FORMAT(/13X,28HGROUP TOTAL OF OUTSIDER ,10I9)	SELE1210
0128	END	SELE1220

LINE NO.	STATEMENT	
0001	SUBROUTINE MATRIX	**MATRIX
0002	C	MATRO000
0003	COMMON INITEM, ITEM, ITEMX, NDATA, FNDDATA, NCATG, NCATGX, NSELS	COMMON00
0004	1 ,NGROUP, NSOL, NHF, NBUFF, XNAME(20), SELNAM(20)	COMMON01
0005	2 ,INCATG(20), JCATG(20), ISEL(20), ISTART(21), LOSI(20)	COMMON02
0006	3 ,CROSSII(40), CROSS(40,40), H(40,40), V(40,40), NGJK(40,10)	COMMON03
0007	DOUBLE PRECISION XNAME, SELNAM	MATRO010
0008	C *****-----	MATRO020
0009	FNDDATA=NDATA	MATRO030
0010	DO 10 L=1, ITEM	MATRO040
0011	IS=ISTART(L)+1	MATRO050
0012	IE=IS+JCATG(L)-1	MATRO060
0013	FMIN=CROSS(IS,IS)	MATRO070
0014	MIN=IS	MATRO080
0015	DO 12 I=IS,IE	MATRO090
0016	CROSSII(I)=CROSS(I,I)	MATRO100
0017	IF(FMIN .LE. CROSS(I,I)) GO TO 12	MATRO110
0018	MIN=I	MATRO120
0019	FMIN=CROSS(I,I)	MATRO130
0020	12 CONTINUE	MATRO140
0021	LOSI(L)=MIN	MATRO150
0022	10 CONTINUE	MATRO160
0023	C ----- H(JK,UV) MATRIX	MATRO170
0024	KS=ISTART(ITEM)+1	MATRO180
0025	KE=KS+JCATG(ITEM)-1	MATRO190
0026	DO 100 I=1, NCATGX	MATRO200
0027	IF(NGROUP .EQ. 2) GO TO 110	MATRO210
0028	DO 102 J=1, NCATGX	MATRO220
0029	WS=0	MATRO230
0030	DO 104 K=KS,KE	MATRO240
0031	WS=WS+CROSS(I,K)*CROSS(J,K)/CROSS(K,K)	MATRO250
0032	104 CONTINUE	MATRO260
0033	H(I,J)=WS-CROSS(I,I)*CROSS(J,J)/FNDDATA	MATRO270
0034	102 CONTINUE	MATRO280
0035	H(J,I)=H(I,J)	MATRO290
0036	GO TO 100	MATRO300
0037	110 H(I,I)=CROSS(I,KS)/CROSS(KS,KS) = CROSS(I,KE)/CROSS(KE,KE)	MATRO310
0038	100 CONTINUE	MATRO320
0039	C ----- F(JK,UV) MATRIX	MATRO330
0040	DO 200 I=1, NCATGX	MATRO340
0041	FII=CROSS(I,I)	MATRO350
0042	DO 202 J=1, NCATGX	MATRO360
0043	CROSS(I,J)=CROSS(I,J)-CROSS(J,J)*FII/FNDDATA	MATRO370
0044	CROSS(J,I)=CROSS(I,J)	MATRO380
0045	202 CONTINUE	MATRO390
0046	200 CONTINUE	MATRO400
0047	C ----- MATRIX MODIFICATION FOR LOSS RANK ON F AND H	MATRO410
0048	II=0	MATRO420
0049	DO 300 I=1, ITEMX	MATRO430
0050	IS=ISTART(I)+1	MATRO440

図6. つづき

LINE NO.	STATEMENT	PAGE
0051	IE=IS+JCATG(1)-1	MATRO450
0052	DO 302 ISE=IS,IE	MATRO460
0053	IF(ISE .EQ. LOSI(I))	GO TO 302
0054	II=II+1	MATRO480
0055	DO 304 J=1, NCATGX	MATRO490
0056	CROSS(II,J)=CROSS(ISE,J)	MATRO500
0057	H(II,J)=H(ISE,J)	MATRO510
0058	304 CONTINUE	MATRO520
0059	302 CONTINUE	MATRO530
0060	300 CONTINUE	MATRO540
0061	NHF=NCATGX-ITEMX	MATRO550
0062	JJ=0	MATRO560
0063	DO 350 I=1, ITEMX	MATRO570
0064	IS=ISTART(I)+1	MATRO580
0065	IE=IS+JCATG(1)-1	MATRO590
0066	DO 352 ISE=IS,IE	MATRO600
0067	IF(ISE .EQ. LOSI(I))	GO TO 352
0068	JJ=JJ+1	MATRO610
0069	DO 354 J=1, NHF	MATRO620
0070	CROSS(J,JJ)=CROSS(J, ISE)	MATRO630
0071	IF(NGROUP .EQ. 2)	GO TO 354
0072	H(J,JJ)=H(J, ISE)	MATRO640
0073	354 CONTINUE	MATRO650
0074	352 CONTINUE	MATRO660
0075	350 CONTINUE	MATRO670
0076	IF(NGROUP .GT. 2)	GO TO 370
0077	DO 360 I=1, NHF	MATRO680
0078	CROSS(I,NHF+1)=H(I,1)	MATRO690
0079	360 CROSS(I,NHF+2)=H(I,1)	MATRO700
0080	370 CONTINUE	MATRO710
0081	RETURN	MATRO720
0082	END	MATRO730
		MATRO740
		MATRO750
		MATRO760

LINE NO.	STATEMENT	
0001	SUBROUTINE SOLVE(*)	** SOLVE
0002	C	SOLV0000
0003	COMMON INITEM, ITEM, ITEMX, NDATA, FNDATA, NCATG, NCATGX, NSELS	COMMON00
0004	1 ,NGROUP, NSOL, NHF, NBUFF, XNAME(20), SELNAM(20)	COMMON01
0005	2 ,INCATG(20), JCATG(20), ISEL(20), ISTART(21), LOSI(20)	COMMON02
0006	3 ,CROSSI(40), CROSS(40,40), H(40,40), V(40,40), NGJK(40,10)	COMMON03
0007	DOUBLE PRECISION XNAME, SELNAM	SOLV0010
0008	C *****-----	SOLV0020
0009	IF(NGROUP .EQ. 2) GO TO 100	SOLV0030
0010	CALL EIGAB(H, CROSS, V, NHF, \$900)	SOLV0040
0011	GO TO 999	SOLV0050
0012	100 CALL EQU(CROSS, NHF, NHF+1, \$900)	SOLV0060
0013	999 RETURN	SOLV0070
0014	900 WRITE(6,600)	SOLV0080
0015	RETURN 1	SOLV0090
0016	600 FORMAT(/// 36H ??? MATRIX CROSS IS SINGULAR ERROR /)	SOLV0100
0017	END	SOLV0110

図 6. つづ き

OKITAC 4500 FORTRAN SOURCE PROGRAM LIST

PAGE 0011

LINE NO.	STATEMENT	
0001	SUBROUTINE EIGAB(A,B,V,N,*)	** EIGAB
0002	C	EIGA0010
0003	DIMENSION A(40,40), B(40,40), V(40,40), EIGEN(40)	EIGA0020
0004	DOUBLE PRECISION DWS1	EIGA0030
0005	C *****-----	EIGA0040
0006	KEY=0	EIGA0050
0007	CALL JACOBI(B, V, N)	EIGA0060
0008	DO 100 J=1, N	EIGA0070
0009	IF(B(J,J) .LE. 0.) RETURN 1	EIGA0080
0010	WS1=1./SQRT(B(J,J))	EIGA0090
0011	DO 100 I=1, N	EIGA0100
0012	100 B(I,J)=V(I,J)*WS1	EIGA0110
0013	DO 110 J=1, N	EIGA0120
0014	DO 110 I=1, N	EIGA0130
0015	DWS1=0.0D0	EIGA0140
0016	DO 112 K=1, N	EIGA0150
0017	112 DWS1=DWS1+B(K,I)*A(K,J)	EIGA0160
0018	110 V(I,J)=DWS1	EIGA0170
0019	DO 120 I=1, N	EIGA0180
0020	DO 120 J=1, N	EIGA0190
0021	DWS1=0.0D0	EIGA0200
0022	DO 122 K=1, N	EIGA0210
0023	122 DWS1=DWS1+V(I,K)*B(K,J)	EIGA0220
0024	120 A(I,J)=DWS1	EIGA0230
0025	CALL JACOBI(A, V, N)	EIGA0240
0026	DO 130 I=1, N	EIGA0250
0027	130 EIGEN(I)=A(I,I)	EIGA0260
0028	DO 140 I=1, N	EIGA0270
0029	DO 140 J=1, N	EIGA0280
0030	DWS1=0.0D0	EIGA0290
0031	DO 142 K=1, N	EIGA0300
0032	142 DWS1=DWS1+B(I,K)*V(K,J)	EIGA0310
0033	140 A(I,J)=DWS1	EIGA0320
0034	DO 150 J=1, N	EIGA0330
0035	DWS1=0.0D0	EIGA0340
0036	DO 152 I=1, N	EIGA0350
0037	152 DWS1=DWS1+A(I,J)*A(I,J)	EIGA0360
0038	DWS1=DSQRT(DWS1)	EIGA0370
0039	DO 154 I=1, N	EIGA0380
0040	154 V(I,J)=A(I,J)/DWS1	EIGA0390
0041	A(J,J)=EIGEN(J)	EIGA0400
0042	150 CONTINUE	EIGA0410
0043	RETURN	EIGA0420
0044	END	EIGA0430

LINE NO.	STATEMENT	
0001	SUBROUTINE JACOBI(A, V, N)	**JACOBI
0002	C	JACO0010
0003	DIMENSION A(40,40), V(40,40), BIP(40), BIQ(40)	JACO0020
0004	DOUBLE PRECISION VNORMD	JACO0030
0005	C ****-----	JACO0040
0006	DO 100 I=1, N	JACO0050
0007	DO 101 J=1, N	JACO0060
0008	101 V(I,J)=0.	JACO0070
0009	100 V(I,I)=1.	JACO0080
0010	N1=N-1	JACO0090
0011	VNORMD=0.	JACO0100
0012	DO 110 I=1, N1	JACO0110
0013	JE=I+1	JACO0120
0014	DO 110 J=JE, N	JACO0130
0015	110 VNORMD=VNORMD+2.000*A(I,J)*A(I,J)	JACO0140
0016	IF(VNORMD .LE. 0.000) GO TO 180	JACO0150
0017	VNORM=DSQRT(VNORMD)	JACO0160
0018	FNORM=VNORM*5.0E-5	JACO0170
0019	ISWICH=0	JACO0180
0020	120 VNORM=VNORM/FLOAT(N)	JACO0190
0021	DO 130 IQ=2, N	JACO0200
0022	IPEND=IQ-1	JACO0210
0023	DO 140 IP=1, IPEND	JACO0220
0024	IF(ABS(A(IP,IQ)) .LT. VNORM) GO TO 140	JACO0230
0025	ISWICH=1	JACO0240
0026	FLAMDA=-A(IP,IQ)	JACO0250
0027	FMU=(A(IP,IP)-A(IQ,IQ))/2.	JACO0260
0028	OMEGA=SIGN(1.,FMU)*FLAMDA/SQRT(FMU*FMU+FLAMDA*FLAMDA)	JACO0270
0029	WS1=1.-OMEGA*OMEGA	JACO0280
0030	IF(WS1 .LE. 0.) WS2=1.	JACO0290
0031	IF(WS1 .GT. 0.) WS2=1.+SQRT(WS1)	JACO0300
0032	SINF=OMEGA/SQRT(WS2+WS2)	JACO0310
0033	SINFF=SINF*SINF	JACO0320
0034	COSF=SQRT(1.-SINFF)	JACO0330
0035	DO 150 I=1, N	JACO0340
0036	IF(1.EQ.IP .OR. 1.EQ.IQ) GO TO 152	JACO0350
0037	BIP(I)=A(I,IP)*COSF-A(I,IQ)*SINF	JACO0360
0038	BIQ(I)=A(I,IP)*SINF+A(I,IQ)*COSF	JACO0370
0039	152 VIIP =V(I,IP)*COSF-V(I,IQ)*SINF	JACO0380
0040	V(I,IQ)=V(I,IP)*SINF+V(I,IQ)*COSF	JACO0390
0041	150 V(I,IP)=VIIP	JACO0400
0042	COSFF=COSF*COSF	JACO0410
0043	SINCCS=SINF*COSF	JACO0420
0044	BIP(IP)=A(IP,IP)*COSFF+A(IQ,IQ)*SINFF-2.*A(IP,IQ)*SINCCS	JACO0430
0045	BIQ(IQ)=A(IP,IP)*SINFF+A(IQ,IQ)*COSFF+2.*A(IP,IQ)*SINCCS	JACO0440
0046	BIP(IQ)=(A(IP,IP)-A(IQ,IQ))*SINCCS+A(IP,IQ)*(COSFF-SINFF)	JACO0450
0047	BIQ(IP)=BIP(IQ)	JACO0460
0048	DO 160 I=1, N	JACO0470
0049	A(I,IP)=BIP(I)	JACO0480
0050	160 A(I,IQ)=BIQ(I)	JACO0490

図 6. つづき

LINE NO.	STATEMENT		PAGE
		OKITAC 4500 FORTRAN SOURCE PROGRAM LIST	0013
0051	DO 162 I=1, N		JAC00500
0052	A(I,P,I)=BIP(I)		JAC00510
0053	162 A(IQ,I)=BIQ(I)		JAC00520
0054	140 CONTINUE		JAC00530
0055	130 CONTINUE		JAC00540
0056	IF(ISWICH .NE. 1)	GO TO 170	JAC00550
0057	ISWICH=0		JAC00560
0058	GO TO 125		JAC00570
0059	170 IF(VNORM .GT. FNORM)	GO TO 120	JAC00580
0060	180 DO 190 I=1, N1		JAC00590
0061	DO 192 J=1, N		JAC00600
0062	IF(J .EQ. I)	GO TO 194	JAC00610
0063	IF(AMAX .GE. A(J,J))	GO TO 192	JAC00620
0064	194 AMAX=A(J,J)		JAC00630
0065	MAXJ=J		JAC00640
0066	192 CONTINUE		JAC00650
0067	WS1=A(I,I)		JAC00660
0068	A(I,I)=A(MAXJ,MAXJ)		JAC00670
0069	A(MAXJ,MAXJ)=WS1		JAC00680
0070	DO 196 J=1, N		JAC00690
0071	WS1=V(J,I)		JAC00700
0072	V(J,I)=V(J,MAXJ)		JAC00710
0073	196 V(J,MAXJ)=WS1		JAC00720
0074	190 CONTINUE		JAC00730
0075	RETURN		JAC00740
0076	END		JAC00750

LINE NO.	STATEMENT	
0001	SUBROUTINE EQU(A, NVAR, NVARY, *)	** EQU
0002	C	EQU 0010
0003	DIMENSION A(40,40), JX(40), IX(40)	EQU 0020
0004	C ****	EQU 0030
0005	DO 1 I=1, NVAR	EQU 0040
0006	IX(I)=1	EQU 0050
0007	1 JX(I)=1	EQU 0060
0008	DO 10 I=1, NVAR	EQU 0070
0009	PIV=A(I,I)	EQU 0080
0010	IMAX=I	EQU 0090
0011	JMAX=I	EQU 0100
0012	DO 12 J=1, NVAR	EQU 0110
0013	DO 12 K=1, NVAR	EQU 0120
0014	IF(ABS(PIV) .GE. ABS(A(K,J))) GO TO 12	EQU 0130
0015	PIV=A(K,J)	EQU 0140
0016	IMAX=K	EQU 0150
0017	JMAX=J	EQU 0160
0018	12 CONTINUE	EQU 0170
0019	IF(IMAX .EQ. I .AND. JMAX .EQ. I) GO TO 16	EQU 0180
0020	C ***** CHANGE ON ROW. -----	EQU 0190
0021	DO 14 J=1, NVARY	EQU 0200
0022	RESV=A(I,J)	EQU 0210
0023	A(I,J)=A(IMAX,J)	EQU 0220
0024	14 A(IMAX,J)=RESV	EQU 0230
0025	JXRSV=JX(I)	EQU 0240
0026	JX(I)=JX(IMAX)	EQU 0250
0027	JX(IMAX)=JXRSV	EQU 0260
0028	C ***** CHANGE ON COL. -----	EQU 0270
0029	DO 15 K=1, NVAR	EQU 0280
0030	RESV=A(K,I)	EQU 0290
0031	A(K,I)=A(K,JMAX)	EQU 0300
0032	15 A(K,JMAX)=RESV	EQU 0310
0033	IXRSV=IX(I)	EQU 0320
0034	IX(I)=IX(JMAX)	EQU 0330
0035	IX(JMAX)=IXRSV	EQU 0340
0036	C ***** SWEEP OUT. -----	EQU 0350
0037	16 A(I,I)=1.	EQU 0360
0038	IF(ABS(PIV) .LT. 1.E-6) RETURN 1	EQU 0370
0039	DO 18 J=1, NVARY	EQU 0380
0040	18 A(I,J)=A(I,J)/PIV	EQU 0390
0041	DO 20 L=1, NVAR	EQU 0400
0042	IF(L .EQ. I) GO TO 20	EQU 0410
0043	RESV=A(L,I)	EQU 0420
0044	A(L,I)=0	EQU 0430
0045	DO 22 J=1, NVARY	EQU 0440
0046	A(L,J)=A(L,J)-RESV*A(I,J)	EQU 0450
0047	22 CONTINUE	EQU 0460
0048	20 CONTINUE	EQU 0470
0049	10 CONTINUE	EQU 0480
0050	C ***** REARRANGE ON COL. -----	EQU 0490

図 6. つづき

```

                                OKITAC 4500  FORTRAN  SOURCE PROGRAM LIST                                PAGE 0015
LINE NO.      STATEMENT
0051          DO 30 I=1, NVAR                                EQU 0500
0052          DO 31 J=I, NVAR                                EQU 0510
0053          IF(JX(J) .EQ. I) JXRSV=J                      EQU 0520
0054          31 CONTINUE                                     EQU 0530
0055          IF(JXRSV .LE. I) GO TO 30                      EQU 0540
0056          DO 32 J=1, NVAR                                EQU 0550
0057          RESV=A(J,I)                                     EQU 0560
0058          A(J,I)=A(J,JXRSV)                              EQU 0570
0059          32 A(J,JXRSV)=RESV                             EQU 0580
0060          JX(JXRSV)=JX(I)                                EQU 0590
0061          30 CONTINUE                                     EQU 0600
0062          C ***** REARRANGE ON ROW. ----- EQU 0610
0063          DO 40 I=1, NVAR                                EQU 0620
0064          DO 41 J=I, NVAR                                EQU 0630
0065          IF(IX(J) .EQ. I) IXRSV=J                      EQU 0640
0066          41 CONTINUE                                     EQU 0650
0067          IF(IXRSV .LE. I) GO TO 40                      EQU 0660
0068          DO 42 J=1, NVARY                                EQU 0670
0069          RESV=A(I,J)                                     EQU 0680
0070          A(I,J)=A(IXRSV,J)                              EQU 0690
0071          42 A(IXRSV,J)=RESV                             EQU 0700
0072          IX(IXRSV)=IX(I)                                EQU 0710
0073          40 CONTINUE                                     EQU 0720
0074          RETURN                                         EQU 0730
0075          END                                           EQU 0740

```

LINE NO.	STATEMENT	
0001	SUBROUTINE OUTX	** OUTX
0002		OUTX0000
0003	C	COMMON00
0004	1 COMMON INITEM, ITEM, ITEMX, NDATA, FNDA, NCATG, NCATGX, NSELS	COMMON01
0005	2 ,NGROUP, NSOL, NHF, NBUFF, XNAME(20), SELNAM(20)	COMMON02
0006	3 ,INCATG(20), JCATG(20), ISEL(20), ISTART(21), LOSI(20)	COMMON03
0007	DOUBLE PRECISION XNAME, SELNAM	OUTX0010
0008	DIMENSION X(40), XMEAN(20), XNORM(40)	OUTX0020
0009	C ****	-----OUTX0030
0010	WRITE(6,600)	OUTX0040
0011	IF(NGROUP .EQ. 2) GO TO 100	OUTX0050
0012	CORR=SQRT(H(1,1))	OUTX0060
0013	WRITE(6,602) H(1,1), CORR	OUTX0070
0014	GO TO 120	OUTX0080
0015	100 WS=0.	OUTX0090
0016	DO 110 J=1, NHF	OUTX0100
0017	110 WS=WS+CROSS(J,NHF+1)*CROSS(J,NHF+2)	OUTX0110
0018	CORR=SQRT(CROSSII(NHF+1)*CROSSII(NHF+2)*WS/FNDA).	OUTX0120
0019	WRITE(6,604) CORR	OUTX0130
0020	120 WRITE(6,606)	OUTX0140
0021	II=0	OUTX0150
0022	K=0	OUTX0160
0023	130 K=K+1	OUTX0170
0024	IS=ISTART(K)+1	OUTX0180
0025	IE=IS+JCATG(K)-1	OUTX0190
0026	DO 132 I=IS, IE	OUTX0200
0027	IF(I .EQ. LOSI(K)) GO TO 134	OUTX0210
0028	II=II+1	OUTX0220
0029	IF(NGROUP .EQ. 2) X(I)=CROSS(II,NHF+1)	OUTX0230
0030	IF(NGROUP .GT. 2) X(I)=V(II, 1)	OUTX0240
0031	GO TO 132	OUTX0250
0032	134 X(I)=0.	OUTX0260
0033	132 CONTINUE	OUTX0270
0034	WS=0.	OUTX0280
0035	DO 136 I=IS, IE	OUTX0290
0036	136 WS=WS+X(I)*CROSSII(I)	OUTX0300
0037	XMEAN(K)=WS/FNDA	OUTX0310
0038	DO 138 I=IS, IE	OUTX0320
0039	138 XNORM(I)=X(I)-XMEAN(K)	OUTX0330
0040	DO 140 I=IS, IE	OUTX0340
0041	NOC=I-ISTART(K)	OUTX0350
0042	IF(NOC .EQ. 1) WRITE(6,608) SELNAM(K), NOC, X(I), XMEAN(K), XNORM(I)	OUTX0360
0043	IF(NOC .GT. 1) WRITE(6,610) NOC, X(I), XNORM(I)	OUTX0370
0044	140 CONTINUE	OUTX0380
0045	IF(K .LT. ITEMX) GO TO 130	OUTX0390
0046	DO 144 I=1, NCATGX	OUTX0400
0047	144 V(I,1)=XNORM(I)	OUTX0410
0048	NSOL=NGROUP-1	OUTX0420
0049	IF(NGROUP .EQ. 2) GO TO 999	OUTX0430
0050	DO 150 L=2, NSOL	OUTX0440

図 6. つづき

OKITAC 4500 FORTRAN SOURCE PROGRAM LIST

PAGE 0017

LINE NO.	STATEMENT	
0051	II=0	OUTX0450
0052	DO 152 K=1, ITEMX	OUTX0460
0053	IS=ISTART(K)+1	OUTX0470
0054	IE=IS+JCATG(K)-1	OUTX0480
0055	DO 154 I=IS, IE	OUTX0490
0056	IF(I.EQ. LOSI(K)) GO TO 156	OUTX0500
0057	II=II+1	OUTX0510
0058	X(I)=V(II,L)	OUTX0520
0059	GO TO 154	OUTX0530
0060	156 X(I)=0.	OUTX0540
0061	154 CONTINUE	OUTX0550
0062	WS=0.	OUTX0560
0063	DO 158 I=IS, IE	OUTX0570
0064	158 WS=WS+X(I)*CROSSI(1)	OUTX0580
0065	XMEAN(K)=WS/FNDATA	OUTX0590
0066	DO 160 I=IS, IE	OUTX0600
0067	160 XNORM(I)=X(I)-XMEAN(K)	OUTX0610
0068	152 CONTINUE	OUTX0620
0069	DO 162 I=1, NCATGX	OUTX0630
0070	162 V(I,L)=XNORM(I)	OUTX0640
0071	150 CONTINUE	OUTX0650
0072	999 RETURN	OUTX0660
0073	600 FORMAT(37H1***** TABLE 3: THE SOLUTION SCORE)	OUTX0670
0074	602 FORMAT(///20X,13HEIGEN VALUE =,F10.5,1H,10X,18HCORRELATION RATIO	OUTX0680
0075	1 ,1H=,F8.4//)	OUTX0690
0076	604 FORMAT(///20X,19HCORRELATION RATIO =,F8.4//)	OUTX0700
0077	606 FORMAT(//23X,4HITEM,3X,8HCATEGORY,15X,5HSCORE,10X,10HMEAN SCORE	OUTX0710
0078	1 ,8X,12HNORMAL SCORE)	OUTX0720
0079	608 FORMAT(/19X,A8,9X,I2, E20.6, 2F20.6)	OUTX0730
0080	610 FORMAT(36X,I2,E20.6,20X,F20.6)	OUTX0740
0081	END	OUTX0750

LINE NO.	STATEMENT	
0001	SUBROUTINE STATX	** STATX
0002	C	STAT0000
0003	COMMON INITEM, ITEM, ITEMX, NDATA, FNDATA, NCATG, NCATGX, NSELS	COMMON00
0004	1 ,NGROUP, NSOL, NHF, NBUFF, XNAME(20), SELNAM(20)	COMMON01
0005	2 ,INCATG(20), JCATG(20), ISEL(20), ISTART(21), LOSI(20)	COMMON02
0006	3 ,CROSSII(40), CROSS(40,40), H(40,40), V(40,40), NGJK(40,10)	COMMON03
0007	DOUBLE PRECISION XNAME, SELNAM	STAT0010
0008	DIMENSION SUMX(20),SUMXX(20,20), X(20),TOTX(20),TOTXX(20,20)	STAT0020
0009	1 ,IX(12,20)	STAT0030
0010	EQUIVALENCE (H(1,1),TOTXX(1,1))	STAT0040
0011	C -----	STAT0050
0012	WRITE(6,600)	STAT0060
0013	DO 100 I=1, ITEMX	STAT0070
0014	TOTX(I)=0.	STAT0080
0015	DO 100 J=1, ITEMX	STAT0090
0016	100 TOTXX(I,J)=0.	STAT0100
0017	KEYOUT=3	STAT0110
0018	L=0	STAT0120
0019	200 L=L+1	STAT0130
0020	REWIND MDATA	STAT0140
0021	DO 201 I=1, ITEMX	STAT0150
0022	SUMX(I)=0.	STAT0160
0023	DO 201 J=1, ITEMX	STAT0170
0024	201 SUMXX(I,J)=0.	STAT0180
0025	N=0	STAT0190
0026	M=NCATGX+L	STAT0200
0027	IGN=CROSSII(M)	STAT0210
0028	GN=IGN	STAT0220
0029	M=0	STAT0230
0030	203 READ(MDATA) ((IX(K,J),J=1,20), K=1,NBUFF)	STAT0240
0031	DO 202 K=1, NBUFF	STAT0250
0032	N=N+1	STAT0260
0033	ISELY =ISEL(ITEM)	STAT0270
0034	IF(IX(K,ISELY) .NE. L) GO TO 208	STAT0280
0035	M=M+1	STAT0290
0036	DO 204 I=1, ITEMX	STAT0300
0037	II=ISEL(I)	STAT0310
0038	JJ=ISTART(II)+IX(K,II)	STAT0320
0039	204 X(I)=V(JJ,1)	STAT0330
0040	DO 206 I=1, ITEMX	STAT0340
0041	SUMX(I)=SUMX(I)+X(I)	STAT0350
0042	DO 206 J=1, ITEMX	STAT0360
0043	SUMXX(I,J)=SUMXX(I,J)+X(I)*X(J)	STAT0370
0044	206 SUMXX(J,I)=SUMXX(I,J)	STAT0380
0045	208 IF(N .EQ. NDATA .OR. M .EQ. IGN) GO TO 220	STAT0390
0046	202 CONTINUE	STAT0400
0047	GO TO 203.	STAT0410
0048	220 CONTINUE	STAT0420
0049	WRITE(6,610) L	STAT0430
0050	221 WRITE(6,611)	STAT0440

図 6. つづき

LINE NO.	STATEMENT	PAGE
	OKITAC 4500 FORTRAN SOURCE PROGRAM LIST	0019
0051	DO 222 I=1, ITEMX	STAT0450
0052	X(1)=SUMX(I)/GN	STAT0460
0053	SDSD=(SUMXX(I,I)-SUMX(I)*SUMX(I)/GN)/GN	STAT0470
0054	IF(SDSO .LE. 0.) SDSO=0.	STAT0480
0055	X(2)=SQRT(SDSO)	STAT0490
0056	X(3)=X(2)/X(1)*100.	STAT0500
0057	LIST=IABS(KEYOUT)	STAT0510
0058	WRITE(6,620) SELNAM(I),(X(J),J=1, LIST)	STAT0520
0059	222 CONTINUE	STAT0530
0060	229 DO 230 I=1, ITEMX	STAT0540
0061	TOTX(I)=TOTX(I)+SUMX(I)	STAT0550
0062	DO 230 J=1, ITEMX	STAT0560
0063	230 TOTXX(I,J)=TOTXX(I,J)+SUMXX(I,J)	STAT0570
0064	WRITE(6,630) (SELSNAM(J),J=1,ITEMX)	STAT0580
0065	DO 232 I=1, ITEMX	STAT0590
0066	DO 234 J=1, ITEMX	STAT0600
0067	234 SUMXX(I,J)=(SUMXX(I,J)-SUMX(I)*SUMX(J)/GN)/GN	STAT0610
0068	X(I)=SUMXX(I,I)	STAT0620
0069	232 WRITE(6,632) SELNAM(I),(SUMXX(I,J),J=1,I)	STAT0630
0070	WRITE(6,634) (SELSNAM(J),J=1,ITEMX)	STAT0640
0071	DO 240 I=1, ITEMX	STAT0650
0072	DO 242 J=1, I	STAT0660
0073	IF(X(I)*X(J) .LE. 0.) GO TO 244	STAT0670
0074	SUMXX(I,J)=SUMXX(I,J)/SQRT(X(I)*X(J))	STAT0680
0075	GO TO 246	STAT0690
0076	244 SUMXX(I,J)=0.	STAT0700
0077	246 IF(I .EQ. J) SUMXX(I,J)=1.	STAT0710
0078	242 CONTINUE	STAT0720
0079	WRITE(6,635) SELNAM(I),(SUMXX(I,JE),JE=1,I)	STAT0730
0080	240 CONTINUE	STAT0740
0081	IF(KEYOUT .LT. 0) GO TO 300	STAT0750
0082	249 IF(L .LT. NGROUP) GO TO 200	STAT0760
0083	DO 250 I=1, ITEMX	STAT0770
0084	SUMX(I)=TOTX(I)	STAT0780
0085	DO 250 J=1, ITEMX	STAT0790
0086	250 SUMXX(I,J)=TOTXX(I,J)	STAT0800
0087	KEYOUT=-2	STAT0810
0088	GN=FNDATA	STAT0820
0089	WRITE(6,640)	STAT0830
0090	GO TO 221	STAT0840
0091	300 CONTINUE	STAT0850
0092	RETURN	STAT0860
0093	600 FORMAT(45H1***** TABLE 4; STATISTICS ON NORMAL SCORE)	STAT0870
0094	610 FORMAT(///8X,20H..... FOR GROUP NO.,13)	STAT0880
0095	611 FORMAT(///30X,10H** MEAN **, 6X, 9H** S.D **, 3X,12H** C.V(%) **/)	STAT0890
0096	620 FORMAT(/17X,A8,2E15.5,F15.2)	STAT0900
0097	630 FORMAT(///30X,33H** VARIANCE COVARIANCE MATRIX **	STAT0910
0098	1 //((25X,7(7X,A8)))	STAT0920
0099	632 FORMAT(/17X, A8, 7E15.6/(25X,7E15.6))	STAT0930
0100	634 FORMAT(///30X,26H** CORRELATION MATRIX: **/(25X,7(7X,A8)))	STAT0940

PAGE 0020

ØKITAC 4500 FORTRAN SOURCE PROGRAM LIST

LINE NO.

STATEMENT

0101

0102

0103

635 FORMAT(17X, A8, 7F15.4/(25X,7F15.4))
640 FORMAT(///// 8X,2ZH+****+ FOR GROUP TOTAL)
END

STAT0950
STAT0960
STAT0970

図 6. つづき

OKITAC 4500 FORTRAN SOURCE PROGRAM LIST

PAGE 0021

```

LINE NO.      STATEMENT
0001          SUBROUTINE ESTMX                      ** ESTM
0002          C .....                               ESTM0000
0003          COMMON INITEM, ITEM, ITEMX, NDATA, FNDATA, NCATG, NCATGX, NSELS COMMON00
0004          1 ,NGROUP, NSOL, NHF, NBUFF, XNAME(20), SELNAM(20)      COMMON01
0005          2 ,INCATG(20), JCATG(20), ISEL(20), ISTART(21), LOSI(20) COMMON02
0006          3 ,CROSSI(40), CROSS(40,40), H(40,40), V(40,40), NGJK(40,10) COMMON03
0007          DOUBLE PRECISION XNAME, SELNAM, SPEL                    ESTM0010
0008          DIMENSION SUMA(10), SUMAA(10), JX(20), IX(12,20), ESTM(12,10) ESTM0020
0009          1 ,MGROUP(12), NOSEQ(12)                                ESTM0030
0010          EQUIVALENCE (CROSS(1,1),SUMA(1)), (CROSS(1,2),SUMAA(1)) ESTM0040
0011          1 ,(CROSS(1,4),ESTMAX), (CROSS(1,5),ESTMIN)            ESTM0050
0012          DATA SPEL/5HGROUP/                                     ESTM0060
0013          C *****-----ESTM0070
0014          WRITE(6,600)                                           ESTM0080
0015          DO 100 I=1, NGROUP                                       ESTM0090
0016          SUMA(I)=0.                                               ESTM0100
0017          100 SUMAA(I)=0.                                          ESTM0110
0018          REWIND MDATA                                           ESTM0120
0019          REWIND MTESTM                                          ESTM0130
0020          N=0                                                      ESTM0140
0021          DO 110 I=1, NDATA, NBUFF                                ESTM0150
0022          READ(MDATA) ((IX(K,J),J=1,20),K=1,NBUFF)              ESTM0160
0023          M=0                                                       ESTM0170
0024          DO 112 K=1, NBUFF                                       ESTM0180
0025          N=N+1                                                    ESTM0190
0026          M=M+1                                                    ESTM0200
0027          DO 114 J=1, ITEM                                         ESTM0210
0028          ISELJ=ISEL(J)                                           ESTM0220
0029          114 JX(J)=IX(K,ISELJ)                                    ESTM0230
0030          NOGRP=JX(ITEM)                                           ESTM0240
0031          DO 116 L=1, NSOL                                         ESTM0250
0032          ESTM(K,L)=0.                                             ESTM0260
0033          DO 118 J=1, ITEMX                                        ESTM0270
0034          JXJ=JX(J)+ISTART(J)                                     ESTM0280
0035          118 ESTM(K,L)=ESTM(K,L)+V(JXJ,L)                        ESTM0290
0036          116 CONTINUE                                           ESTM0300
0037          MGROUP(K)=NOGRP                                          ESTM0310
0038          NOSEQ(K)=N                                              ESTM0320
0039          IF(N .EQ. 1)                                           ESTMAX=ESTM(1,1) ESTM0330
0040          IF(N .EQ. 1)                                           ESTMIN=ESTM(1,1) ESTM0340
0041          IF(ESTMAX .LT. ESTM(K,1)) ESTMAX=ESTM(K,1) ESTM0350
0042          IF(ESTMIN .GT. ESTM(K,1)) ESTMIN=ESTM(K,1) ESTM0360
0043          SUMA(NOGRP)= SUMA(NOGRP) +ESTM(K,1) ESTM0370
0044          SUMAA(NOGRP)=SUMAA(NOGRP)+ESTM(K,1)*ESTM(K,1) ESTM0380
0045          IF(N .GE. NDATA) GO TO 120 ESTM0390
0046          112 CONTINUE                                           ESTM0400
0047          120 WRITE(MTESTM) (MGROUP(K),(ESTM(K,J),J=1,NSOL),K=1,NBUFF) ESTM0410
0048          WRITE(6,602) (NOSEQ(K),MGROUP(K),ESTM(K,1), K=1,M) ESTM0420
0049          110 CONTINUE                                           ESTM0430
0050          WRITE(6,604) (SPEL,I, I=1, NGROUP) ESTM0440

```

LINE NO.	STATEMENT	
0051	DO 200 I=1, NGROUP	ESTM0450
0052	MCROS=NCATGX+1	ESTM0460
0053	SUMA(I)=SUMA(I)/CROSII(MCROS)	ESTM0470
0054	200 SUMAA(I)=(SUMAA(I)-CROSII(MCROS)*SUMA(I)*SUMA(I))/CROSII(MCROS)	ESTM0480
0055	WRITE(6,606) (SUMA(J),J=1,NGROUP)	ESTM0490
0056	WRITE(6,608) (SUMAA(J),J=1,NGROUP)	ESTM0500
0057	DO 210 I=1, NGROUP	ESTM0510
0058	IF(SUMAA(I).LE.0.) SUMAA(I)=0.	ESTM0520
0059	210 SUMAA(I)=SQRT(SUMAA(I))	ESTM0530
0060	WRITE(6,610) (SUMAA(J),J=1,NGROUP)	ESTM0540
0061	WRITE(6,612) ESTMAX,ESTMIN	ESTM0550
0062	600 FORMAT(41H1***** TABLE 5; ESTIMATED SAMPLE SCORE	ESTM0560
0063	1 ///6X,6(6X,5HGROU,4X,6HSAMPLE)	ESTM0570
0064	2 / 6X,6(11H NO. NO.,5X,5HSCORE)/)	ESTM0580
0065	602 FORMAT(6X,6(15,15,F11.5)/6X,6(15,15,F11.5))	ESTM0590
0066	604 FORMAT(////15X,33H..... STATISTICS ON SAMPLE SCORE	ESTM0600
0067	1 //(10X,10(4X,A5,I3))	ESTM0610
0068	606 FORMAT(/ 6X, 4HMEAN,10F12.5)	ESTM0620
0069	608 FORMAT(2X, 8HVARIANCE,10F12.5)	ESTM0630
0070	610 FORMAT(7X, 3HS.D, 10F12.5)	ESTM0640
0071	612 FORMAT(//10X,22HMAX. SCORE (FOR ALL) =,F12.5	ESTM0650
0072	1 //10X,22HMIN. SCORE (FOR ALL) =,F12.5)	ESTM0660
0073	RETURN	ESTM0670
0074	END	ESTM0680

図6. つづき

```

                                OKITAC 4500   FORTRAN   SOURCE PROGRAM LIST
                                                                PAGE 0023
LINE NO.      STATEMENT
0001          SUBROUTINE FREQ                                ** FREQ
0002          C .....                                      FREQ0000
0003          COMMON INITEM, ITEM, ITEMX, NDATA, FNDATA, NCATG, NCATGX, NSELS COMMON00
0004          1      ,NGROUP, NSOL, NHF, NBUFF, XNAME(20), SELNAM(20)          COMMON01
0005          2      ,INCATG(20), JCATG(20), ISEL(20), ISTART(21), LOSI(20)   COMMON02
0006          3      ,CROSSII(40), CROSS(40,40), H(40,40), V(40,40), NGJK(40,10) COMMON03
0007          DOUBLE PRECISION XNAME, SELNAM, HGROUP, HTOTAL          FREQ0010
0008          DIMENSION IFREQ(20,11), PICH(20,2), MGROUP(12), ESTM(12,10) FREQ0020
0009          1      ,NUMH(10)                                           FREQ0030
0010          EQUIVALENCE (CROSS(1,4),ESTMAX), (CROSS(1,5),ESTMIN)        FREQ0040
0011          DATA HGROUP, HTOTAL/5HGROUP, 5HTOTAL/                    FREQ0050
0012          C *****-----FREQ0060
0013          NG1=NGROUP+1                                             FREQ0070
0014          LAST=15                                                 FREQ0080
0015          IF(NDATA .GT. 200)      LAST=20                        FREQ0090
0016          LAST1=LAST-1                                           FREQ0100
0017          PICH(1,2)=AINT(ESTMIN*1000.)/1000.                    FREQ0110
0018          YPICH=AINT((ESTMAX-ESTMIN)/FLOAT(LAST-2)*1000.)/1000. FREQ0120
0019          DO 100 I=2, LAST                                       FREQ0130
0020          PICH(I,1)=(PICH(I-1,2)*1000. + 1.)/1000.              FREQ0140
0021          100 PICH(I,2)=PICH(I-1,2)+YPICH                         FREQ0150
0022          DO 110 I=1, LAST                                       FREQ0160
0023          DO 110 J=1, NG1                                         FREQ0170
0024          110 IFREQ(I,J)=0                                        FREQ0180
0025          REWIND MTESTM                                          FREQ0190
0026          N=0                                                     FREQ0200
0027          120 READ(MTESTM) (MGROUP(K),(ESTM(K,J),J=1,NSOL),K=1,NBUFF) FREQ0210
0028          DO 122 K=1, NBUFF                                       FREQ0220
0029          MG=MGROUP(K)                                           FREQ0230
0030          Y=AINT(ESTM(K,1)*1000.)/1000.                           FREQ0240
0031          DO 124 I=1, LAST                                       FREQ0250
0032          IF(Y .LE. PICH(I,2))      GO TO 126                    FREQ0260
0033          124 CONTINUE                                           FREQ0270
0034          I=LAST                                                  FREQ0280
0035          126 IFREQ(I,MG)= IFREQ(I,MG) +1                         FREQ0290
0036          IFREQ(I,NG1)=IFREQ(I,NG1)+1                             FREQ0300
0037          N=N+1                                                   FREQ0310
0038          IF(N .GE. NDATA)      GO TO 130                         FREQ0320
0039          122 CONTINUE                                           FREQ0330
0040          GO TO 120                                               FREQ0340
0041          130 WRITE(6,600) (HGROUP,J, J=1, NGROUP), HTOTAL      FREQ0350
0042          WRITE(6,602)      PICH(1,2), (IFREQ(I,J),J=1,NG1)     FREQ0360
0043          DO 132 I=2, LAST1                                       FREQ0370
0044          132 WRITE(6,604) PICH(I,1),PICH(I,2), (IFREQ(I,J),J=1,NG1) FREQ0380
0045          WRITE(6,606) PICH(LAST,1), (IFREQ(LAST,J),J=1,NG1)    FREQ0390
0046          DO 134 I=1, LAST1                                       FREQ0400
0047          DO 134 J=1, NG1                                         FREQ0410
0048          134 IFREQ(LAST,J)=IFREQ(LAST,J)+IFREQ(I,J)            FREQ0420
0049          WRITE(6,608)      (IFREQ(LAST,J),J=1,NG1)             FREQ0430
0050          RETURN                                                FREQ0440

```

LINE NO.

STATEMENT

0051	600	FORMAT(40H1***** TABLE 6; FREQUENCY DISTRIBUTION	FREQ00450
0052	1	//12X,14HCLASS INTERVAL,6X,11(A5,I2,2X))	FREQ00460
0053	602	FORMAT(/14X,4HLESS,F8.3,4X,11(I7,2X))	FREQ00470
0054	604	FORMAT(10X, 2F8.3,4X,11(I7,2X))	FREQ00480
0055	606	FORMAT(10X,F8.3,4X,4H0VER,4X,11(I7,2X))	FREQ00490
0056	608	FORMAT(/13X, 5HTOTAL,12X, 11(I7,2X))	FREQ00500
0057		END	FREQ00510

図 6. つづき

```

                                OKITAC 4500   FORTRAN   SOURCE PROGRAM LIST
                                PAGE 0025

LINE NO.   STATEMENT

0001       SUBROUTINE  PROB                                **  PROB
0002       C .....                                        PROB0000
0003       COMMON  INITEM, ITEM, ITEMX, NDATA, FNDATA, NCATG, NCATGX, NSELS  COMMON00
0004       1      ,NGROUP, NSQL, NHF, NBUFF, XNAME(20), SELNAM(20)          COMMON01
0005       2      ,INCATG(20), JCATG(20), ISEL(20), ISTART(21), LOSI(20)    COMMON02
0006       3      ,CROSSI(40), CROSS(40,40), H(40,40), V(40,40), NGJK(40,10) COMMON03
0007       DOUBLE PRECISION  XNAME, SELNAM                                PROB0010
0008       DIMENSION  AMEAN(10), SIGMA(10), RATIO(10), NOG(10), XO(10,2)    PROB0020
0009       1      ,KEYXO(10), DIVIDX(10), POINT(10), IBIT(10)             PROB0030
0010       EQUIVALENCE  (CROSS(1,1),AMEAN(1)), (CROSS(1,2),SIGMA(1))      PROB0040
0011       C *****-----                                        PROB0050
0012       WRITE(6,600)                                                    PROB0060
0013       DO 100 I=1, NGROUP                                               PROB0070
0014       MCROS=NCATGX*I                                                  PROB0080
0015       RATIO(I)=CROSSI(MCROS)/FNDATA                                    PROB0090
0016       100  NOG(I)=1                                                    PROB0100
0017       MG=NGROUP-1                                                     PROB0110
0018       DO 102 I=1, MG                                                  PROB0120
0019       II=I+1                                                           PROB0130
0020       DO 104 J=II, NGROUP                                             PROB0140
0021       IF(AMEAN(J) .GT. AMEAN(I))  GO TO 104                          PROB0150
0022       WS1=AMEAN(I)                                                     PROB0160
0023       AMEAN(I)=AMEAN(J)                                                PROB0170
0024       AMEAN(J)=WS1                                                     PROB0180
0025       WS1=SIGMA(I)                                                    PROB0190
0026       SIGMA(I)=SIGMA(J)                                               PROB0200
0027       SIGMA(J)=WS1                                                    PROB0210
0028       WS1=RATIO(I)                                                    PROB0220
0029       RATIO(I)=RATIO(J)                                               PROB0230
0030       RATIO(J)=WS1                                                    PROB0240
0031       NWS1=NOG(I)                                                     PROB0250
0032       NOG(I)=NOG(J)                                                  PROB0260
0033       NOG(J)=NWS1                                                     PROB0270
0034       104  CONTINUE                                                    PROB0280
0035       102  CONTINUE                                                    PROB0290
0036       KEYANS=0                                                         PROB0300
0037       DO 110 I=1, MG                                                  PROB0310
0038       VARI=SIGMA(I)*SIGMA(I)                                          PROB0320
0039       VARII=SIGMA(I+1)*SIGMA(I+1)                                     PROB0330
0040       A=1./VARI - 1./VARII                                             PROB0340
0041       B=2.*(AMEAN(I+1)/VARI1 - AMEAN(I)/VARI)                         PROB0350
0042       CT=RATIO(I)*SIGMA(I+1)/(RATIO(I+1)*SIGMA(I))                   PROB0360
0043       IF(CT .LE. 0.)                                                  GO TO 112                          PROB0365
0044       C=AMEAN(I)*AMEAN(I)/VARI-AMEAN(I+1)*AMEAN(I+1)/VARII-2.0*ALOG(CT) PROB0370
0045       D=B*B-4.*A*C                                                     PROB0380
0046       IF(D .LT. 0.)                                                  GO TO 112                          PROB0390
0047       XO(I,1)=(-B+SQRT(D))/(A+A)                                       PROB0400
0048       XO(I,2)=(-B-SQRT(D))/(A+A)                                       PROB0410
0049       KEYXO(I)=0                                                       PROB0420
0050       GO TO 110                                                         PROB0430

```

LINE NO.	STATEMENT	
0051	112 KEYX(1)=-1	PROB0440
0052	KEYANS=-1	PROB0450
0053	110 CONTINUE	PROB0460
0054	IF(KEYANS .LE. -1) GO TO 990	PROB0470
0055	MCOMB=0	PROB0480
0056	PRMAX=-1.	PROB0490
0057	DO 120 I=1, MG	PROB0500
0058	120 DIVDX(I)=X0(I,1)	PROB0510
0059	N=2**MG	PROB0520
0060	DO 122 I=1, N	PROB0530
0061	11=I-1	PROB0540
0062	M=MG	PROB0550
0063	DO 124 J=1, MG	PROB0560
0064	1BIT(M)=MOD(11,2)	PROB0570
0065	IF(1BIT(M) .EQ. 0) 1BIT(M)=2	PROB0580
0066	M=M-1	PROB0590
0067	124 11=11/2	PROB0600
0068	DO 126 J=1, MG	PROB0610
0069	K=1BIT(J)	PROB0620
0070	126 POINT(J)=X0(J,K)	PROB0630
0071	IF(NGROUP .EQ. 2) GO TO 130	PROB0640
0072	DO 128 J=2, MG	PROB0650
0073	IF(POINT(J-1) .GT. POINT(J)) GO TO 138	PROB0660
0074	128 CONTINUE	PROB0670
0075	130 CALL NO((POINT(1)-AMEAN(1))/SIGMA(1), Q1)	PROB0680
0076	PR=RATIO(1)*(1. - Q1)	PROB0690
0077	IF(NGROUP .EQ. 2) GO TO 134	PROB0700
0078	DO 132 J=2, MG	PROB0710
0079	CALL NO((POINT(J-1)-AMEAN(J))/SIGMA(J), Q2)	PROB0720
0080	CALL NO((POINT(J)-AMEAN(J))/SIGMA(J), Q3)	PROB0730
0081	132 PR=PR+RATIO(J)*(Q2-Q3)	PROB0740
0082	134 CALL NO((POINT(MG)-AMEAN(NGROUP))/SIGMA(NGROUP), Q4)	PROB0750
0083	PR=PR+RATIO(NGROUP)*Q4	PROB0760
0084	IF(PR .LE. PRMAX) GO TO 122	PROB0770
0085	PRMAX=PR	PROB0780
0086	DO 136 J=1, MG	PROB0790
0087	136 DIVDX(J)=POINT(J)	PROB0800
0088	GO TO 122	PROB0810
0089	138 MCOMB=MCOMB+1	PROB0820
0090	122 CONTINUE	PROB0830
0091	IF(MCOMB .EQ. N) GO TO 995	PROB0840
0092	WRITE(6,602) PRMAX	PROB0850
0093	DO 140 J=1, MG	PROB0860
0094	WRITE(6,604) NOG(J),NOG(J+1), DIVDX(J)	PROB0870
0095	H(J,1)=-100.	PROB0880
0096	H(J,2)=NOG(J)	PROB0890
0097	140 H(J,3)=DIVDX(J)	PROB0900
0098	H(NGROUP,2)=NOG(NGROUP)	PROB0910
0099	RETURN	PROB0920
0100	600 FORMAT(/////51H ***** TABLE 6-1; CLASSIFICATION ON DISTRIBUTION	PROB0930

図 6. つづき

LINE NO.	STATEMENT	PAGE
	OKITAC 4500 FORTRAN SOURCE PROGRAM LIST	0027
0101	1 //15X,26HCLASSIFICATION PROBABILITY)	PROB0940
0102	602 FORMAT(1H+,41X,2H =,F7.3/)	PROB0950
0103	604 FORMAT(/15X,28HFREQUENCY DISTRIBUTION GROUP,13,15H BETWEEN GROUP	PROB0960
0104	1 ,13, 9H DIVIDES,F10.4)	PROB0970
0105	C ERROR COMMENTS	PROB0980
0106	990 WRITE(6,690)	PROB0990
0107	690 FORMAT(1H+,41X,12HCAN NOT FIND)	PROB1000
0108	DO 991 J=1, MG	PROB1010
0109	IF(KEYX0(J) .EQ. -1) WRITE(6,692) NOG(J),NOG(J+1)	PROB1020
0110	991 CONTINUE	PROB1030
0111	692 FORMAT(15X,43H(BECAUSE THE DIVIDING POINT ON DISTRIBUTION,13,2X	PROB1040
0112	1 ,7HBETWEEN,13,11H NOT FIND))	PROB1050
0113	GO TO 999	PROB1060
0114	995 WRITE(6,694)	PROB1070
0115	694 FORMAT(1H+,42X,12HCAN NOT FIND/ 15X,28H(BECAUSE THE DIVIDING POINT	PROB1080
0116	1 ,36H ON DISTRIBUTIONS ARE NOT ASCENDING))	PROB1090
0117	GO TO 999	PROB1100
0118	END	PROB1110

LINE NO.	STATEMENT		
0001	SUBROUTINE NQ(U,Q)	**	NO
0002	C	NO	0000
0003	C COMPUTATION OF UPPER PROBABILITY OF NORMAL DISTRIBUTION	NO	0010
0004	DATA K/28/, S/-1./, B/3./	NO	0020
0005	C ****-----	NO	0030
0006	Y=ABS(U)	NO	0040
0007	Y2=Y*Y	NO	0050
0008	Z=EXP(-0.5*Y2)*0.3989422800	NO	0060
0009	Q=0.	NO	0070
0010	FJ=K	NO	0080
0011	IF(Y.LE. 8) GO TO 3	NO	0090
0012	DO 2 I=1, K	NO	0100
0013	Q=FJ/(Y+Q)	NO	0110
0014	2 FJ=FJ-1.	NO	0120
0015	Q=Z/(Y+Q)	NO	0130
0016	GO TO 5	NO	0140
0017	3 DO 4 I=1, K	NO	0150
0018	Q=FJ*Y2/(2.*FJ+1.+S*Q)	NO	0160
0019	S=-S	NO	0170
0020	4 FJ=FJ-1.	NO	0180
0021	Q=0.5-Z*Y/(1.-Q)	NO	0190
0022	5 IF(U.LT. 0.) Q=1.-Q	NO	0200
0023	RETURN	NO	0210
0024	END	NO	0220

図6. つづき

```

OKITAC 4500 FORTRAN SOURCE PROGRAM LIST PAGE 0029

LINE NO. STATEMENT

0001 SUBROUTINE CLASS ** CLASS
0002 C ..... CLASS0000
0003 COMMON INITEM, ITEM, ITEMX, NDATA, FNDATA, NCATG, NCATGX, NSELS COMMON00
0004 1 ,NGROUP, NSOL, NHF, NBUFF, XNAME(20), SELNAM(20) COMMON01
0005 2 ,INCATG(20), JCATG(20), ISEL(20), ISTART(21), LOSI(20) COMMON02
0006 3 ,CROSSII(40), CROSS(40,40), H(40,40), V(40,40), NGJK(40,10) COMMON03
0007 DOUBLE PRECISION XNAME, SELNAM CLASS0010
0008 DIMENSION MGROUP(12), ESTM(12,10), LPBUFF(5,3) CLASS0020
0009 C ****----- CLASS0030
0010 KEY=0 CLASS0040
0011 MG=NGROUP-1 CLASS0050
0012 DO 100 I=1, MG CLASS0060
0013 IF(H(1,1) .EQ. -100.) KEY=KEY+1 CLASS0070
0014 100 CONTINUE CLASS0080
0015 IF(KEY .LT. MG) GO TO 999 CLASS0090
0016 WRITE(6,600) CLASS0100
0017 REWIND MTESTM CLASS0110
0018 N=0 CLASS0120
0019 NLPB=0 CLASS0130
0020 DO 110 I=1, NDATA, MBUFF CLASS0140
0021 READ(MTESTM) (MGROUP(K), (ESTM(K,J), J=1, NSOL), K=1, NBUFF) CLASS0150
0022 DO 112 K=1, NBUFF CLASS0160
0023 A=ESTM(K,1) CLASS0170
0024 N=N+1 CLASS0180
0025 NLPB=NLPB+1 CLASS0190
0026 LPBUFF(NLPB,1)=N CLASS0200
0027 LPBUFF(NLPB,2)=MGROUP(K) CLASS0210
0028 IG=999 CLASS0220
0029 IF(A .LE. H(1,3)) IG=H(1,2) CLASS0230
0030 IF(NGROUP .EQ. 2) GO TO 116 CLASS2440
0031 DO 114 J=2, MG CLASS0250
0032 IF(A .GT. H(J-1,3) .AND. A .LE. H(J,3)) IG=H(J,2) CLASS0260
0033 114 CONTINUE CLASS0270
0034 116 IF(A .GT. H(MG,3)) IG=H(NGROUP,2) CLASS0280
0035 LPBUFF(NLPB,3)=IG CLASS0290
0036 IF(NLPB .LT. 5) GO TO 118 CLASS0300
0037 WRITE(6,602) ((LPBUFF(L,J), J=1,3), L=1, NLPB) CLASS0310
0038 IF(MOD(N,25) .EQ. 0) WRITE(6,604) CLASS0320
0039 NLPB=0 CLASS0330
0040 118 IF(N .GE. NDATA) GO TO 120 CLASS0340
0041 112 CONTINUE CLASS0350
0042 110 CONTINUE CLASS0360
0043 120 IF(NLPB .GT. 0) WRITE(6,602)((LPBUFF(L,J), J=1,3), L=1, NLPB) CLASS0370
0044 999 RETURN CLASS0380
0045 600 FORMAT(51H1***** TABLE 7; CLASSIFICATION BY A SAMPLE SCORE//) CLASS0390
0046 1 5(5X,21HSAMPLE ORIGI CLASSII)/5(7X,19H-NO. -NAL -FIED)/) CLASS0400
0047 602 FORMAT(5(5X, I6, I7, 5H --->, I3)) CLASS0410
0048 604 FORMAT(1H ) CLASS0420
0049 END CLASS0430

```

LINE NO.	STATEMENT	
0001	SUBROUTINE CLASSN	**CLASSN
0002	C	CLAN0000
0003	COMMON INITEM, ITEM, ITEMX, NDATA, FNDATA, NCATG, NCATGX, NSELS	COMMON00
0004	1 ,NGROUP, NSOL, NHF, NBUFF, XNAME(20), SELNAM(20)	COMMON01
0005	2 ,INCATG(20), JCATG(20), ISEL(20), ISTART(21), LOSI(20)	COMMON02
0006	3 ,CROSSII(40), CROSS(40,40), H(40,40), V(40,40), NGJK(40,10)	COMMON03
0007	DOUBLE PRECISION XNAME, SELNAM, SPEL, SPELG	CLAN0010
0008	DIMENSION GROUPX(10,10), MGROUP(12), ESTM(12,10), DIST(10)	CLAN0020
0009	1 ,LPBUFF(5,3)	CLAN0030
0010	DATA SPEL/8HSOLUTION/, SPELG/5HGROUP/	CLAN0040
0011	- C ****-----	CLAN0050
0012	WRITE(6,600) (SPEL, J, J=1, NSOL)	CLAN0060
0013	DO 100 K=1, ITEMX	CLAN0070
0014	IS=ISTART(K)+1	CLAN0080
0015	IE=IS+JCATG(K)-1	CLAN0090
0016	DO 102 I=IS, IE	CLAN0100
0017	NOC=I-ISTART(K)	CLAN0110
0018	IF(NOC .EQ. 1) WRITE(6,602) SELNAM(K),NOC,(V(I,L),L=1,NSOL)	CLAN0120
0019	IF(NOC .GT. 1) WRITE(6,604) NOC,(V(I,L),L=1,NSOL)	CLAN0130
0020	102 CONTINUE	CLAN0140
0021	100 CONTINUE	CLAN0150
0022	DO 110 L=1, NSOL	CLAN0160
0023	DO 112 J=1, NGROUP	CLAN0170
0024	WS=0.	CLAN0180
0025	DO 114 I=1, NCATGX	CLAN0190
0026	114 WS=WS+V(I,L)*FLOAT(NGJK(I,J))	CLAN0200
0027	IGX=NCATGX+J	CLAN0210
0028	112 GROUPX(L,J)=WS/CROSSII(IGX)	CLAN0220
0029	110 CONTINUE	CLAN0230
0030	WRITE(6,610) (SPELG,J, J=1, NGROUP)	CLAN0240
0031	DO 116 L=1, NSOL	CLAN0250
0032	116 WRITE(6,612) L, (GROUPX(L,J),J=1, NGROUP)	CLAN0260
0033	WRITE(6,614)	CLAN0270
0034	NAGREE=0	CLAN0280
0035	N=0	CLAN0290
0036	NLPB=0	CLAN0300
0037	REWIND MTESTM	CLAN0310
0038	DO 120 I=1, NDATA, NBUFF	CLAN0320
0039	READ(MTESTM) (MGROUP(K),(ESTM(K,J),J=1,NSOL),K=1,NBUFF)	CLAN0330
0040	DO 122 K=1, NBUFF	CLAN0340
0041	N=N+1	CLAN0350
0042	DO 124 J=1, NGROUP	CLAN0360
0043	WS=0.	CLAN0370
0044	DO 126 L=1, NSOL	CLAN0380
0045	126 WS=WS+(ESTM(K,L)-GROUPX(L,J))*(ESTM(K,L)-GROUPX(L,J))	CLAN0390
0046	124 DIST(J)=SQRT(WS)	CLAN0400
0047	DO 128 J=1, NGROUP	CLAN0410
0048	IF(J .EQ. 1) GO TO 129	CLAN0420
0049	IF(DISMIN .LT. DIST(J)) GO TO 128	CLAN0430
0050	129 KGROUP=J	CLAN0440

図 6. つづき

LINE NO.	STATEMENT	PAGE 0031
0051	DISMIN=DIS(J)	CLAN0450
0052	128 CONTINUE	CLAN0460
0053	NLPB=NLPB+1	CLAN0470
0054	LPBUFF(NLPB,1)=N	CLAN0480
0055	LPBUFF(NLPB,2)=MGROUP(K)	CLAN0490
0056	LPBUFF(NLPB,3)=KGROUP	CLAN0500
0057	IF(KGROUP.EQ.MGROUP(K)) NAGREE=NAGREE+1	CLAN0510
0058	IF(NLPB.LT.5) GO TO 130	CLAN0520
0059	WRITE(6,616) ((LPBUFF(I,J),J=1,3),I=1,NLPB)	CLAN0530
0060	IF(MOD(N,25).EQ.0) WRITE(6,618)	CLAN0540
0061	NLPB=0	CLAN0550
0062	130 IF(N.EQ.NDATA) GO TO 140	CLAN0560
0063	122 CONTINUE	CLAN0570
0064	120 CONTINUE	CLAN0580
0065	140 IF(NLPB.GT.0) WRITE(6,616) ((LPBUFF(I,J),J=1,3),I=1,NLPB)	CLAN0590
0066	PROB=FLOAT(NAGREE)/FNDDATA	CLAN0600
0067	WRITE(6,620) PROB	CLAN0610
0068	RETURN	CLAN0620
0069	600 FORMAT(50H1***** TABLE 8; CLASSIFICATION BY VECTOR SCORES//	CLAN0630
0070	1. //25X,18H... VECTOR SCORES /// 9X,15HITEM CATEGORY	CLAN0640
0071	2. ,9(2X,A8,I2))	CLAN0650
0072	602 FORMAT(/5X,A8,I11,9F12.5)	CLAN0660
0073	604 FORMAT(13X, I11,9F12.5)	CLAN0670
0074	610 FORMAT(////25X,37H... MEAN SCORE OF GROUP ON SOLUTION	CLAN6680
0075	1. //10X, 8HSOLUTION, 2X,10(4X,A5,I2))	CLAN0690
0076	612 FORMAT(/10X,18,2X,10F11.5)	CLAN0700
0077	614 FORMAT(////25X,29H... CLASSIFICATION ON SAMPLE	CLAN0710
0078	1. //5(5X,21HSAMPLE ORIGI CLASSI)	CLAN0720
0079	2. / 5(7X,19H-NO. -NAL -FIED)/)	CLAN0730
0080	616 FORMAT(5(5X,16,17,5H ==>,I3))	CLAN0740
0081	618 FORMAT(1H)	CLAN0750
0082	620 FORMAT(////25X,33H... CLASSIFICATION PROBABILITY =,F7.3)	CLAN0760
0083	END	CLAN0770