研究資料 (Research Material)

酸性雨等の森林生態系への影響モニタリング — 四国地域における高齢林分のモニタリング調査 —

山田 毅^{1)*}・吉永 秀一郎¹⁾・酒井 武²⁾・松村 直人³⁾・酒井 敦²⁾・田淵 隆一⁴⁾・
小谷 英司²⁾・稲垣 善之²⁾・倉本 恵生²⁾・三浦 覚⁵⁾・篠宮 佳樹²⁾・都築 伸行²⁾・
今富 裕樹⁶⁾・門田 春夫²⁾・大黒 正⁷⁾

Monitoring of Acidic Precipitation's Effects on Forest Ecosystems -Monitoring of four old-age-stands in the Shikoku area-

YAMADA Tsuyoshi^{1)*}, YOSHINAGA Shuichiro¹⁾, SAKAI Takeshi²⁾, MATSUMURA Naoto³⁾,
SAKAI Atsushi²⁾, TABUCHI Ryuichi⁴⁾, KODANI Eiji²⁾, INAGAKI Yoshiyuki²⁾,
KURAMOTO Shigeo²⁾, MIURA Satoru⁵⁾, SHINOMIYA Yoshiki²⁾, TSUZUKI Nobuyuki²⁾,
IMATOMI Yuki⁶⁾, KADOTA Haruo²⁾ and OHGURO Tadashi⁷⁾

Abstract

To clarify the influence of acid deposition on forest ecosystems, we investigated tree census, vegetation, decline index of trees, and soil in four old-age-stands of Sugi and Hinoki in the Shikoku area, according to the manual published by the Japanese Forest Agency that monitors Japan's forest decline caused by acid deposition. We did not observe, however, any decline in the stands caused by acid deposition.

Key words : acid deposition, monitoring, old-age-stand, forest decline, Sugi (*Cryptomeria japonica*), Hinoki (*Chamaecyparis obtusa*)

要旨

酸性雨等が森林生態系へ与える影響を明らかにするため、四国地域に存在する高齢のスギ・ヒノキ林を対象として、酸性雨等森林衰退モニタリング事業実施マニュアルに従い、毎木・植生・衰退度(地上部)及び土壌調査を行った。しかし、調査した4林分において、酸性雨等による樹木の衰退は認められなかった。

キーワード：酸性雨、モニタリング、高齢林分、森林衰退、四国、スギ、ヒノキ

はじめに

森林総合研究所では、酸性雨等が森林生態系に与える影響を評価するため、1990年より全国各地で雨水の観測および実験林分のモニタリングを行ってきた。さらに1995年からは、酸性雨等による森林生態系への影響の早期発見や影響予測に役立てるため、影響が早期に顕在化する可能性があると考えられる森林のモニタリングを全国各地で開始した。

四国地域においても恒常的に酸性雨等が観測されており(Yamada et al., 2001)、森林生態系への影響が顕在化する可能性がある。四国地域は全国に比べ人工林率が高いことから(清水, 1999)、調査対象林分としてスギ・ヒノキの人工林を、またその対照として天然生のスギ・ヒノキ林分を選定した。これらの林分は、いずれも山間地にある高齢の林分である。今回選定した調査地のうちいくつかの林分は、従来より収穫試験地として定期的に

原稿受付：平成16年2月4日 Received Feb. 4, 2004 原稿受理：平成16年6月15日 Accepted June 15, 2004

* (現所属) 国際農林水産業研究センター林業部 〒305-8686 茨城県つくば市大わし1-1

Forestry Division, Japan International Research Center for Agricultural Sciences, 1-2 Ohwashi, Tsukuba, Ibaraki 305-8686, Japan; e-mail: yamadan@affrc.go.jp

- 1) 森林総合研究所立地環境研究領域 Department of Forest Site Environment, Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI)
- 2) 森林総合研究所四国支所 Shikoku Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI)
- 3) 三重大学生物資源学部 Faculty of Bioresources, Mie University.
- 4) 森林総合研究所多摩森林科学園 Tama Forest Science Garden, Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI)
- 5) 森林総合研究所東北支所 Tohoku Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI)
- 6) 森林総合研究所森林作業研究領域 Department of Forest Operations and Techniques, Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI)
- 7) 元森林総合研究所四国支所 ex-Shikoku Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI)

毎木調査がなされてきた地点であり、収穫試験地設定後の施業履歴が明らかにされている。それらの林分では、今後もモニタリング調査を継続していくことで、森林生態系に対する影響の早期発見や解明が期待される。本報では、各林分で行った酸性雨等の森林生態系への影響調査の結果を報告する。

調査方法

1) 調査地

調査地は、(1)小屋敷天然生スギ択伐林（四国森林管理局安芸森林管理署魚梁瀬事務所東川国有林 54 林班は小班）、(2)白髪山ヒノキ天然林（四国森林管理局嶺北森林管理署白髪山国有林 22 林班は小班）、(3)滑床山スギ人工林（四国森林管理局愛媛森林管理署宇和島森林管理センター滑床山国有林 61 林班の小班）、(4)同ヒノキ人工林（滑床山国有林 72 林班の小班）の 4 林分である (Fig. 1-5, Table 1)。

小屋敷天然生スギ択伐林はスギ、ヒノキ、モミ、ツガ、広葉樹からなる天然生林をスギ主体とする択伐林に誘導

するための施業試験を 1928 年以來行ってきた林分で、現在は天然生のスギ林となっている。この施業試験地内の標高 600m の南西斜面に調査プロットを設定した。

白髪山ヒノキ天然林は、1914 年に学術参考保護林に指定された施業記録のないヒノキ天然林で、調査プロットは、標高 1100m の山腹の緩斜面に設定した。

滑床山調査地では、93 年生のスギ人工林と 97 年生のヒノキ人工林において、スギ林調査プロットは標高 900m の南斜面、ヒノキ林調査プロットは標高 600m の北東斜面に位置する収穫試験地内（小谷・松村，1994）にそれぞれ設定した。

2) 調査方法

調査プロットは各林分において、農林水産省林野庁研究普及課（1997）の酸性雨等森林衰退モニタリング事業実施マニュアルに従い設定し、毎木・植生・衰退度（地上部）及び土壌調査を行った。調査プロットは円形で、その中心点を調査地の原点として決定し、原点を中心に傾斜修正後の面積がそれぞれ 0.1, 0.04, 0.02 ha となるよう大円、中円、小円を設定した。毎木調査は、大円では

Fig.1 調査位置図
Location of the study site

Table 1 調査地の概要
Description of the study site

調査地	小屋敷	白髪	滑床スギ	滑床ヒノキ
Study site	Koyashiki	Shiraga	Nametoko-Sugi	Nametoko-Hinoki
地籍	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬	高知県本山町瓜生野	愛媛県宇和島市滑床	愛媛県宇和島市滑床
Cadastal name	Yanase, Umaji., Kochi	Uriuno, Motoyama, Kochi	Nametoko, Uwajima, Ehime	Nametoko, Uwajima, Ehime
位置	Location	Location	Location	Location
	33° 39' 01" N 134° 06' 20" E	33° 48' 39" N 133° 34' 54" E	33° 11' 54" N 132° 36' 58" E	33° 11' 55" N 132° 39' 24" E
標高	Altitude (m)	Altitude (m)	Altitude (m)	Altitude (m)
	600	1,100	900	600
斜面方位	Slope direction	Slope direction	Slope direction	Slope direction
	S 10° W	N 45° W	S	N 45° E
傾斜角	Inclination (°)	Inclination (°)	Inclination (°)	Inclination (°)
	38	5	20-30	20-35
地質	Geology	Geology	Geology	Geology
	頁岩 中生界 (四万十帯) Shale, Mesozoic Shimanto belt	結晶片岩・蛇紋岩 Crystalline schist, Serpentine	第三紀花崗岩 Granite	砂岩 (白亜紀南予層群) Sand-stone, Cretaceous Nanyo group
地位指数	Site index	Site index	Site index	Site index
	-	-	18	13
林齢	Forest age	Forest age	Forest age	Forest age
	280	200 - 300	93	97
林相	Forest type	Forest type	Forest type	Forest type
	Natural forest	Natural forest	Conifer plantation	Conifer plantation

Fig. 2 調査位置図 (小屋敷天然生スギ択伐林)
 Location of the study site in Koyashiki

1/25,000 土佐魚梁瀬
 Tosayanase

Fig. 5 調査位置図 (滑床山ヒノキ人工林)
 Location of the study site in Nametoko Hinoki

1/25,000 松丸
 Matsumaru

Fig. 3 調査位置図 (白髪山ヒノキ天然林)
 Location of the study site in Shiraga

1/25,000 本山
 Motoyama

Fig. 4 調査位置図 (滑床山スギ人工林)
 Location of the study site in Nametoko Sugi

1/25,000 宇和島
 Uwajima

胸高直径 18 cm 以上の全個体、中円では胸高直径 4 cm 以上の全個体、小円では樹高 1.3 m 以上の全個体を調査対象として胸高直径と代表木の樹高を測定した。植生調査は、小円部に生育する樹高 1.3 m 未満の樹木、草本、シダ植物について、種名と優占度を調査したほか、中円・大円部分で初めて出現した種名を記載した。衰退度調査は、中心点から東西南北 4 方向に 12 m 離れた地点の上層木 5 個体、計 20 本を原則的に選定し、山家 (1978) の指標をもとにした林野庁・酸性雨等森林衰退モニタリング事業の評価基準 (Fig. 6) に従って、樹形と樹勢から評価した。土壌調査は森林総合研究所森林環境部立地環境科 (1997) に従い、土壌断面形態を観察・記載した。土壌調査時には、前述の事業実施マニュアルに従い、調査地内に 18 m × 18 m の平方区画を設け、その区画の内部を 6 m メッシュに区分した (Fig. 7)。表層土の試料は、6 m メッシュの交点 (16 点) において、有機物層 (A₀ 層) の試料は、18 m 平方区画外周の 4 点および中心の原点で、50 cm × 50 cm の範囲内にあるものを採取した。採取した表層土の試料は、原則として風乾後 pH 値の測定に供した。A₀ 層の試料は、絶乾重量を求めた。

結果

(1) 小屋敷スギ択伐林

本林分は、上木層でスギの優占する択伐林型の林となっていた (Table 2)。上木層を構成するスギは樹高 30 m 以上に達し、スギ、ヒノキが中層を占め、ウラジロガシ、サカキなどが混交していた。低木層ではサカキ、シキミなど常緑広葉樹が優占しているが、スギ・ヒノキの更新木の割合も高い。高さ 1.3 m 以下の下層植生は、シキミ・サカキ・ハイノキ等が優占していた。上層木であるスギ・ヒノキに、際だった衰退は認められなかった (Table 3, Photo. 1)。調査地の土壌は、土じょう部 (1976) に従

測定項目	衰 退 度				
	0	1	2	3	4
樹 勢	旺盛な生育状態を示し被害が全くみられない	いくぶんの被害の影響を受けているが、あまりめだたない	異常が明らかに認められる	成育状態が劣悪で回復の見込みがない	枯死
Vigorousness of tree	vigor and none of sign of decline	with a bit of damage but insensible	obvious damaged	remarkable wrong and no expectation of recovery	dead
樹 形	自然樹形を保っている	若干の乱れはあるが、自然樹形に近い	自然樹形の崩壊がかなり進んでいる	自然樹形が完全に崩壊され、奇形化している	枯死または枯死寸前
Tree shape	native tree shape	nearly native shape and sometimes with a bit of collapse	collapse of native shape	perfect collapse of native shape and odd	dead or nearly dead

Fig. 6 樹木衰退度の判定基準
Criterion of the decline index of tree

農林水産省林野庁研究普及課 (1997) を改変
This figure was quoted from Research and Extension Division, Forestry Agency, the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan in 1997.

Fig. 7 土壌試料の採取地点
Sampling points of the soil

うと乾性弱ポドゾル化土壌 P_{bIII}であった (Table 4)。また、表層土の pH(H₂O)は、3.59 - 4.92 の値を示した (Table 4)。5 地点における A₀ 層の現存量はそれぞれ、0.61 - 1.32 (平均 1.03) kg m⁻²であった。なお、小屋敷山スギ林に

関する毎木・植生・衰退度・土壌の各調査結果とその結果概要は、Appendix 1 ~ 7 に示した。

小屋敷調査地から約 2 km 離れた魚梁瀬千本山保護林では、高知営林局によって定期的に毎木調査が行われている。高知営林局 (1998) による調査によれば、針葉樹の林分材積はほとんどの調査プロットで増加しており、樹齢を考えれば現在も旺盛な成長をしているとされており、衰退の徴候は認められない。

(2) 白髪山ヒノキ天然林

本林分は上木層でヒノキが優占 (BA 比 75%) し、ツガが混交していた (Table 5)。上木層の高さは約 25 m に達していた。中層ではツガ、ヤマグルマが多く、低木層はシロモジ、シャクナゲなどの優占度が高かった。下層植生は、特に土壌の発達した部分でスズタケが優占しており、他にツルシキミ・スゲの優占度が高かった。衰退度調査の結果から衰退を示す顕著なものは認められなかった (Table 3, Photo. 2)。調査地の土壌は、土じょう部 (1976) に従うと乾性ポドゾル P_{D1}であった (Table 4)。表層土 (風乾土) の pH (H₂O) は、3.31 - 4.43 の値を示し、酸性度の強い地点もみられた。また、5 地点における A₀ 層の現存量は、2.60 - 5.67 (平均 4.21) kg m⁻²であった。なお、白髪山ヒノキ林に関する毎木・植生・衰退度・土壌の各調査結果とその結果概要は、Appendix 8 ~ 14 に示した。

Table 2 小屋敷山スギ林の種組成
Description of the stand for each size class in Koyashiki

種名	Species name	DBH > 18cm		4cm < DBH < 18cm		DBH < 4cm, H > 130cm	
		No. of stems (ha ⁻¹)	Baſal area (m ² ha ⁻¹)	No. of stems (ha ⁻¹)	Baſal area (m ² ha ⁻¹)	No. of stems (ha ⁻¹)	Baſal area (m ² ha ⁻¹)
スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	190	33.442	475	3.473	800	0.336
ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	130	4.603	675	5.295	150	0.070
モミ	<i>Abies firma</i>	40	1.563	175	0.864		
ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	10	0.330	25	0.033	50	0.001
ツクバネガシ	<i>Quercus sessilifolia</i>	10	0.324	75	0.130		
ユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i>	10	0.260			50	0.002
ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i>			150	0.810	200	0.008
ホオノキ	<i>Magnolia obovata</i>			25	0.567		
サカキ	<i>Cleyera japonica</i>			50	0.245	1000	0.074
ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i>			25	0.091	50	0.001
ハゼノキ	<i>Rhus succedanea</i>			25	0.059		
シキミ	<i>Illicium anisatum</i>					1000	0.061
ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i>					300	0.024
ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i>					100	0.013
ハイノキ	<i>Symplocos myrtacea</i>					100	0.007
ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i>					50	0.003
イヌガシ	<i>Neolitsea aciculata</i>					50	0.003
ヤブニッケイ	<i>Cinnamomum japonicum</i>					100	0.002
ヒイラギ	<i>Osmanthus heterophyllus</i>					50	0.001
計		390	40.522	1700	11.567	4050	0.605

Table 3 各林分の衰退度
Decline level of each study site

衰退度 Decline Level	調査地 study site							
	小屋敷 Koyashiki		白髪 Shiraga		滑床スギ Nametoko-Sugi		滑床ヒノキ Nametoko-Hinoki	
	種名 (Species)	No.	種名 (Species)	No.	種名 (Species)	No.	種名 (Species)	No.
0	スギ (<i>Cryptomeria japonica</i>)	15	ヒノキ (<i>Chamaecyparis obtusa</i>)	16	スギ (<i>Cryptomeria japonica</i>)	30	ヒノキ (<i>Chamaecyparis obtusa</i>)	20
	ヒノキ (<i>Chamaecyparis obtusa</i>)	4	ツガ (<i>Tsuga sieboldii</i>)	2				
1	ヒノキ (<i>Chamaecyparis obtusa</i>)	1	ヒノキ (<i>Chamaecyparis obtusa</i>)	2				
2								
3								
調査本数計 (number of investigation samples)		20		20		30		20

Table 4 各調査地の酸性度と有機物量
Acidity and amount of organic matter of the study site

調査地 Study site	小屋敷 Koyashiki	白髪 Shiraga	滑床スギ Nametoko-Sugi	滑床ヒノキ Nametoko-Hinoki
土壌型 soil classification*	P _{D III}	P _{D I}	B _D	B _D (d)
酸性度 pH (n=16)	3.59 - 4.92	3.31 - 4.43	3.70 - 4.77	4.27 - 5.72
有機物量 (A ₀ 層) organic matter (mean) (n=5)	0.61 - 1.32 (1.03) kg m ⁻²	2.60 - 5.67 (4.21) kg m ⁻²	1.24 - 2.28 (1.79) kg m ⁻²	0.63 - 2.37 (1.34) kg m ⁻²

*: 土じょう部 (1976) による分類

*: Soil classification by Forest Soil Division (1976)

Table 5 白髪山ヒノキ林の種組成
Description of the stand for each size class in Shiraga

種名	Species name	DBH > 18cm		4cm < DBH < 18cm		DBH < 4cm, H > 130cm	
		No. of stems (ha ⁻¹)	Baſal area (m ² ha ⁻¹)	No. of stems (ha ⁻¹)	Baſal area (m ² ha ⁻¹)	No. of stems (ha ⁻¹)	Baſal area (m ² ha ⁻¹)
ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	240	42.056	70	0.442		
ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	110	10.762	200	1.956	50	0.023
ホオノキ	<i>Magnolia obovata</i>	10	0.724				
タムシバ	<i>Magnolia salicifolia</i>	20	0.634				
コナラ	<i>Quercus serrata</i>	10	0.489				
ナンゴクミネカエデ	<i>Acer australe</i>	10	0.413			10	0.006
モミ	<i>Abies firma</i>	10	0.328	20	0.041	10	0.003
ヤマグルマ	<i>Trochodendron aralioides</i>	10	0.271	90	0.842	30	0.026
イヌツゲ	<i>Ilex crenata</i>			70	0.764		
ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i>			40	0.467	20	0.013
アセビ	<i>Pieris japonica</i>			40	0.350	30	0.015
リョウブ	<i>Clethra barbinervis</i>			20	0.306	20	0.016
ネジキ	<i>Lyonia ovalifolia</i>			40	0.279	20	0.001
タンナサワフタギ	<i>Symplocos coreana</i>			40	0.231		
ホンシャクナゲ	<i>Rhododendron degronianum</i>			70	0.182	100	0.044
コハウチワカエデ	<i>Acer sieboldianum</i>			20	0.150		
ミズメ	<i>Betula grossa</i>			10	0.089		
アカシデ	<i>Carpinus laxiflora</i>			10	0.085		
ヤマウルシ	<i>Rhus trichocarpa</i>			10	0.051		
シロモジ	<i>Lindera triloba</i>					160	0.050
コガクウツギ	<i>Hydrangea luteo-venosa</i>					50	0.011
アクシバ	<i>Vaccinium japonicum</i>					20	0.002
ナナカマド	<i>Sorbus commixta</i>					20	0.006
アオハダ	<i>Illex macropoda</i>					10	0.008
計		420	55.677	750	6.234	550	0.224

(3) 滑床スギ人工林

スギ植栽木の平均樹高は 30.9 m、平均胸高直径は 52.6 cm、密度は 290 本 ha⁻¹ であった。上木層はすべて植栽木のスギで占められていた (Table 6)。低木層にはガクウツギが非常に多く、下層植生にはソヨゴ・サルトリイバラ・ミヤマシキミなどがみられた。衰退を示す個体は全く認められなかった (Table 3, Photo. 3)。土壌は、土じょう部 (1976) に従うと、適潤性褐色森林土 B_D に分類された (Table 4)。表層土 (生土) の pH (H₂O) は、3.70 - 4.77 であり、やや酸性度が強い部分もみられた。A₀ 層の現存量は、1.24 - 2.28 (平均 1.79) kg m⁻² であった。なお、滑床山スギ林に関する毎木・植生・衰退度・土壌の各調査結果とその結果概要は、Appendix 15 ~ 20 に示した。

滑床スギ林の林分材積は、間伐直後の 1992 年には 874 m³ ha⁻¹、1999 年は 979 m³ ha⁻¹ であり (松村ら, 2001)、林分の成長が続いている。

(4) 滑床ヒノキ人工林

植栽されたヒノキの平均樹高は 27.8 m で、平均胸高直径は 42.6 cm、密度は 520 本 ha⁻¹ であった。上木層はすべて植栽されたヒノキで占められ、低木層にはシロ

ダモが多く、その他にヤブムラサキ・シキミ・サカキ等がみられた (Table 7)。下層植生には、コガクウツギ・サンショウ・ヤブムラサキ等が出現した。衰退を示す個体は全くみられなかった (Table 3, Photo. 4)。土壌は、土じょう部 (1976) に従うと、適潤性褐色森林土 (偏乾亜型) B_D (d) に分類された (Table 4)。表層土 (生土) の pH (H₂O) は、4.27 - 5.72 であった。A₀ 層の現存量は、0.63 - 2.37 (平均 1.34) kg m⁻² であった。なお、滑床山ヒノキ林に関する毎木・植生・衰退度・土壌の各調査結果とその結果概要は、Appendix 21 ~ 26 に示した。

滑床ヒノキ林では、1990 年の材積は 788 m³ ha⁻¹、間伐直後の 1991 年には 583 m³ ha⁻¹、1999 年の材積は 806 m³ ha⁻¹ であり (小谷・松村, 1994; 松村ら, 2001)、現在も林分が成長していることわかる。

まとめ

今回調査を行った小屋敷・白髪・滑床の各林分では、酸性雨等によると思われる顕著な森林衰退現象は認められなかった (Table 3)。しかし、滑床ヒノキ林以外の林分では、土壌表層の pH 値が、4.0 を下回る酸性度の強い地点も見受けられた (Table 4)。特に今回調査した林

Table 6 滑床スギ林の種組成
Description of the Sugi plantation for each size class in Nametoko

種名	Species name	DBH > 18cm		4cm < DBH < 18cm		DBH < 4cm, H > 130cm	
		No. of stems (ha ⁻¹)	Baſal area (m ² ha ⁻¹)	No. of stems (ha ⁻¹)	Baſal area (m ² ha ⁻¹)	No. of stems (ha ⁻¹)	Baſal area (m ² ha ⁻¹)
スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	290	64.315				
ガクウツギ	<i>Hydrangea scandens</i>					6050	0.118
カナクギノキ	<i>Lindera erythrocarpa</i>					250	0.045
ハイノキ	<i>Symplocos myrtacea</i>					500	0.018
ケクロモジ	<i>Lindera sericea</i>					250	0.010
ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i>					500	0.010
ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i>					150	0.005
コバノガマズミ	<i>Viburnum erosum var. punctatum</i>					100	0.005
ナガバモミジイチゴ	<i>Rubus palmatus</i>					50	0.002
サカキ	<i>Cleyera japonica</i>					50	0.001
シラキ	<i>Sapium sebiferum</i>					50	0.001
計		290	64.315	0	0	7950	0.214

Table 7 滑床ヒノキ林の種組成
Description of the Hinoki plantation for each size class in Nametoko

種名	Species name	DBH > 18cm		4cm < DBH < 18cm		DBH < 4cm, H > 130cm	
		No. of stems (ha ⁻¹)	Baſal area (m ² ha ⁻¹)	No. of stems (ha ⁻¹)	Baſal area (m ² ha ⁻¹)	No. of stems (ha ⁻¹)	Baſal area (m ² ha ⁻¹)
ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	520	62.812				
シロダモ	<i>Neolitsea sericea</i>					4700	0.605
シキミ	<i>Illicium anisatum</i>					2150	0.139
サカキ	<i>Cleyera japonica</i>					1200	0.060
ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i>					850	0.030
ハイノキ	<i>Symplocos myrtacea</i>					1150	0.029
ヤブニッケイ	<i>Cinnamomum japonicum</i>					150	0.024
ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i>					350	0.021
バリバリノキ	<i>Listea acuminata</i>					50	0.016
ミツマタ	<i>Edgeworthia chrysantha</i>					50	0.009
タブノキ	<i>Machilus thunbergii</i>					100	0.005
ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i>					50	0.000
計		520	62.812	0	0	10800	0.939

分は、すべて高齢林分であるため、その影響が比較的顕在化しやすいと考えられることから、今後も定期的に調査を行い、モニタリングを継続していく必要がある。

引用文献

- 高知営林局 (1998) 魚梁瀬千本山保護林調査報告 (第三次植生調査), 魚梁瀬千本山保護林調査報告, 90p.
- 小谷英司・松村直人 (1994) 滑床山スギ・ヒノキ人工林収獲試験地の調査結果, 森林総研四国支年報, 35, 30-31.
- 松村直人・小谷英司 (1994) スギ択伐天然更新試験地の成長過程, 森林総研四国支年報, 35, 38-41.
- 松村直人・小谷英司・都築伸行 (2001) 高齢級間伐とスギ・ヒノキ人工林の成長解析—滑床山スギ、ヒノキ、下ル川山ヒノキ、西ノ川山ヒノキ試験地の成長経過—, 森林総研四国支年報, 41, 33-36.
- 日本の地質「四国地方」編集委員会編 (1991) 日本の地質 8 四国地方, 共立出版, 266p.
- 農林水産省林野庁研究普及課 (1997) 酸性雨等森林衰退モニタリング事業実施マニュアル 第2期用, 31p.
- 酒井武・倉本恵生・酒井敦・田淵隆一・島村雄三 (1998) 白髪山のヒノキ林の林分構造, 日林論, 109, 327-328.
- 清水徹朗 (1999) 日本の森林・林業と林業労働力問題—高齢化の現状と担い手確保の課題—, 農林金融, 52 (4), 50-61.
- 森林総合研究所森林環境部立地環境科 (1997) 土壌断面記載ガイドライン第3版 (改訂版), 57p.
- Yamada, T., Yoshinaga, S., Morisada, K. and Hirai, K. (2001) Sulfate and Nitrate Loads on a Forest Ecosystem in Kochi in Southwest of Japan, Water, Air, Soil Pollut., 130, 1115-1120.
- 山家義人 (1978) 都市域における環境悪化の指標としての樹木衰退と微生物相の変動, 林試研報, 301, 119-129.

Photo. 1 樹冠開空度(小屋敷)
Crown projection in Koyashiki

Photo. 2 樹冠開空度(白髪)
Crown projection in Shiraga

Photo. 3 樹冠開空度 (滑床スギ)
 Crown projection in Nametoko (Sugi)

Photo. 4 樹冠開空度 (滑床ヒノキ)
 Crown projection in Nametoko (Hinoki)

Appendix 1 調査林分総括表
Summary of the study site

高知県 (Kochi Prefecture)

調査地名 (1/2.5 万地形図図名) : 土佐魚梁瀬
Study area (1:25,000 topographic map area name) : Tosa Yanase

地籍名 (市町村・字名等) : 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬
Cadastral name (municipal name) : Yanase, Umaji Village, Aki Country, Kochi Prefecture

位置 (Location) 33° 39' 01" N 134° 06' 20" E

既存調査事例 (Precedent study)

四国支所経営研究室による調査 (天然更新試験地)
(The investigation to the Natural Regeneration Experimental Site
was carried out by Forest Management Lab, Shikoku Research Center)

* : 詳細は, 平成 5 年度四国支所年報 35 : 38-41 を参照
(*: refer to the Annual Report of Shikoku Research Center, Vol.35 p 38-41, 1993)

施業歴 (Stand management record)

1925 調査地の設定と 1 回目の間伐 (Set up of the experimental site and 1st thinning)
1967 2 回目の間伐 (2nd thinning)
1993 本数で 15%・材積で 27% (スギ) の第 3 回目間伐
(3rd thinning: 15% for stem ratio or 27% for volume ratio for *Cryptomeria japonica*)
本数で 9%・材積で 25% (ヒノキ) の第 3 回目間伐
(3rd thinning: 9% for stem ratio or 25% for volume ratio for *Chamaecyparis obtusa*)

* : 一部は天然更新・それ以外の場所はスギを補植
(*: partially regeneration naturally, others are planted)

概況調査 (Site survey: 30th Oct. - 1st Nov. 1996)

標高 (Elevation) 600 m
傾斜方位 (Slope direction) S10° W
傾斜角度 (Slope inclination) 38°
地質 (Geological structure) 中生界 四万十帯 (Mesozoic Shimanto belt)
地位指数 (Site index)
林齢 (Stand age) 280 年以上 (more than 280 years)
林型 (Stand type) 天然林 (Natural forest)

毎木調査 (Complete enumeration)

最高樹高 (Maximum height) 34.6 m
最大胸高直径 (Maximum DBH) 97.9 cm
胸高断面積計 (Basal area) 53.74 m²/ha
ha 当たり材積 (Stem volume per hectare) 494.77 m³/ha
ha 当たり本数 (Number per hectare) 6110 本/ha (すべて)
上層木 30 本の平均樹高 (Mean height for upper layer: n=30) 18.72 m
上層木 30 本の平均胸高直径 (Mean DBH for upper layer: n=30) 34.45 cm

衰退度調査 (Declination investigation)

地上部衰退度調査 (Declination investigation for above-ground part: 31st Oct. 1996)
衰退度 0 (Declination rate 0) : 19 本 (95%)
衰退度 1 (Declination rate 1) : 1 本 (5%) *: n=20

地下部衰退度調査 (Declination investigation for underground part)
調査せず (No survey)

Appendix 2 毎木調査表 (魚梁瀬, 小円)
Tree profile in the small circle plot in Yanase

個体番号	種名	胸高直径	樹高	個体番号	種名	胸高直径	樹高		
Ind. NO	Species name	DBH (cm)	height (m)	Ind. NO	Species name	DBH (cm)	height (m)		
1	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	9.8	12.4	62	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	0.3	1.4
2	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	14.3	13.6	63	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	0.9	1.8
3	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	19.0	15.8	64	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	0.7	2.1
4	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	16.7	12.9	65	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	0.4	1.4
5	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	6.6	7.7	66	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	0.4	1.5
6	イヌガシ	<i>Neolitsea aciculata</i>	0.8	1.8	67	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	0.9	1.7
7	ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i>	0.7	2.0	68	ユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i>	0.7	1.5
8	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	0.9	1.7	69	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	1.0	2.2
9	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0.5	1.4	70	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	0.7	1.8
10	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	16.7	14.0	71	ヤブニツケイ	<i>Cinnamomum japonicum</i>	0.6	1.7
11	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	10.2	12.3	72	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	0.7	1.6
12	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	6.7	7.2	73	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	7.5	9.5
13	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	20.2	15.9	74	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	1.0	1.8
14	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	12.9	15.4	75	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	0.7	1.5
15	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	16.0	13.5	76	ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i>	0.5	1.6
16	ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i>	0.9	2.1	77	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	0.6	1.5
17	ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i>	0.6	1.8	78	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	0.5	1.3
18	ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i>	0.5	1.4	79	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	0.8	1.8
19	ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i>	0.8	1.5	80	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	4.3	4.5
20	ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i>	12.9	10.7	81	ヤブニツケイ	<i>Cinnamomum japonicum</i>	0.4	1.5
21	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	1.9	2.6	82	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	19.8	18.9
22	ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i>	9.0	9.8	83	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	2.7	4.2
23	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	20.1	14.2	84	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	5.0	5.4
24	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	2.1	2.6	85	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	0.8	1.9
25	ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i>	0.4	1.4	86	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	0.9	2.0
26	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0.6	1.5	87	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	5.0	6.0
27	ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i>	0.4	1.4	88	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	2.8	3.8
28	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	0.7	1.8	89	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	0.5	1.5
29	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	0.4	1.3	90	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	1.9	2.9
30	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0.5	1.4	91	ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	20.5	14.0
31	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	14.9	10.4	92	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	2.2	2.9
32	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	27.9	17.8	93	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	7.0	1.8
33	ハイノキ	<i>Symplocos myrtaea</i>	0.7	2.1	94	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	1.1	1.8
34	モミ	<i>Abies firma</i>	7.1	7.1	95	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0.9	1.7
35	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	0.4	1.5	96	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	18.8	15.3
36	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	0.8	1.8	97	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	1.1	2.0
37	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	9.4	10.3	98	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	1.5	2.1
38	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	7.8	1.3	99	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	3.0	3.6
39	モミ	<i>Abies firma</i>	4.0	3.9	100	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	9.1	6.3
40	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	1.0	2.1	101	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	7.1	6.9
41	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	1.3	2.2	102	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	2.2	3.0
42	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	1.0	1.9	103	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	0.9	1.6
43	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	1.0	2.0	104	ヒイラギ	<i>Osmanthus heterophyllus</i>	0.5	1.5
44	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0.8	1.4	105	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	12.8	10.6
45	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	0.4	1.4	106	ハイノキ	<i>Symplocos myrtaea</i>	1.1	2.8
46	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	9.6	10.8	107	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	1.1	1.9
47	ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i>	1.8	2.8	108	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	3.4	3.4
48	ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i>	0.9	2.2	109	モミ	<i>Abies firma</i>	6.4	5.3
49	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	0.4	1.4	110	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	19.6	17.7
50	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	0.7	1.7	111	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	2.9	3.6
51	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	8.8	7.6	112	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	3.7	4.0
52	モミ	<i>Abies firma</i>	4.0	3.7	113	ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i>	1.9	2.6
53	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	31.9	22.1	114	ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i>	0.4	1.6
54	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	5.5	6.4	115	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	8.9	12.1
55	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	9.8	14.1	116	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	3.6	4.8
56	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	21.5	13.0	117	ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i>	1.2	1.5
57	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	0.5	1.6	118	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	2.6	3.6
58	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	0.9	2.2	119	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	2.8	3.7
59	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	1.5	2.7	120	ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i>	0.4	1.5
60	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	0.8	2.0	121	ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	0.5	1.5
61	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	0.4	1.4	122	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	1.1	1.6

Appendix 3 毎木調査表 (魚梁瀬, 中円)
Tree profile in the middle-sized circle plot in Yanase

個体番号 種名	胸高直径	樹高	個体番号 種名	胸高直径	樹高
Ind. NO	DBH (cm)	height (m)	Ind. NO	DBH (cm)	height (m)
201 ユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i>	18.2 11.2	225 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	4.6 6.2
202 ホオノキ	<i>Magnolia obovata</i>	17.0 13.0	226 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	10.0 7.0
203 モミ	<i>Abies firma</i>	12.1 10.9	227 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	13.8 13.6
204 モミ	<i>Abies firma</i>	8.5 9.3	228 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	9.2 9.7
205 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	26.3 16.5	229 ハゼノキ	<i>Rhus succedanea</i>	5.5 10.1
206 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	7.2 7.1	230 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	27.6 18.8
207 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	36.0 22.6	231 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	6.6 6.6
208 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	27.5 20.5	232 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	4.3 5.0
209 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	18.0 14.9	233 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	4.1 5.4
210 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	18.9 15.8	234 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	17.0 17.4
211 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	11.7 10.3	235 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	24.0 17.0
212 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	4.5 5.7	236 ツクバネガシ	<i>Quercus sessilifolia</i>	5.0 8.2
213 モミ	<i>Abies firma</i>	8.4 8.7	237 ツクバネガシ	<i>Quercus sessilifolia</i>	5.0 7.8
214 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	20.4 15.2	238 ツクバネガシ	<i>Quercus sessilifolia</i>	4.0 7.7
215 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	5.4 5.2	239 ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i>	6.8 9.4
216 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	9.9 9.7	240 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	15.4 14.7
217 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	4.9 4.7	241 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	8.3 11.4
218 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	10.9 11.1	242 サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	8.7 7.8
219 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	13.1 9.9	243 ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i>	9.7 13.1
220 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	19.0 13.2	244 ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i>	7.2 12.3
222 ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	4.1 4.7	245 ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i>	5.4 10.8
223 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	43.6 21.7	246 ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i>	4.2 7.3
224 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	5.1 5.1	247 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	8.8 9.3

Appendix 4 毎木調査表 (魚梁瀬, 大円)
Tree profile in the large circle plot in Yanase

個体番号 種名	胸高直径	樹高	個体番号 種名	胸高直径	樹高
Ind. NO	DBH (cm)	height (m)	Ind. NO	DBH (cm)	height (m)
301 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	26.6 15.7	311 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	70.5 30.5
302 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	21.1 13.6	312 モミ	<i>Abies firma</i>	21.8 10.8
303 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	55.9 24.8	313 モミ	<i>Abies firma</i>	23.0 12.9
304 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	20.3 14.6	314 モミ	<i>Abies firma</i>	22.4 11.9
305 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	21.8 16.8	315 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	25.8 12.9
306 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	97.9 33.5	316 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	59.6 26.9
307 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	21.8 14.5	317 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	20.4 15.8
308 モミ	<i>Abies firma</i>	22.0 11.7	318 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	90.3 34.6
309 スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	62.9 31.9	319 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	22.0 16.2
310 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	18.8 8.9	320 ツクバネガシ	<i>Quercus sessilifolia</i>	20.3 12.8

Appendix 5 植生調査表 (魚梁瀬)
Flora list of the Koyashiki study site in Yanase

(小円部 200 m² 内)

Inner the small circle (200 m²)

種名	Species name	被度	Coverage
シキミ	<i>Illicium anisatum</i>	2	
サカキ	<i>Cleyera japonica</i>	2	
ハイノキ	<i>Symplocos myrtacea</i>	2	
イヌガシ	<i>Neolitsea aciculata</i>	1	
クロバイ	<i>Symplocos prunifolia</i>	1	
ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i>	1	
ヒイラギ	<i>Osmanthus heterophyllus</i>	1	
ヤブニッケイ	<i>Cinnamomum japonicum</i>	+	
ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i>	+	
ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i>	+	
ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i>	+	
ツクバネガシ	<i>Quercus sessilifolia</i>	+	
サルトリイバラ	<i>Smilax china</i>	+	
ヘクソカズラ	<i>Paederia scandens</i>	+	
コガクウツギ	<i>Hydrangea luteo-venosa</i>	+	
クロモジ	<i>Lindera umbellata</i>	+	
アセビ	<i>Pieris japonica</i>	+	
ヤマウルシ	<i>Rhus trichocarpa</i>	+	
シダ sp	<i>Pteridophyte sp.</i>	+	

(中円部で初めて出現した植物名)

Species which are appeared in the middle-sized circle

なし Nothing

(大円部で初めて出現した植物名)

Species which are appeared in the large circle

種名	Species name
オンツツジ	<i>Rhododendron weyrichii</i>

Appendix 6 衰退度調査表 (魚梁瀬)
Declination investigation of above-ground part in Yanase

個体番号	樹種	Species name	樹勢	樹形
Ind. No.			tree vigor	tree form
303	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0	0
302	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0	0
301	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0	0
A	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0	0
B	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0	0
210	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0	0
307	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	0	1
214	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0	0
209	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0	0
208	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0	0
235	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	0	0
234	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	0	0
230	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0	0
316	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0	0
315	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	0	0
220	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	0	0
310	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0	0
223	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0	0
311	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0	0
309	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	0	0

Appendix 7 土壌調査表

Soil profile description sheet

- 111 断面番号 (Profile number) 魚梁瀬小屋敷山 (Koyashikiyama in Yanase) 143 植生 (Vegetation) スギ (*Cryptomeria japonica*)
- 113 調査年月日 (Date) 1996.11.1 下層植生については別表参照 (see appendix 5.)
- 114 調査者氏名 (Authors) 山田・吉永・三浦・松村・小谷・倉本 (Yamada, Yoshinaga, Miura, Matsumura, Kodani, Kuramoto)
- 116 調査地点 (Location) 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 (Yanase, Umaji Village, Aki Country, Kochi Prefecture) 151 母材 (Parent Material) 頁岩 (Shale)
- 117 標高 (Elevation) 約 600 m
- 118 図幅 (Map sheet number) 土佐魚梁瀬 (Tosa Yanase) 166 その他 (Other surface characteristics) スギ・シダの葉など 70% 程度の被覆 (L)
- 119 緯度・経度 (Coordinates) 33° 39' 01" N, 134° 06' 20" E (leaves of Sugi, fern 70% covered L layer)
- 121 林野土壌分類 P_b III 平衡斜面・ほ行土 L: 2 cm, F: 3 cm, H: 1 cm
- 135 傾斜と斜面形 (Slope: slope, form) 傾斜 (slope) 38° S10° W L, H 菌糸散見 (L, H hypha occasionally)

Horizon	Boundary	Soil Color	Text- Class	Rock fragment			Structure		Hardness		Root		Mycorrhiza Hypha	Moisture conditions
				Shp	Wth	Nat	Grd	Size	Typ	Y. method	Abd	Siz		
B	12 C	7.5 or 10YR 4/4	C	total <5%	A	F	C	MO	SB	15	5 - 10%	> 20 mm		湿 (wet)
2A	20 G	10YR 3/4	C	total 5-10%	A	F	C	MO	GR	軟 (soft)	5 - 10%	2-20 mm 10 - 20% < 2 mm		湿 (wet)
2Bs	42 G	7.5YR 6/6	C	total 5-10%	A	F	S	WE	SB	12	5 - 10%	> 20 mm		湿 (wet)
2Bw	64 G	10YR 6/6	C	total 60% A	A	F	C	MO	GR	軟 (soft)	5 - 10%	2-20 mm < 2 mm		湿 (wet)
2CB	100+	10YR 6/3	SC	total 70% A	A	F	B			14	< 5%	> 20 mm		湿 (wet)
					A	F	C			軟 (soft)	< 5%	2-20 mm < 2 mm		湿 (wet)

Appendix 8 調査林分総括表
 Summary of the study site

高知県 (Kochi Prefecture)

調査地名 (1/2.5 万地形図図名) : 本山

Study area (1:25,000 topographic map area name) : Motoyama

地籍名 (市町村・字名等) : 高知県長岡郡瓜生野七戸

Cadastral name (municipal name) : Uryuuno nananohe, Nagaoka Country, Kochi Prefecture

位置 (Location) 33° 48' 39" N 133° 34' 54" E

既存調査事例 (Precedent study)

昭和6年 10/3 - 10/26,
 1,200 ~ 1,400 m の等高線に沿って、環状のベルトトランセクト調査
 (The investigation by the transect method along the contour from 1,200 to 1,400 m
 3rd - 26th Oct. in 1931)

施業歴 (Stand management record) なし (nothing)

概況調査 (Site survey: 28th and 29th Oct. 1997)

標高 (Elevation) 1,100 m
 傾斜方位 (Slope direction) N45° W
 傾斜角度 (Slope inclination) 5° 前後 (approximately)
 地質 (Geological structure) 結晶片岩・蛇紋岩 (Crystalline schist, Serpentine)
 地位指数 (Site index)
 林齢 (Stand age) 200 - 300 年 (year)
 林型 (Stand type) 天然林 (Natural forest)

毎木調査 (Complete enumeration)

最高樹高 (Maximum height) 31.0 m
 最大胸高直径 (Maximum DBH) 85.3 cm
 胸高断面積計 (Basal area) 61.84 m²/ha
 ha 当たり材積 (Stem volume per hectare) 572.5 m³/ha
 ha 当たり本数 (Number per hectare) 1,838 本/ha
 上層木 30 本の平均樹高 (Mean height for upper layer: n=30) 23.8 m
 上層木 30 本の平均胸高直径 (Mean DBH for upper layer: n=30) 53.2 cm

衰退度調査 (Declination investigation)

地上部衰退度調査 (Declination investigation for above-ground part: 29th Oct. 1997)

衰退度 0 (Declination rate 0) : 18 本 (90%)
 衰退度 1 (Declination rate 1) : 2 本 (10%) * : n=20

地下部衰退度調査 (Declination investigation for underground part)

調査せず (No survey)

Appendix 9 毎木調査表(白髪, 小円)
Tree profile in the small circle plot in Shiraga

個体番号 種名	胸高直径	樹高	個体番号 種名	胸高直径	樹高		
Ind. NO	DBH (cm)	height (m)	Ind. NO	DBH (cm)	height (m)		
126 ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	18.1	14.1	216 ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	6.6	6.0
137 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	48.2	23.9	217 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	56.8	23.6
138 ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	42.0	24.0	218 シロモジ	<i>Lindera triloba</i>	3.2	3.8
139 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	44.8	27.1	219 シロモジ	<i>Lindera triloba</i>	2.4	3.3
140 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	65.1	31.0	220 シロモジ	<i>Lindera triloba</i>	1.5	2.8
141 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	9.1	8.4	221 シロモジ	<i>Lindera triloba</i>	1.5	2.5
142 ヤマグルマ	<i>Trochodendron aralioides</i>	5.0	6.4	222 シロモジ	<i>Lindera triloba</i>	0.6	1.1
146 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	47.5	29.8	223 シロモジ	<i>Lindera triloba</i>	0.5	3.1
212 モミ	<i>Abies firma</i>	1.8	1.8	224 シロモジ	<i>Lindera triloba</i>	1.7	2.8
213 ヤマグルマ	<i>Trochodendron aralioides</i>	3.9	3.6	225 ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	69.2	25.1
214 シロモジ	<i>Lindera triloba</i>	2.4	3.6	226 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	56.9	23.6
215 ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	4.9	5.3	233 ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	10.7	10.5

Appendix 10 毎木調査表(白髪, 中円)
Tree profile in the middle-sized circle plot in Shiraga

個体番号 種名	胸高直径	樹高	個体番号 種名	胸高直径	樹高		
Ind. NO	DBH (cm)	height (m)	Ind. NO	DBH (cm)	height (m)		
57 ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	10.0	8.9	151 ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	6.1	6.1
69 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	26.3	26.9	159 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	23.8	21.6
117 アセビ	<i>Pieris japonica</i>	10.7	9.8	160 ホンシャクナゲ	<i>Rhododendron degronianum</i>	5.8	6.9
127 アセビ	<i>Pieris japonica</i>	2.9	4.3	161 ホンシャクナゲ	<i>Rhododendron degronianum</i>	3.9	5.3
128 アセビ	<i>Pieris japonica</i>	3.0	4.4	193 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	21.1	14.9
129 アセビ	<i>Pieris japonica</i>	1.3	2.2	195 リョウブ	<i>Clethra barvinervis</i>	3.8	5.3
131 ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	19.0	11.5	207 シロモジ	<i>Lindera triloba</i>	1.8	3.0
132 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	59.3	23.9	208 ミズメ	<i>Betula grossa</i>	10.7	12.8
133 ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i>	8.8	8.9	209 ホンシャクナゲ	<i>Rhododendron degronianum</i>	2.6	3.9
134 ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i>	1.8	2.9	210 ホンシャクナゲ	<i>Rhododendron degronianum</i>	2.9	4.2
135 ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i>	1.0	1.7	211 ホンシャクナゲ	<i>Rhododendron degronianum</i>	2.0	3.2
136 ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	14.4	11.7	227 ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	31.2	18.4
143 ヤマグルマ	<i>Trochodendron aralioides</i>	10.1	9.5	228 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	46.4	22.2
144 ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	31.4	16.7	230 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	20.1	14.5
145 ヤマグルマ	<i>Trochodendron aralioides</i>	2.3	3.5	231 ヤマグルマ	<i>Trochodendron aralioides</i>	18.6	11.3
148 ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	16.3	10.1	232 ヤマグルマ	<i>Trochodendron aralioides</i>	15.7	11.3
149 ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	18.2	13.6	234 ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>	15.0	12.0
150 ヤマグルマ	<i>Trochodendron aralioides</i>	6.9	7.7				

Appendix 11 毎木調査表(白髪, 大円)
 Tree profile in the large circle plot in Shiraga

個体番号	種名	胸高直径	樹高	個体番号	種名	胸高直径	樹高		
Ind. NO	Species name	DBH (cm)	height (m)	Ind. NO	Species name	DBH (cm)	height (m)		
32	ホンシャクナゲ	Rhododendron degronianum	4.3	5.7	163	ツガ	Tsuga sieboldii	8.0	8.9
33	ホンシャクナゲ	Rhododendron degronianum	2.7	4.1	164	ツガ	Tsuga sieboldii	34.1	5.9
34	ソヨゴ	Ilex pedunculosa	7.2	8.0	179	ツガ	Tsuga sieboldii	5.2	6.3
35	ヤマウルシ	Rhus trichocarpa	8.1	8.5	180	タムシバ	Magnolia salicifolia	18.1	12.2
36	ホンシャクナゲ	Rhododendron degronianum	8.4	8.7	185	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	35.8	20.8
37	ホンシャクナゲ	Rhododendron degronianum	6.5	7.5	186	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	11.6	10.0
38	ツガ	Tsuga sieboldii	6.2	6.1	187	ツガ	Tsuga sieboldii	14.8	10.3
51	シロモジ	Lindera triloba	2.7	4.0	188	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	24.6	18.1
52	シロモジ	Lindera triloba	1.3	2.2	189	ネジキ	Lyonia ovalifolia	9.4	9.2
53	ツガ	Tsuga sieboldii	2.8	3.1	190	ネジキ	Lyonia ovalifolia	4.8	6.1
54	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	33.1	18.2	192	リョウブ	Clethra barbinervis	10.8	9.9
55	ツガ	Tsuga sieboldii	0.8	1.5	197	ホンシャクナゲ	Rhododendron degronianum	1.9	3.1
56	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	62.4	24.3	198	シロモジ	Lindera triloba	3.1	4.5
58	イヌツゲ	Ilex crenata	14.8	8.7	199	シロモジ	Lindera triloba	1.9	3.0
59	リョウブ	Clethra barbinervis	2.4	3.6	201	コハウチワカエデ	Acer sieboldianum	4.2	5.3
60	ナンゴクミネカエデ	Acer australe	22.9	14.5	202	ホンシャクナゲ	Rhododendron degronianum	5.1	6.4
61	ナンゴクミネカエデ	Acer australe	2.9	4.2	203	ホンシャクナゲ	Rhododendron degronianum	4.1	5.6
62	タンナサワフタギ	Symplocos coreana	8.0	8.5	204	ナナカマド	Sorbus commixta	2.2	3.4
63	タンナサワフタギ	Symplocos coreana	5.7	6.9	205	ナナカマド	Sorbus commixta	1.8	3.3
64	タンナサワフタギ	Symplocos coreana	8.7	8.9	206	ホンシャクナゲ	Rhododendron degronianum	1.5	2.4
65	タンナサワフタギ	Symplocos coreana	11.0	9.9	229	ツガ	Tsuga sieboldii	13.7	11.3
66	ツガ	Tsuga sieboldii	27.8	14.8	235	シロモジ	Lindera triloba	2.1	3.3
67	イヌツゲ	Ilex crenata	12.5	8.4	236	ツガ	Tsuga sieboldii	41.8	21.0
68	イヌツゲ	Ilex crenata	15.4	6.9	237	コハウチワカエデ	Acer sieboldianum	13.2	10.8
70	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	19.1	13.8	238	ネジキ	Lyonia ovalifolia	12.5	10.5
71	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	4.1	4.4	239	ヤマグルマ	Trochodendron aralioides	5.4	6.7
72	ツガ	Tsuga sieboldii	3.5	3.8	240	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	30.6	18.2
73	イヌツゲ	Ilex crenata	11.7	8.1	244	シロモジ	Lindera triloba	1.7	2.8
74	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	7.3	9.6	245	シロモジ	Lindera triloba	0.9	1.6
81	イヌツゲ	Ilex crenata	7.8	8.3	246	モミ	Abies firma	20.4	14.6
82	イヌツゲ	Ilex crenata	9.9	9.4	247	タムシバ	Magnolia salicifolia	21.9	13.0
83	コガクウツギ	Hydrangea luteo-venosa	2.1	3.3	248	アカシデ	Carpinus laxiflora	10.4	9.7
84	コガクウツギ	Hydrangea luteo-venosa	2.2	3.4	257	ヤマグルマ	Trochodendron aralioides	14.2	11.1
85	コガクウツギ	Hydrangea luteo-venosa	0.8	1.4	258	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	42.6	21.1
86	コガクウツギ	Hydrangea luteo-venosa	1.4	2.3	259	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	85.3	24.5
87	コガクウツギ	Hydrangea luteo-venosa	1.5	2.5	260	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	43.5	21.3
88	モミ	Abies firma	5.9	5.1	261	アセビ	Pieris japonica	13.4	10.9
89	イヌツゲ	Ilex crenata	8.0	8.4	262	アセビ	Pieris japonica	10.3	9.6
108	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	81.5	25.6	264	アクシバ	Vaccinium japonicum	1.1	1.9
110	ツガ	Tsuga sieboldii	20.1	14.4	265	アクシバ	Vaccinium japonicum	0.9	1.6
111	ツガ	Tsuga sieboldii	15.1	12.0	272	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	7.6	7.3
112	アオハダ	Ilex macropoda	3.2	4.6	276	ヤマグルマ	Trochodendron aralioides	15.4	11.5
114	コナラ	Quercus serrata	25.0	13.6	277	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	12.3	10.5
116	ツガ	Tsuga sieboldii	8.1	7.6	278	ヤマグルマ	Trochodendron aralioides	7.6	8.2
118	アセビ	Pieris japonica	6.9	7.8	279	ヤマグルマ	Trochodendron aralioides	3.6	5.0
119	ツガ	Tsuga sieboldii	10.8	9.5	280	ホンシャクナゲ	Rhododendron degronianum	2.5	3.9
120	ツガ	Tsuga sieboldii	20.3	14.5	284	リョウブ	Clethra barbinervis	16.5	11.8
121	ツガ	Tsuga sieboldii	11.0	9.7	285	ソヨゴ	Ilex pedunculosa	14.1	11.1
122	ツガ	Tsuga sieboldii	10.7	9.5	286	ソヨゴ	Ilex pedunculosa	16.4	11.8
130	モミ	Abies firma	4.2	4.4	287	ホンシャクナゲ	Rhododendron degronianum	1.1	1.9
152	ツガ	Tsuga sieboldii	7.1	6.9	288	ホンシャクナゲ	Rhododendron degronianum	5.0	6.4
153	ネジキ	Lyonia ovalifolia	9.4	9.7	289	ホオノキ	Magnolia obovata	30.4	14.3
154	ネジキ	Lyonia ovalifolia	0.8	1.4	290	ツガ	Tsuga sieboldii	15.6	12.3
155	ネジキ	Lyonia ovalifolia	0.9	1.6	291	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	48.3	22.2
156	ツガ	Tsuga sieboldii	2.1	2.0	292	ホンシャクナゲ	Rhododendron degronianum	1.2	2.0
158	ヒノキ	Chamaecyparis obtusa	8.1	7.7	293	ツガ	Tsuga sieboldii	2.1	2.7
162	ヤマグルマ	Trochodendron aralioides	11.1	7.4					

Appendix 12 植生調査表
Flora list of the Shiraga study site

(小円部 200m²内)

Species in the small circle plot (200 m²)

種名	Species name	被度	Coverage
スズタケ	<i>Sasamorpha borealis</i>		3
ツルシキミ	<i>Sikimia japonica var. intermedia f. repens</i>		2
スゲ	<i>Carex sp.</i>		2
ツルツゲ	<i>Ilex rugosa var. hondoensis</i>		+
ホンシャクナゲ	<i>Rhododendron degronianum</i>		+
ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i>		+
モミ	<i>Abies firma</i>		+

(中円部で初めて出現した植物名)

Species which are appeared in the middle-sized circle plot
なし Nothing

(大円部で初めて出現した植物名)

Species which are appeared in the large circle plot

種名	Species name
ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>
ヒメコマツ	<i>Pinus parviflora</i>
ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i>

Appendix 13 衰退度調査表
Declination investigation of above-ground part in Shiraga

個体番号	樹種	樹冠突出度	樹勢	樹形	総合評価
Ind. NO	Species		tree vigor	tree form	evaluation
260	ヒノキ		0	0	0
258	ヒノキ		0	0	0
259	ヒノキ		0	0	0
227	ツガ		0	0	0
226	ヒノキ		0	0	0
108	ヒノキ		0	0	0
236	ツガ		0	0	0
123	ヒノキ	-	1	0	0
242	ヒノキ		0	0	0
240	ヒノキ	-	0	0	0
69	ヒノキ		0	0	0
56	ヒノキ		0	0	0
70	ヒノキ	-	1	0	0
146	ヒノキ		0	0	0
54	ヒノキ		0	0	0
137	ヒノキ		0	0	0
159	ヒノキ		0	0	0
188	ヒノキ	-	0	0	0
185	ヒノキ		0	0	0
193	ヒノキ		0	0	0

Appendix 15 調査林分総括表 (滑床スギ)
Summary of the study site

愛媛県 (Ehime Prefecture)

調査地名 (1/2.5 万地形図図名) : 宇和島

Study area (1:25,000 topographic map area name) : Uwajima

地籍名 (市町村・字名等) : 愛媛県宇和島市滑床

Cadastral name (municipal name) : Nametoko, Uwajima City, Ehime Prefecture

位置 (Location) 33° 11' 54" N 132° 36' 58" E

既存調査事例 (Precedent study)

四国支所経営研究室による調査

(The investigation in 1931, 1936, 1959, 1969, 1979, 1990, and 1991
was carried out by Forest Management Lab, Shikoku Research Center)

* : 詳細は、平成 5 年度四国支所年報 35 : 30-31 を参照

(*: refer to the Annual Report of Shikoku Research Center, Vol.35 p 30-31, 1993)

施業歴 (Stand management record)

1907 年 植栽 (Plantation)
～ 6 回の下刈り・3 回をつるきり・3 回の間伐
 (weeding 6 times, climber cutting 3 times, thinning 3times)
1931 年 試験地設定 本数で 20%・材積で 15% の第 4 回目間伐
 (Set up of the experimental site
 and 4th thinning: 20% for stem ratio or 15% for volume ratio)
1936 年 本数で 20%・材積で 14% の第 5 回目間伐
 (5th thinning: 20% for stem ratio or 14% for volume ratio)
1992 年 本数で 24%・材積で 17% の第 6 回目間伐
 (6th thinning: 24% for stem ratio or 17% for volume ratio)

概況調査 (Site survey: 4th and 5th Oct. 1999)

標高 (Elevation)	900 m
傾斜方位 (Slope direction)	S
傾斜角度 (Slope inclination)	20-30 °
地質 (Geological structure)	花崗岩 第三系 (Granite, Tertiary)
地位指数 (Site index)	18
林齢 (Stand age)	93 年 (year)
林型 (Stand type)	人工林 (artificial forest)

毎木調査 (Complete enumeration)

最高樹高 (Maximum height)	35.3 m
最大胸高直径 (Maximum DBH)	69.8 cm
胸高断面積計 (Basal area)	64.3 m ² /ha
ha 当たり材積 (Stem volume per hectare)	749.9 m ³ /ha
ha 当たり本数 (Number per hectare)	290 本 /ha
上層木 30 本の平均樹高 (Mean height for upper layer: n=30)	30.9 m
上層木 30 本の平均胸高直径 (Mean DBH for upper layer: n=30)	52.6 cm

衰退度調査 (Declination investigation)

地上部衰退度調査 (Declination investigation for above-ground part: 5th Oct. 1999)
衰退度 0 (Declination rate 0) : 29 本 (100%) * : n=29

よって、衰退度調査表は省略した
(The table of the declination investigation was omitted.)

地下部衰退度調査 (Declination investigation for underground part)
調査せず (No survey)

Appendix 16 毎木調査表 (滑床スギ, 小円)
 Tree profile in the small circle plot in Nametoko

個体番号	種名	胸高直径	樹高	個体番号	種名	胸高直径	樹高
Ind. NO	Species name	DBH (cm)	height (m)	Ind. NO	Species name	DBH (cm)	height (m)
103	スギ	59.4	34.2	1080	ガクウツギ	0.4	1.4
1001	ガクウツギ	0.2	1.3	1081	シラキ	0.4	1.4
1002	ヤブムラサキ	0.2	1.4	1082	ガクウツギ	0.4	1.4
1003	ガクウツギ	0.8	2.0	1083	ガクウツギ	0.5	1.6
1004	ガクウツギ	0.9	1.6	1084	ガクウツギ	0.5	1.5
1005	ガクウツギ	0.4	1.6	1085	ハイノキ	1.0	2.1
1006	ガクウツギ	0.4	1.6	1086	サカキ	0.5	1.4
1007	ガクウツギ	0.4	1.7	1087	ハイノキ	0.2	1.4
1008	ムラサキシキブ	0.3	1.5	1088	ガクウツギ	0.6	1.5
1009	ガクウツギ	0.5	1.7	1089	ガクウツギ	0.2	1.4
1010	ガクウツギ	0.4	1.5	1090	ガクウツギ	0.7	1.8
1011	ガクウツギ	0.8	2.0	1091	ハイノキ	0.7	2.0
1012	ガクウツギ	0.3	1.4	1092	ガクウツギ	0.2	1.3
1013	コバノガマズミ	1.0	1.6	1093	ガクウツギ	0.9	1.9
1014	ガクウツギ	0.9	1.7	1094	ナガバノモミジイチゴ	0.7	1.3
1015	ガクウツギ	0.6	1.6	1095	ヤブムラサキ	0.6	1.9
1016	ヤブムラサキ	0.6	1.7	1096	ガクウツギ	0.2	1.3
1017	ケクロモジ	1.0	2.1	1097	ガクウツギ	0.4	1.5
1018	ガクウツギ	0.4	1.6	1098	ハイノキ	0.7	2.0
1019	ガクウツギ	0.5	1.4	1099	ガクウツギ	0.3	1.5
1020	ガクウツギ	0.5	1.6	1100	カナクギノキ	2.0	2.8
1021	ガクウツギ	0.5	1.5	1101	ガクウツギ	0.3	1.4
1022	カナクギノキ	1.2	2.4	1102	ガクウツギ	0.4	1.7
1023	カナクギノキ	2.1	2.4	1103	ガクウツギ	0.7	1.7
1024	ヤブムラサキ	0.4	1.8	1104	ガクウツギ	0.6	1.3
1025	ガクウツギ	0.3	1.4	1105	ガクウツギ	0.4	1.4
1026	ガクウツギ	0.6	1.7	1106	ガクウツギ	0.3	1.4
1027	ケクロモジ	1.1	2.4	1107	ガクウツギ	0.6	1.7
1028	ケクロモジ	0.3	1.6	1108	ガクウツギ	0.4	2.0
1029	ガクウツギ	0.7	1.8	1109	ガクウツギ	0.4	1.4
1030	ヤブムラサキ	0.9	1.8	1110	ガクウツギ	0.5	1.7
1031	ガクウツギ	0.3	1.6	1111	ガクウツギ	0.3	1.5
1032	ハイノキ	1.0	2.3	1112	ガクウツギ	0.4	1.6
1033	カナクギノキ	0.9	2.0	1113	ガクウツギ	0.4	1.4
1034	ガクウツギ	0.7	2.0	1114	ガクウツギ	0.5	2.0
1035	ヤブムラサキ	0.4	1.5	1115	ガクウツギ	0.4	1.6
1036	ガクウツギ	0.3	1.5	1116	ガクウツギ	0.4	1.5
1037	ガクウツギ	0.6	1.8	1117	ガクウツギ	0.4	1.7
1038	ガクウツギ	0.7	2.4	1118	ガクウツギ	0.3	1.4
1039	ガクウツギ	0.4	1.4	1119	ガクウツギ	0.4	1.7
1040	ガクウツギ	0.6	1.8	1120	ハイノキ	0.5	1.6
1041	ガクウツギ	0.5	1.5	1121	ガクウツギ	0.4	1.6
1042	ガクウツギ	0.6	1.6	1122	ガクウツギ	0.4	1.3
1043	ガクウツギ	0.5	1.7	1123	ガクウツギ	0.3	1.5
1044	ガクウツギ	0.5	1.8	1124	ガクウツギ	0.7	1.7
1045	コバノガマズミ	0.4	1.6	1125	ガクウツギ	0.5	1.6
1046	ヤブムラサキ	0.3	1.5	1126	ガクウツギ	0.4	1.5
1047	ケクロモジ	0.3	1.4	1127	ガクウツギ	0.5	1.9
1048	ガクウツギ	0.5	1.7	1128	ガクウツギ	0.2	1.3
1049	ヤブムラサキ	0.4	1.7	1129	ハイノキ	0.8	1.8
1050	ヤブムラサキ	0.4	1.4	1130	ガクウツギ	0.5	1.6
1051	ガクウツギ	0.2	1.3	1131	ケクロモジ	0.5	1.3
1052	ガクウツギ	0.3	1.5	1132	ガクウツギ	0.4	1.5
1053	ガクウツギ	0.2	1.3	1133	ガクウツギ	0.2	1.3
1054	ガクウツギ	0.4	1.4	1134	ハイノキ	0.5	1.7
1055	ガクウツギ	0.3	1.4	1135	ガクウツギ	0.6	1.6
1056	ガクウツギ	0.4	1.4	1136	ガクウツギ	0.5	1.7
1057	ガクウツギ	0.4	1.6	1137	ガクウツギ	0.5	1.9
1058	ガクウツギ	0.2	1.3	1138	ガクウツギ	0.5	1.5
1059	ガクウツギ	0.3	1.5	1139	ガクウツギ	0.5	1.7
1060	ガクウツギ	0.5	1.8	1140	ガクウツギ	0.4	1.5
1061	カナクギノキ	0.9	1.3	1141	ガクウツギ	0.8	1.5
1062	ガクウツギ	0.7	2.0	1142	ガクウツギ	0.5	1.3
1063	ガクウツギ	0.7	2.0	1143	ガクウツギ	0.4	1.6
1064	ガクウツギ	0.5	1.6	1144	ガクウツギ	0.8	2.0
1065	ガクウツギ	0.5	1.5	1145	ハイノキ	0.5	1.5
1066	ガクウツギ	0.8	2.0	1146	ガクウツギ	0.7	1.8
1067	ガクウツギ	0.5	1.4	1147	ガクウツギ	0.6	1.8
1068	ハイノキ	0.3	1.3	1148	ヤブムラサキ	0.4	1.6
1069	ガクウツギ	0.2	1.4	1149	ガクウツギ	0.4	1.5
1070	ガクウツギ	0.2	1.4	1150	ガクウツギ	1.2	2.0
1071	ガクウツギ	0.4	1.7	1151	ムラサキシキブ	1.0	1.6
1072	ガクウツギ	0.5	1.5	1152	ガクウツギ	0.5	1.6
1073	ガクウツギ	0.4	1.4	1153	ガクウツギ	0.5	1.6
1074	ガクウツギ	0.4	1.6	1154	ガクウツギ	0.4	1.4
1075	ガクウツギ	0.4	1.4	1155	ガクウツギ	0.4	1.4
1076	ガクウツギ	0.2	1.4	1156	ガクウツギ	0.4	1.6
1077	ガクウツギ	0.5	1.6	1157	ムラサキシキブ	0.3	1.4
1078	ガクウツギ	0.4	1.4	1158	ガクウツギ	0.4	1.4
1079	ガクウツギ	0.4	1.5	1159	ガクウツギ	0.4	1.6

Appendix 17 毎木調査表 (滑床スギ, 中円)
Tree profile in the middle-sized circle plot in Nametoko

個体番号	種名	胸高直径	樹高
Ind. NO	Species name	DBH (cm)	height (m)
101	スギ <i>Cryptomeria japonica</i>	54.0	30.7
104	スギ <i>C. japonica</i>	57.4	31.0

Appendix 18 毎木調査表 (滑床スギ, 大円)
Tree profile in the large circle plot in Namatoko

個体番号	種名	胸高直径	樹高
Ind. NO	Species name	DBH (cm)	height (m)
11	スギ <i>Cryptomeria japonica</i>	42.5	29.7
12	スギ <i>C. japonica</i>	45.8	30.1
13	スギ <i>C. japonica</i>	54.4	30.8
14	スギ <i>C. japonica</i>	47.0	30.2
17	スギ <i>C. japonica</i>	69.8	31.7
18	スギ <i>C. japonica</i>	44.0	29.9
23	スギ <i>C. japonica</i>	55.0	30.8
24	スギ <i>C. japonica</i>	51.0	30.5
27	スギ <i>C. japonica</i>	60.4	31.2
28	スギ <i>C. japonica</i>	39.5	29.4
97	スギ <i>C. japonica</i>	38.2	29.2
99	スギ <i>C. japonica</i>	49.5	30.4
109	スギ <i>C. japonica</i>	50.5	30.5
111	スギ <i>C. japonica</i>	51.8	33.2
112	スギ <i>C. japonica</i>	58.8	35.3
114	スギ <i>C. japonica</i>	55.8	30.9
117	スギ <i>C. japonica</i>	53.4	30.7
273	スギ <i>C. japonica</i>	63.0	31.3
275	スギ <i>C. japonica</i>	51.3	30.5
369	スギ <i>C. japonica</i>	51.7	30.6
375	スギ <i>C. japonica</i>	59.0	31.1
377	スギ <i>C. japonica</i>	42.9	29.8
378	スギ <i>C. japonica</i>	68.0	28.0
380	スギ <i>C. japonica</i>	42.5	29.9
381	スギ <i>C. japonica</i>	54.5	31.8
382	スギ <i>C. japonica</i>	53.6	31.8

Appendix 19 植生調査表

Flora list of the Nametoko study site (Japanese cedar stand)

(小円部 200m²内)

Inner the small circle (200 m²)

種名	Species name	被度	Coverage
ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i>		+
サルトリイバラ	<i>Smilax china</i>		+
ミヤマシキミ	<i>Skimmia japonica</i>		+
ツタウルシ	<i>Rhus ambigua</i>		+
ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i>		+
ヤブニッケイ	<i>Cinnamomum japonicum</i>		+
ハマクサギ	<i>Premna microphylla</i>		+
ジュウモンジシダ	<i>Polystichum tripterum</i>		+
シモバシラ	<i>Keiskea japonica</i>		+

(中円部で初めて出現した植物名)

Species which are appeared in the middle-sized circle

種名	Species name
シロモジ	<i>Lindera triloba</i>
ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i>
サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i>

(大円部で初めて出現した植物名)

Species which are appeared in the large circle

種名	Species name
タケニグサ	<i>Macleaya cordata</i>
タンナサワフタギ	<i>Symplocos coreana</i>
イボタノキ	<i>Ligustrum obtusifolium</i>

Appendix 20 土壌調査表 (滑床スギ)
Soil profile description sheet in Nametoko Sugi

- 111 断面番号 (Profile number) 滑床スギ 1 (Nametoko Sugi 1)
 113 調査年月日 (Date) 991005
 114 調査者氏名 (Authors) 山田・稲垣・吉永・松村・都築・小谷・今富・門田 (Yamada, Inagaki, Yoshinaga, Matsumura, Tsuzuki, Kodani, Inatomi, Kadota)
 116 調査地点 (Location) 愛媛県宇和島市滑床 (Nametoko, Uwajima City, Ehime Prefecture)
 117 標高 (Elevation) 約 900 m
 118 図幅 (Map sheet number) 宇和島 (Uwajima)
 119 緯度・経度 (Coordinates) 33° 11' 54" N 132° 36' 58" E
 121 林野土壌分類 (Forest Soil Division, 1976) B_b
- 135 傾斜と斜面形 (Slope: slope, form) 傾斜 (slope) 20-30°
 斜面全体の方向 (direction of slope) S
- 143 植生 (Vegetation) スギ (*Cryptomeria japonica*)
 下層植生については別表参照 (see appendix 19.)
- 166 その他 (Other surface characteristics) スギの葉・枝 雑木の葉など (litter of Sugi and leaves etc)
 L: 2-3 cm, F: 1-2 cm

Horizon	Boundary		Soil Color		Text- Class	Rock fragment				Structure			Hardness		Root		Mycorrhiza Hypha	Moisture conditions
	Depth	Dst	Tpg	Spg		Abd	Shp	Wth	Nat	Siz	Grd	Size	Typ	Y. method	Abd	Siz		
A1	10	C	S	7.5YR 4/3	C	C	A	F	C	ST	ME	SB	5	C	VF	occasionally	潤 (moist)	
A2	31	C	S	7.5YR 4/3	C	C	A	F	C	MO	ME	SB	16	F	VF		潤 (moist)	
BC	70+	C	7.5YR 5/6	C	C	A	A	F	S	MO	CO	SB	(13-19)	V	F		湿 (wet)	
						M	A	F	B	MO	VC	SB	堅 (hard)	V	M			
						L	A	F	S	MO	SB	軟 (soft)	V	C				

Appendix 21 調査林分総括表 (滑床ヒノキ)
Summary of the study site

愛媛県 (Ehime Prefecture)

調査地名 (1/2.5 万地形図図名) : 松丸

Study area (1:25,000 topographic map area name) : Matsumaru

地籍名 (市町村・字名等) : 愛媛県宇和島市滑床

Cadastral name (municipal name) : Nametoko, Uwajima City, Ehime Prefecture

位置 (Location) 33° 11' 55" N 132° 39' 24" E

既存調査事例 (Precedent study)

四国支所経営研究室による調査

(The investigation in 1931, 1936, 1942, 1947, 1954, 1959, 1969, 1979, 1990, and 1991 was carried out by Forest Management Lab, Shikoku Research Center)

* : 詳細は, 平成 5 年度四国支所年報 35 : 30-31 を参照

(*: refer to the Annual Report of Shikoku Research Center, Vol.35 p 30-31, 1993)

施業歴 (Stand management record)

1902 年 植栽 (Plantation)

~ 8 回の下刈り・4 回のつるきり・3 回の間伐
(weeding 8 times, climber cutting 4 times, thinning 3 times)

1931 年 試験地設定 本数で 27%・材積で 16% の第 4 回目間伐

(Set up of the experimental site and 4th thinning: 27% for stem ratio or 16% for volume ratio)

1980 年 試験地内に林道敷設

(Forest road construction in the experimental site)

1991 年 本数で 34%・材積で 27% の第 5 回目間伐

(5th thinning: 34% for stem ratio or 27% for volume ratio)

概況調査 (Site survey: 10th Oct. 1999)

標高 (Elevation)	600 m
傾斜方位 (Slope direction)	NE
傾斜角度 (Slope inclination)	20-35 °
地質 (Geological structure)	砂岩 白亜系南予層群 (Sand-stone, Cretaceous Nanyo group)
地位指数 (Site index)	13
林齢 (Stand age)	97 年 (year)
林型 (Stand type)	人工林 (artificial forest)

毎木調査 (Complete enumeration)

最高樹高 (Maximum height)	30.1 m
最大胸高直径 (Maximum DBH)	60.5 cm
胸高断面積計 (Basal area)	62.8 m ² /ha
ha 当たり材積 (Stem volume per hectare)	743.4 m ³ /ha
ha 当たり本数 (Number per hectare)	520 本 /ha
上層木 30 本の平均樹高 (Mean height for upper layer: n=30)	27.8 m
上層木 30 本の平均胸高直径 (Mean DBH for upper layer: n=30)	42.6 cm

衰退度調査 (Declination investigation)

地上部衰退度調査 (Declination investigation for above-ground part: 6th Oct. 1999)

衰退度 0 (Declination rate 0) : 20 本 (100%) * : n=20

よって, 衰退度調査表は省略した

(The table of the declination investigation was omitted.)

地下部衰退度調査 (Declination investigation for underground part)

調査せず (No survey)

Appendix 22 毎木調査表 (滑床ヒノキ, 小円)
Tree profile in the small circle plot in Nametoko

個体番号	種名	胸高直径	樹高	個体番号	種名	胸高直径	樹高
Ind. NO	Species name	DBH (cm)	height (m)	Ind. NO	Species name	DBH (cm)	height (m)
161	ヒノキ	41.4	27.2	1104	シロダモ	0.4	1.4
162	ヒノキ	44.4	27.8	1105	ヒサカキ	1.1	2.9
163	ヒノキ	32.5	25.0	1106	ヤブムラサキ	0.4	1.4
167	ヒノキ	29.6	24.1	1107	ヒサカキ	0.4	1.5
169	ヒノキ	38.4	26.5	1108	シキミ	0.6	1.7
171	ヒノキ	35.9	25.9	1109	シキミ	0.5	1.6
175	ヒノキ	37.7	26.4	1110	ヤブムラサキ	1.3	2.7
266	ヒノキ	43.5	27.6	1111	ヤブムラサキ	1.3	2.3
271	ヒノキ	40.5	27.0	1112	ヤブムラサキ	1.3	2.8
273	ヒノキ	37.7	29.1	1113	シキミ	0.4	1.5
1001	シロダモ	1.7	2.2	1114	シキミ	1.9	3.0
1002	ミツマタ	1.5	2.4	1115	シロダモ	0.7	1.7
1003	シロダモ	0.8	2.0	1116	バリバリノキ	2.0	3.1
1004	シロダモ	0.7	1.4	1117	シロダモ	1.1	2.7
1005	シロダモ	1.6	2.6	1118	シロダモ	0.6	1.7
1006	シロダモ	2.5	3.1	1119	ハイノキ	0.2	1.4
1007	シロダモ	1.4	2.2	1120	ハイノキ	0.2	1.4
1008	シロダモ	0.9	1.7	1121	ハイノキ	0.4	1.6
1009	シロダモ	1.5	2.2	1122	サカキ	0.9	2.1
1010	シロダモ	1.6	3.0	1123	シキミ	0.5	1.5
1011	シロダモ	1.6	2.9	1124	シロダモ	0.7	1.9
1012	ハイノキ	0.6	1.9	1125	シキミ	0.7	1.7
1013	ハイノキ	0.7	1.9	1126	シキミ	0.4	1.4
1014	ヤブツバキ	0.3	1.4	1127	サカキ	0.3	1.3
1015	ハイノキ	0.9	2.0	1128	シキミ	0.6	1.4
1016	ハイノキ	0.3	1.4	1129	シロダモ	0.5	1.6
1017	ハイノキ	0.9	2.1	1130	サカキ	0.3	1.3
1018	ハイノキ	0.7	2.0	1131	ヒサカキ	0.5	1.5
1019	シロダモ	1.7	2.6	1132	シキミ	0.4	1.3
1020	サカキ	0.7	1.7	1133	ヒサカキ	0.4	1.4
1021	ヒサカキ	1.3	2.5	1134	ヒサカキ	0.2	1.3
1022	ハイノキ	0.5	1.7	1135	ハイノキ	0.6	1.8
1023	シロダモ	1.4	2.2	1136	ヒサカキ	0.6	1.9
1024	ヒサカキ	0.6	1.7	1137	シロダモ	1.7	2.6
1025	シロダモ	1.1	1.9	1138	シロダモ	0.9	2.0
1026	シロダモ	0.5	1.6	1139	シロダモ	1.5	2.4
1027	シキミ	0.7	1.8	1140	シロダモ	1.5	2.8
1028	シキミ	0.8	1.8	1141	シロダモ	1.0	2.2
1029	サカキ	0.6	1.6	1142	シロダモ	1.5	2.6
1030	シキミ	0.6	1.6	1143	シロダモ	0.5	1.6
1031	シロダモ	1.5	2.9	1144	ヤブムラサキ	0.2	1.4
1032	シキミ	1.6	2.3	1145	シロダモ	1.2	2.5
1033	シロダモ	1.1	2.2	1146	シロダモ	1.1	2.2
1034	ヒサカキ	0.3	1.4	1147	シキミ	0.5	1.5
1035	ヤブニツケイ	2.0	2.2	1148	サカキ	0.5	1.7
1036	ヤブニツケイ	0.8	1.8	1149	シロダモ	0.7	1.8
1037	シキミ	0.6	1.6	1150	ヤブムラサキ	0.2	1.3
1038	シキミ	0.9	1.8	1151	シキミ	0.7	1.8
1039	ハイノキ	0.5	1.8	1152	シキミ	0.6	1.9
1040	サカキ	0.6	2.0	1153	シキミ	0.4	1.5
1041	サカキ	0.6	1.9	1154	ヒサカキ	0.2	1.4
1042	ヒサカキ	0.3	1.3	1155	ハイノキ	0.2	1.4
1043	サカキ	1.2	2.4	1156	シロダモ	1.9	2.6
1044	シロダモ	1.4	2.1	1157	シロダモ	1.7	2.7
1045	シロダモ	0.3	1.4	1158	シロダモ	1.3	2.5
1046	シロダモ	0.4	1.5	1159	サカキ	0.2	1.3
1047	タブノキ	1.0	2.1	1160	シロダモ	1.4	2.1
1048	シロダモ	1.3	2.2	1161	サカキ	0.7	1.8
1049	ハイノキ	0.6	2.0	1162	ハイノキ	0.2	1.4
1050	サカキ	0.9	2.2	1163	サカキ	0.5	1.5
1051	タブノキ	0.6	2.0	1164	シロダモ	1.1	2.1
1052	シロダモ	0.7	1.6	1165	ヒサカキ	1.1	2.4
1053	シロダモ	0.3	1.5	1166	ヒサカキ	0.7	2.1
1054	サカキ	0.4	1.7	1167	シキミ	0.6	1.8
1055	シロダモ	1.0	2.2	1168	シロダモ	1.6	2.6
1056	ハイノキ	0.4	1.4	1169	シロダモ	2.0	2.6
1057	ハイノキ	0.7	2.0	1170	シキミ	1.4	2.7
1058	サカキ	0.7	1.6	1171	シロダモ	1.3	2.3
1059	シキミ	0.9	2.2	1172	シキミ	1.8	2.2
1060	シキミ	0.9	2.0	1173	シロダモ	1.4	2.7
1061	シキミ	0.5	1.5	1174	シロダモ	1.4	2.6
1062	シロダモ	1.8	2.6	1175	サカキ	1.1	2.3
1063	シロダモ	1.3	2.3	1176	サカキ	0.4	1.5
1064	シロダモ	1.1	2.1	1177	シキミ	0.4	1.3

個体番号	種名	胸高直径	樹高	個体番号	種名	胸高直径	樹高
Ind. NO	Species name	DBH (cm)	height (m)	Ind. NO	Species name	DBH (cm)	height (m)
1065	シロダモ	1.3	2.6	1178	シロダモ	0.8	2.0
1066	シロダモ	2.4	3.9	1179	シロダモ	1.6	2.5
1067	シキミ	1.0	2.1	1180	シロダモ	0.6	1.8
1068	シキミ	0.5	1.5	1181	シロダモ	0.5	1.5
1069	シロダモ	1.5	2.5	1182	シロダモ	1.8	2.8
1070	ハイノキ	0.4	1.4	1183	シロダモ	0.4	1.3
1071	シキミ	0.5	1.5	1184	シロダモ	1.3	2.2
1072	シロダモ	1.7	2.8	1185	シロダモ	1.0	2.1
1073	ヤブニツケイ	1.2	2.5	1186	ハイノキ	0.4	1.5
1074	シロダモ	1.3	2.7	1187	シキミ	0.9	1.9
1075	サカキ	0.7	2.8	1188	シロダモ	1.6	2.8
1076	シロダモ	1.5	2.6	1189	サカキ	0.7	1.8
1077	シロダモ	1.1	2.4	1190	ヒサカキ	0.4	1.5
1078	シロダモ	0.2	1.5	1191	シキミ	0.7	2.0
1079	シロダモ	1.2	2.2	1192	シキミ	1.7	2.1
1080	シロダモ	0.7	1.6	1193	シロダモ	1.7	2.5
1081	シロダモ	1.2	2.2	1194	シロダモ	0.7	1.6
1082	シキミ	0.5	1.4	1195	ハイノキ	0.5	1.8
1083	シキミ	0.6	1.8	1196	シロダモ	1.0	2.3
1084	シロダモ	0.9	2.0	1197	シキミ	0.5	2.1
1085	サカキ	0.4	1.4	1198	シロダモ	0.8	1.7
1086	シロダモ	1.8	2.8	1199	シロダモ	1.5	2.8
1087	シキミ	0.8	1.6	1200	シロダモ	1.8	3.2
1088	ヒサカキ	0.5	1.4	1201	ヒサカキ	1.0	2.3
1089	シロダモ	0.5	1.3	1202	シロダモ	1.6	2.6
1090	ヒサカキ	0.3	1.3	1203	シキミ	0.8	2.0
1091	シロダモ	0.6	1.6	1204	シキミ	0.9	1.9
1092	シロダモ	0.5	1.6	1205	シキミ	0.4	1.3
1093	シロダモ	0.4	1.5	1206	サカキ	0.7	1.9
1094	シロダモ	1.1	2.3	1207	サカキ	2.0	2.9
1095	ハイノキ	0.8	2.0	1208	ハイノキ	0.7	1.9
1096	シキミ	1.0	2.1	1209	シキミ	2.2	2.6
1097	ハイノキ	0.7	2.2	1210	シロダモ	1.6	2.7
1098	ヤブムラサキ	0.3	1.4	1211	シキミ	0.5	1.5
1099	シロダモ	0.7	1.8	1212	シロダモ	1.6	2.6
1100	シロダモ	0.8	2.0	1213	サカキ	0.6	1.7
1101	シロダモ	1.0	2.3	1214	シロダモ	0.5	1.7
1102	シロダモ	2.1	2.7	1215	シロダモ	1.9	2.8
1103	サカキ	1.2	2.6	1216	シキミ	0.8	2.0

Appendix 23 毎木調査表 (滑床ヒノキ, 中円)
Tree profile in middle-sized circle plot in Nametoko

個体番号	種名	胸高直径	樹高
Ind. NO	Species name	DBH (cm)	height (m)
81	ヒノキ	39.4	26.8
82	ヒノキ	37.3	26.3
130	ヒノキ	29.8	24.1
147	ヒノキ	39.6	26.8
148	ヒノキ	47.0	28.3
159	ヒノキ	46.5	28.2
166	ヒノキ	42.8	27.5
168	ヒノキ	39.9	26.9
170	ヒノキ	33.7	25.3
177	ヒノキ	32.5	25.0
183	ヒノキ	34.2	25.5
263	ヒノキ	35.6	25.9
278	ヒノキ	38.8	26.4

Appendix 24 毎木調査表 (滑床ヒノキ, 大円)
Tree profile in large circle plot in Nametoko

個体番号 Ind. NO	種名 Species name	胸高直径 DBH (cm)	樹高 height (m)
18	ヒノキ <i>Chamaecyparis obtusa</i>	29.2	23.9
27	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	27.6	23.4
30	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	31.0	24.5
70	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	44.5	27.8
72	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	33.7	25.3
75	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	34.6	25.6
78	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	29.1	23.9
84	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	36.1	26.0
85	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	42.3	27.4
89	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	41.2	27.2
174	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	47.6	28.4
178	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	39.2	26.7
181	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	35.8	25.9
185	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	46.8	28.2
259	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	43.7	27.7
262	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	29.4	29.3
265	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	37.5	26.3
274	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	37.9	27.9
277	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	31.3	24.6
280	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	50.0	28.7
282	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	56.5	29.7
283	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	34.6	25.6
291	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	60.5	30.1
293	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	48.3	28.5
333	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	34.6	28.6
335	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	40.4	27.0
337	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	31.2	24.6
339	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	39.0	26.7
342	ヒノキ <i>C. obtusa</i>	36.0	28.9

Appendix 25 植生調査表 (滑床ヒノキ)
Flora list of the Nametoko study site (Hinoki cypress stand)

(小円部 200m²内)

Inner the small circle (200 m²)

種名	Species name	被度	Coverage
コガクウツギ	<i>Hydrangea luteo-venosa</i>	+	
サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i>	+	
ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i>	+	

(中円部で初めて出現した植物名)

Species which are appeared in the middle-sized circle

なし Nothing

(大円部で初めて出現した植物名)

Species which are appeared in the large circle

種名	Species name
ハウロクイチゴ	<i>Rubus sieboldii</i>

Appendix 26 土壤調査表 (滑床ヒノキ)
Soil profile description sheet in Nametoko Hinoki

111 断面番号 (Profile number)	滑床ヒノキ 1 (Nametoko Hinoki 1)	135 傾斜と斜面形 (Slope: slope, form)	傾斜 (slope) 20-35°
113 調査年月日 (Date)	991019	斜面全体の方向 (direction of slope) NE	
114 調査者氏名 (Authors)	山田・稲垣・吉永・篠宮・松村・都築・小谷・今富・門田 (Yamada, Inagaki, Yoshinaga, Shinomiya, Matsumura, Tsuzuki, Kodani, Imatomi, Kadota)	143 植生 (Vegetation)	ヒノキ (<i>Chamaecyparis obtusa</i>)
116 調査地点 (Location)	愛媛県宇和島市滑床 (Nametoko, Uwajima City, Ehime Prefecture)		下層植生については別表参照 (see appendix 25.)
117 標高 (Elevation)	約 600 m	166 その他 (Other surface characteristics)	ヒノキの落葉・落枝・球果 (litter and cone of Hinoki)
118 図幅 (Map sheet number)	松丸 (Matsumaru)		L: 0-1 cm, F: 0-0.5 cm 50% covered
119 緯度・経度 (Coordinates)	33° 11' 55" N 132° 39' 24" E		
121 林野土壤分類 (Forest Soil Division (1976))	B _b (d)		

Horizon	Boundary		Soil Color		Text- Class	Rock fragment			Structure			Hardness		Root		Biological feature	Mycorrhiza Hypha	Moisture conditions
	Depth	Dst	Tpg	W		S	Abd	Shp	Wth	Nat	Siz	Grd	Size	Typ	Y. method			
A	14	C	W	10YR		C	C	A	F	M	MO	ME	SB	9	F	VF	小さな 固まり (small block)	潤 (moist)
				3/3			C	A	F	C	MO	CO	SB	(5-12)	F	F		
											MO	ME	GR	軟 (soft)	F	M		
Bw1	34	G	S	8.75YR	C	F	A	F	F	C	MO	ME	SB	16	F	VF	セミ 散見 (occasionally)	潤 (moist)
				4/6		F	A	F	F	S	MO	CO	SB	(14-18) 堅 (hard)	F	F		
Bw2	48	C	W	7.5YR	C	C	A	F	F	C	WE	ME	SB	16	F	VF	散見 (occasionally)	潤 (moist)
				5/6		C	A	F	F	S	WE	CO	SB	(13-18) 堅 (hard)	F	F		
BC	84+			7.5YR	C	C	A	F	F	C				18 (17-20) 堅 (hard)	V	VF		潤 (moist)
				5/6		A	A	F	F	S					V	F		
															V	M		